KOMPOSISI KIMIA DEPOSISI KERING DI DUA WILAYAH SUB PERKOTAAN DI INDONESIA, SERPONG DAN BOGOR

CHEMICAL COMPOSITION OF DRY DEPOSITION IN TWO SUB URBAN SITES IN INDONESIA, SERPONG AND BOGOR

Retno Puji Lestari¹, Ricky Nelson¹

(Diterima tanggal 12 Juni 2017; Disetujui tanggal 27 September 2017)

ABSTRAK

Pemantauan deposisi kering di wilayah sub perkotaan merupakan bagian dari kegiatan pemantauan deposisi asam yang bertujuan untuk melihat adanya dampak deposisi asam terhadap lingkungan. Pengukuran deposisi kering dilakukan menggunakan metode *filter pack* dengan cara penentuan komponen partikel Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , NH_4^+ , Cl^- , NO_3^- , dan SO_4^{2-} dalam aerosol dan gas – gas SO_2 , HNO_3 , NH_3 , dan HCl . Udara dihisap menggunakan pompa dengan laju alir 1 L/menit selama 14 hari secara kontinyu, dan dilewatkan pada *four stage filter pack* yang memiliki spesifikasi penyerapan tiap komponen kimia di setiap rangkaian filter. Setiap filter diekstrak secara terpisah dan hasil ekstraksi dianalisis menggunakan instrumen kromatografi ion, DIONEX ICS5000. Hasil pemantauan deposisi kering menunjukkan bahwa NH_3 merupakan komponen dominan dalam fase gas sementara ion SO_4^{2-} dalam aerosol. Konsentrasi minimum dan maksimum gas NH_3 di Serpong dengan data rerata per tahun adalah 11,0 – 19,1 ppb, sementara di Bogor berada pada kisaran 8,5 – 23,1 ppb. Konsentrasi minimum dan maksimum komponen partikulat SO_4^{2-} di Serpong dan Bogor adalah 3,4 - 5,1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dan 2,7 - 5,1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Sumber pencemar yang berasal dari sektor agrikultural dan peternakan di sekitar titik lokasi berpotensi menyebabkan tingginya NH_3 dalam fase gas, sementara kegiatan antropogenik memberikan kontribusi terhadap peningkatan konsentrasi SO_4^{2-} dalam aerosol.

Kata kunci: deposisi kering, daerah sub perkotaan, kromatografi ion

ABSTRACT

Monitoring of dry deposition in sub urban site is considered as a part of acid deposition observation, in which can be used for the assessment of acid deposition impact to environment. Dry deposition measurement was conducted using filter pack method to determine the particulate component of Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , NH_4^+ , Cl^- , NO_3^- , and SO_4^{2-} in aerosol and gases of SO_2 , HNO_3 , NH_3 , and HCl . The air is inhaled using a pump with a flow rate of 1 L/min for 14 days continuously, and then passed into a four stage filter pack, whereas in each filter set is specifically absorbed each chemical component. Each filter was extracted separately and its extracted solution was analyzed by chromatography ion instrument, DIONEX ICS5000. The monitoring of dry deposition's result showed that NH_3 is the dominant component in gas phase, while SO_4^{2-} ion in aerosol. Minimum and maximum concentration of annual data in Serpong for NH_3 is 11,0 – 19,1 ppb, while in Bogor is 8,5 – 23,1 ppb. Minimum and maximum concentration of annual data in Serpong and Bogor for particulate SO_4^{2-} are 3,4 - 5,1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ and 2,7 - 5,1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, respectively. Pollutant sources from agricultural and farm sectors nearby the sampling sites potentially lead to high level of NH_3 in gas phase, while anthropogenic activities contributed to increase the SO_4^{2-} concentration in aerosol phase.

Keywords: dry deposition, rural area, ion chromatography

PENDAHULUAN

Deposisi asam merupakan salah satu fenomena akibat pencemaran udara yang menggambarkan turunnya asam dari atmosfer ke permukaan bumi (1, 2). Peristiwa tersebut dapat terjadi dalam kondisi “basah” seiring

dengan turunnya hujan atau salju (2). Di sisi lain, proses deposisi kering (*dry deposition*) terjadi pada waktu cuaca berawan dan tidak hujan. Deposisi kering ini mengacu pada proses jatuhnya asam ke bumi melalui gas

¹ P3KLL-KLHK, Kawasan PUSPIPTEK, Gedung 210 Serpong, Tangerang – Banten T/F 021-7560981, 15310, emc_acdep@yahoo.com

dan debu atau partikel akibat pengaruh gravitasi dan difusi atmosfer, dimana hampir setengah dari deposisi asam terjadi secara kering (2, 3). Sumber utama deposisi asam adalah emisi sulfur dan nitrogen yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil (1, 2, 4). Gas-gas SO_2 dan NO_x serta berbagai polutan lain bereaksi dengan uap air di atmosfer membentuk asam-asam. Jumlah keasaman di atmosfer yang terdeposit di permukaan bumi melalui deposisi kering tergantung pada jumlah curah hujan yang terjadi di area tersebut, misalnya rasio deposisi kering terhadap deposisi hujan di gurun lebih tinggi dibanding wilayah tropis (2). Karakteristik polutan dari parameter deposisi asam akan bersifat spesifik sesuai dengan sumber polutan dan lokasi sampling.

Gambar 1. Ilustrasi Alur Hujan Asam, dimodifikasi dari EPA (2)

Deposisi kering terdiri dari gas dan aerosol (partikulat), dimana gas-gas SO_2 , HNO_3 , HCl dan NH_3 berkontribusi dalam proses terjadinya deposisi asam (asidifikasi) di lingkungan. Pemantauan deposisi kering dapat dilakukan dengan cara pengukuran langsung atau pengukuran konsentrasi udara yang diikuti dengan perhitungan aliran (*flux*) deposisi kering menggunakan metode inferensial (5). Di antara berbagai metode pengukuran

konsentrasi udara, *filter pack* telah diadopsi sebagai salah satu metode yang digunakan untuk menentukan deposisi kering di beberapa institusi di Amerika Utara dan Jepang, yaitu CASTNet (US), CAPMoN (Kanada) dan EMEP (6). Salah satu keuntungan *multi-stage filter pack* adalah penentuan konsentrasi gas dan aerosol dapat dilakukan secara simultan (7). Spesies kimia yang direkomendasikan EANET untuk kebutuhan pemantauan deposisi kering adalah SO_2 , NO_2 , NO , O_3 , HNO_3 , HCl , NH_3 dan komponen partikulat (SO_4^{2-} , NO_3^- , Cl^- , NH_4^+ , Na^+ , Mg^{2+} , K^+ dan Ca^{2+}), serta PM_{10} .

Pengambilan contoh uji deposisi kering ditentukan berdasarkan kategori lokasi sampling: *remote* (terpencil), *rural* (pedesaan) dan *urban* (perkotaan) (8). Adapun kota Bogor dan Serpong merupakan lokasi peralihan antara kota metropolitan Jakarta (*urban*) dan daerah pedesaan (*rural*); sehingga lebih tepat dikatakan sub urban atau kota penyangga. Kegiatan penelitian di lokasi terpencil dilakukan untuk memperoleh data latar belakang (*background*) pemantauan. Kegiatan di lokasi pedesaan ditentukan untuk menilai status deposisi asam di area pedesaan, dimana data pemantauan digunakan untuk mengevaluasi efek deposisi asam terhadap tanaman dan wilayah agrikultur (9). Kegiatan peternakan, penggunaan pupuk kaya N pada sektor pertanian, pembakaran biomassa, emisi kendaraan bermotor, dan pembakaran batubara berpotensi mengemisikan NH_3 (10, 11).

METODOLOGI

1. Lokasi Pemantauan

Lokasi pemantauan deposisi kering di area sub perkotaan dilakukan di Serpong dan Bogor, seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2. Lokasi pemantauan stasiun P3KLL Puspipetek Serpong (a) Citra satelit pada 06 21'01,9'' LS dan 106 40'04,07'' BT, (b) Alat sampling deposisi kering ditempatkan pada ketinggian 2 m

Gambar 3. Lokasi pemantauan stasiun BMKG Dramaga Bogor (a) Citra satelit pada 06 21' 33'11,91'' LS dan 106°44'35,21'' BT, (b) Alat sampling deposisi kering ditempatkan pada ketinggian 2 m

Lokasi pemantauan di Serpong dan Bogor awalnya dikategorikan oleh EANET tahun 2000 ke dalam wilayah pedesaan (*rural site*), dengan kriteria bahwa di sekitar lokasi masih terdapat persawahan, hutan, perkebunan dan perumahan penduduk. Titik sampling deposisi asam di daerah Serpong dikelilingi oleh bangunan gedung perkantoran yang ditumbuhi pepohonan, sementara titik sampling di Bogor berada dalam suatu wilayah lapangan terbuka yang dikelilingi oleh daerah persawahan dan

perkebunan di sekitarnya.

2. Alat dan Bahan

Alat sampling yang dipakai adalah rangkaian *four-stage filter pack* dari NILU (*Norwegian Institute for Air Research*) yang dihubungkan dengan *dry gas meter* SHINAGAWA. Bahan yang digunakan adalah untuk pengujian deposisi kering adalah filter PTFE (T080A047A/ ADVANTEC), filter poliamida (ULTIPOR N66, PALL), filter selulosa (51A/

ADVANTEC Ø47mm), dan kertas saring. Larutan standar yang dipakai berupa standar komersial dari Cica Reagent 1000 mg/L untuk anion (Cl^- , NO_3^- , SO_4^{2-}) dan standar kation (Na^+ , K^+ , NH_4^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+}). Pereaksi yang dipakai dalam pengujian deposisi kering menggunakan metode filter pack adalah K_2CO_3 , H_3PO_4 , gliserol, H_2O_2 (seluruhnya dari MERCK), dan aquades ($\text{DHL} < 1 \mu\text{S}/\text{cm}$).

Gambar 4. Diagram Skematik *Four-stage filter packs*

Gambar 5. Rangkaian alat pengambil contoh uji

3. Metode

Teknik sampling dan analisis deposisi kering menggunakan metode yang dipakai oleh P3KLL yaitu metode filter pack berdasarkan IK-1/U/LPDL (Penentuan komponen partikel Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , NH_4^+ , Cl^- , NO_3^- , dan SO_4^{2-} dan gas – gas SO_2 , HNO_3 , NH_3 , dan HCl dalam deposisi kering dengan metode Filter Pack), diadopsi dari panduan yang dipublikasikan oleh EANET. Instruksi kerja tersebut (12) mencakup cara preparasi masing-masing filter yang disusun dalam alat filter pack. Pengambilan sampel yang dilakukan dengan memasang filter yang telah disusun dalam rangkaian filter pack selama 2 (dua) minggu dengan laju alir 1 L/menit. Setelah sampling, sampel filter dilarutkan dengan 20 ml H_2O , kecuali untuk F2 dengan pereaksi H_2O_2 0,05% v/v, kemudian diekstrak menggunakan *shaker*. Sampel dengan parameter komponen partikulat Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , NH_4^+ , Cl^- , NO_3^- , dan SO_4^{2-} dianalisis menggunakan ion kromatografi ion, IC DIONEX ICS5000 yang dilengkapi dengan *suppressor* CSRS ULTRA II, 2mm, kolom anion : IonPac AS12A, dan kolom kation : IonPac CS 12A pada laju alir 1,5 L/menit dimana masing-masing menggunakan 0.3 mM NaHCO_3 dan 2.7 mM Na_2CO_3 sebagai eluen anion dan Methane Sulphonic Acid (MSA) 20 mM sebagai eluen kation.

Perhitungan konsentrasi dilakukan sebagai berikut:

- Konsentrasi parameter di udara dihitung melalui rumus;

$$C_{\text{air}} = \alpha * \text{net } C_{\text{sol}} * \frac{V_{\text{sol}}}{V_{\text{udara}}} \quad \left(\alpha = \frac{f_{10J}^3}{M} \right)$$

Keterangan :

$$C_{\text{air}} = \text{konsentrasi di udara (nmol/m}^3\text{)}$$

Tabel 1. Ringkasan Perhitungan Parameter Filter Pack

Parameter	M	Persamaan
SO ₄ ²⁻	96.06	
NO ₃ ⁻	62.01	
Cl ⁻	35.45	
Na ⁺	22.99	$C_{air} = \alpha * net\ C_{sol}\ F0 * V_{sol} / V_{udara}$
K ⁺	39.10	
NH ₄ ⁺	18.04	
Mg ²⁺	24.31	
SO ₂	96.06 (SO ₄ ²⁻)	$C_{udara} = \alpha * (net\ C_{sol}F1 + net\ C_{sol}F2) * V_{sol} / V_{udara}$
HNO ₃	62.01 (NO ₃ ⁻)	$C_{udara} = \alpha * net\ C_{sol}F1 * V_{sol} / V_{udara}$
HCl	35.45 (Cl ⁻)	$C_{udara} = \alpha * (net\ C_{sol}F1 + net\ C_{sol}F2) * V_{sol} / V_{udara}$
NH ₃	18.04 (NH ₄ ⁺)	$C_{udara} = \alpha * (net\ C_{sol}F1 + net\ C_{sol}F3) * V_{sol} / V_{udara}$

net C_{sol} = konsentrasi dalam larutan (mg/l)
V_{sol} = volume larutan (ml)
V_{udara} = volume sampel dengan koreksi pada 20°C (m³)
M = bobot molekul

- b. Rumus net C_{sol} dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$net\ C_{sol} = C_{sol} - C_{blanko}$$

Keterangan :

C_{sol} = Konsentrasi larutan dalam filter sampel
C_{blanko} = Konsentrasi larutan dalam filter blanko

- c. V_{udara} harus dikoreksi pada 20°C menggunakan data suhu yang diperoleh pada saat itu, sebagai berikut :

Keterangan :

$$V_{udara} = V_{udara\ sampel} * \frac{(20 + 273)}{(T + 273)}$$

V_{udara sampel} = volume udara sampel (belum dikoreksi)
T = suhu rata-rata selama pengambilan contoh (°C)

Konsentrasi anion & kation (ppm) diperoleh

dari persamaan garis yang dihasilkan dari pembuatan kurva kalibrasi antara konsentrasi standar (ppm) dengan luas area.

- d. Konsentrasi parameter gas (ppb) di udara dihitung melalui rumus;

$$C^1 = c * 0.082 * 293.15 * 0.001$$

Keterangan :

C¹ = konsentrasi gas (ppb)
C = konsentrasi gas (nmol/m³)
0,082 = konstanta 1 mol gas (R)
293.15 = konversi temperatur 20°C ke Kelvin

Data anion dan kation dalam partikulat (µg/m³) serta gas-gas (ppb) diperoleh dari hasil pemantauan deposisi kering laboratorium Pusarpedal – KLH (P3KLL- KLHK) dari tahun 2012-2016 (13, 14).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsentrasi gas dan partikulat dalam deposisi kering berhubungan dengan kondisi meteorologis, kondisi permukaan, dan jenis spesies kimia (15). Deposisi kering terdiri dari komponen gas dan partikulat. Hasil kegiatan kajian parameter deposisi kering di Serpong dan Bogor pada tahun periode 2012-2016 ditampilkan dalam gambar berikut ini:

Gambar 6. Variasi bulanan parameter gas-gas dalam deposisi kering selama periode 2012 - 2016, (a) stasiun P3KLL Serpong, (b) stasiun BMKG Bogor

Gambar 7. Variasi bulanan parameter partikulat kation dan anion dalam deposisi kering selama periode 2012 - 2016, (a) stasiun P3KLL Serpong, (b) stasiun BMKG Bogor

Variabilitas bulanan untuk parameter gas SO₂, HNO₃, NH₃, dan HCl di Serpong dan Bogor pada Gambar 6. memperlihatkan fluktuasi konsentrasi gas-gas. Kondisi paling jelas terjadi pada gas NH₃ dimana konsentrasi pada musim penghujan (Desember-April) lebih rendah dibanding bulan-bulan kemarau (Mei-Oktobre). Konsentrasi NH₃ terendah di Serpong terjadi pada bulan Januari yaitu 6,6 ppb, sementara di Bogor pada bulan Februari sebesar 4,3 ppb. Konsentrasi NH₃ tertinggi di Serpong terjadi pada bulan Juli yaitu 20,9 ppb, sementara di Bogor pada bulan Juni dan Juli sebesar 16,8 ppb. Variabilitas bulanan untuk parameter partikulat Na⁺, K⁺, Ca²⁺,

Mg²⁺, NH₄⁺, Cl⁻, NO₃⁻, dan SO₄²⁻ di Serpong dan Bogor pada Gambar 7. memperlihatkan fluktuasi ion SO₄²⁻. Kondisi di Serpong menunjukkan adanya puncak (*peak*) di bulan Juli dengan konsentrasi 6,4 µg/m³ sementara di Bogor di bulan Agustus dengan konsentrasi 7,3 µg/m³. Peningkatan konsentrasi polutan terjadi pada musim kemarau.

Dari Gambar 8. terlihat bahwa gas NH₃ dalam deposisi kering di lokasi ini memiliki persentase konsentrasi paling tinggi dibandingkan dengan gas-gas lain. Konsentrasi minimum dan maksimum gas NH₃ di Serpong dengan data rerata per tahun untuk berada pada kisaran 11,0 – 19,1 ppb, sementara SO₂ (0,7 - 1,5 ppb),

HCl (0,6 - 1,0 ppb) dan HNO_3 (0,6 – 1,1 ppb). Komposisi anion dan kation dalam aerosol tertinggi di Serpong adalah SO_4^{2-} diikuti oleh NO_3^- dan . Konsentrasi minimum dan maksimum komponen partikulat di Serpong yaitu SO_4^{2-} (3,4 - 5,1 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$), NO_3^- (0,5 - 1,2 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$), Cl^- (0,2 - 0,5 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$), NH_4^+ (0,4 - 0,9 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$), Na^+ (0,3 – 0,6 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$), K^+ (0,3 – 0,7 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$), Mg^{2+} (0,05 – 0,1 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$), dan Ca^{2+} (0,4 – 0,7 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$).

Persentase NH_3 di antara komponen gas-gas lainnya pada periode 2012-2016 di Serpong adalah 84% dengan konsentrasi rerata sebesar 14,7 ppb. Cenderung terjadi peningkatan NH_3 dibandingkan dengan periode 2001-2010

(Gambar 9.) yang memiliki konsentrasi rerata 7,6 ppb dengan persentase 73%. Demikian pula untuk komponen partikulat SO_4^{2-} yang mengalami peningkatan pada periode sebelumnya, namun komponen anion dalam partikulat pada periode 2000-2010 memiliki persentase relatif setara.

Hal serupa juga terlihat di lokasi Bogor, dimana gas NH_3 dalam deposisi kering memiliki konsentrasi paling tinggi dibandingkan dengan gas-gas lain. Konsentrasi rata-rata per tahun untuk gas NH_3 di Bogor berada pada kisaran 8,5 – 23,1 ppb, sementara SO_2 (1,0 - 1,8 ppb), HCl (0,7 - 1,6 ppb) dan HNO_3 (0,7 - 1 ppb). Komposisi anion dan kation dalam aerosol

Gambar 8. Rata-rata komposisi kimia di stasiun P3KLL Serpong sepanjang 2012 to 2016, (a) gas SO_2 , HNO_3 , HCl dan NH_3 , (b) anion dan kation dalam aerosol

Gambar 9. Rata-rata komposisi kimia di stasiun P3KLL Serpong sepanjang 2001 to 2010, (a) gas SO_2 , HNO_3 , HCl dan NH_3 , (b) anion dan kation dalam aerosol

Gambar 10. Rata-rata komposisi kimia di stasiun BMKG Bogor sepanjang 2012 to 2016, (a) gas SO₂, HNO₃, HCl dan NH₃, (b) anion dan kation dalam aerosol

tertinggi di Bogor yaitu SO₄²⁻ diikuti oleh NO₃⁻ dan Na⁺. Konsentrasi minimum dan maksimum komponen partikulat di Bogor yaitu SO₄²⁻ (2,7 - 5,1 µg/Nm³), NO₃⁻ (0,4 - 1,1 µg/Nm³), Cl⁻ (0,1 - 0,3 µg/Nm³), NH₄⁺ (0,3 - 0,7 µg/Nm³), Na⁺ (0,3 - 1,7 µg/Nm³), K⁺ (0,4 - 0,7 µg/Nm³), Mg²⁺ (0,05 - 0,1 µg/Nm³), dan Ca²⁺ (0,4 - 0,9 µg/Nm³). Dalam hal ini, tidak ada perbandingan data dari periode sebelumnya karena kegiatan pemantauan di Bogor dimulai sejak tahun 2012.

Secara geografis, titik lokasi Serpong dikelilingi oleh wilayah dengan jalur transportasi padat dan berbagai kawasan industri. Kondisi meteorologis di wilayah Serpong cenderung bersifat teduh (*calm*) dengan kecepatan angin < 1 knot. Umumnya dominasi arah angin berasal dari arah selatan. Sumber pencemar yang terdeposisi dalam bentuk deposisi asam di kawasan Serpong memiliki kemungkinan bersifat lokal maupun lintas wilayah. Potensi sumber NH₃ maupun NH₄⁺ di Serpong berasal dari pepohonan di sekeliling gedung perkantoran, penimbunan sampah kota dalam radius sekitar 5 km ke arah utara, dan industri peternakan dalam radius sekitar 10 km ke arah

selatan. Demikian pula halnya dengan titik lokasi di Bogor, meskipun dikelilingi dengan area pertanian namun dalam radius 2,3 km ke arah tenggara terdapat terminal angkutan kota. Sumber-sumber tersebut yang diduga memberikan kontribusi terhadap tingginya konsentrasi NH₃ dan ion SO₄²⁻.

Sumber pencemar menghasilkan polutan melalui penguraian senyawa organik oleh mikroorganisme dan berpotensi menyebabkan tingginya NH₃ dan NH₄⁺. Proses nitrifikasi NO₂ menjadi NH₃, hilangnya ion NO₃⁻ yang berkontribusi pada penguapan NH₄NO₃ dan terbentuknya artefak NH₃ yang berasal dari reaksi sublimasi senyawa seperti NH₄NO₃ atau NH₄Cl dalam bentuk padatan menjadi gas atau pembentukan senyawa lain yang melibatkan NH₃ adalah beberapa faktor penyebab kenaikan konsentrasi NH₃ (7). Gas-gas NH₃ yang dapat terdeposit dan berubah menjadi NH₄⁺ sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan konsentrasi NH₄⁺ dimana NH₄⁺ berlaku sebagai penetral untuk H₂SO₄ dan HNO₃ (10, 11). Kondensasi aerosol yang mengandung NH₄⁺ dan penguraian gas NH₃ dalam butiran awan turut berkontribusi

pada peningkatan ion NH_4^+ dalam air hujan maupun aerosol. Senyawa NH_4^+ atmosferik dihubungkan dengan kegiatan pertanian dan pembakaran biomassa yang dikombinasikan dengan SO_4^{2-} dan NO_3^- dari $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ dan NH_4NO_3 (11, 17, 18). Faktor emisi NH_3 dipengaruhi oleh sumber N yang berasal dari tanaman, pupuk N sintetis, dan pupuk hewan. Emisi latar belakang (*background emission*) NH_3 dari lahan pertanian menurut Farquhar et al (1983) tidak diketahui secara pasti, karena tanaman dapat berperan sebagai sumber dan menghasilkan NH_3 , namun Holtan-Hartwig & Bückman (1994) menyimpulkan bahwa tanaman adalah emitor NH_3 pada atmosfer (19). Laju emisi NH_3 hasil dekomposisi tanaman tidak dapat diketahui, Whitehead and Lockyer (1989) menunjukkan bahwa NH_3 hanya diemisikan dari dekomposisi rerumputan dengan kandungan N tinggi (19).

Komposisi kimia deposisi kering ini serupa dengan komposisi kimia deposisi basah, dimana berdasarkan hasil studi hujan asam di Serpong tahun 2005-2007, pengaruh NH_3 terhadap pembentukan komponen NH_4^+ dalam partikulat terjadi sangat kuat pada musim penghujan (4, 20). Konsentrasi NH_3 tinggi pada musim kering dan akan menghasilkan NH_4NO_3 dalam bentuk aerosol dan NH_4^+ dalam deposisi basah. Penyerapan NH_3 oleh partikel-partikel halus menjadi NH_4^+ lebih mudah terjadi pada musim penghujan (4). Emisi antropogenik ditandai dengan keberadaan ion SO_4^{2-} dan NO_3^- di dalam partikulat, diduga terutama berasal dari kegiatan transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil, sementara senyawa Cl^- berasal dari kegiatan industri (4). Peningkatan konsentrasi umumnya terjadi pada musim kemarau.

Data pemantauan deposisi kering dalam periode yang sama di beberapa lokasi yang termasuk kriteria pedesaan/sub perkotaan di negara-negara anggota EANET (*Acid Deposition Monitoring Network in East Asia*) memperlihatkan pola komposisi yang serupa. Negara anggota EANET terdiri dari Jepang, Korea, China, Rusia, Mongolia, Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. NH_3 umumnya juga merupakan komponen dominan dalam fase gas dan ion SO_4^{2-} dalam fase partikulat. Lokasi Ijira-Jepang memiliki 66% NH_3 dari total fase gas dan 65% SO_4^{2-} dalam fase partikulat, Kanghwa-Korea (58% NH_3 dari total fase gas dan 47% SO_4^{2-} dalam fase partikulat), Imsil-Korea (61% NH_3 dari total fase gas dan 47% SO_4^{2-} dalam fase partikulat), Primorskaya-Rusia (52% NH_3 dari total fase gas dan 53% SO_4^{2-} dalam fase partikulat), Chiang Mai-Thailand (59% NH_3 dari total fase gas dan 53% SO_4^{2-} dalam fase partikulat). Sementara itu terdapat perbedaan komposisi deposisi kering pada fase gas di Listvyanka-Rusia (51% HCl dari total fase gas dan 58% SO_4^{2-} dalam fase partikulat) dan Hoa Binh-Vietnam (masing-masing 32% SO_2 dan HCl dari total fase gas dan 36% SO_4^{2-} dalam fase partikulat). Hal tersebut diakibatkan oleh potensi sumber pencemar yang berada di sekitar lokasi titik sampling. Data dari lokasi lain dengan kategori yang sama seperti Los Banos-Filipina, Pathumthani-Thailand pada periode tersebut tidak tersedia (16).

Jumlah deposisi NH_4^+ dan SO_4^{2-} diakui sebagai salah satu yang tertinggi di Eropa Tengah, yang berpotensi menyebabkan kemasaman yang sangat tinggi ke tanah hutan. Kontribusi emisi NH_3 dari pertanian terhadap deposisi asam total ke hutan adalah 52%. Endapan

nitrogen total mencapai 115,0 kg/ha/tahun, 83% berasal dari emisi NH_3 dan 17% dari emisi NO_x (21). Hasil pemantauan juga menunjukkan pola yang serupa dengan data emisi NH_3 dan NH_4^+ dalam air hujan yang cukup tinggi di kawasan Asia Timur (13, 22). Tren tersebut mengindikasikan adanya proporsi NH_4^+ yang lebih tinggi pada titik kontinental dibanding daerah pesisir dan pulau. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa NH_4^+ merupakan spesies penting dalam presipitasi kimia di Asia Timur, terutama di wilayah kontinental (22).

SIMPULAN

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa klasifikasi lokasi tertentu akan memberikan gambaran jenis pencemar dominan serupa, dimana baik di lokasi Serpong maupun Bogor memperlihatkan adanya dominasi NH_3 dalam fase gas dan ion SO_4^{2-} dalam aerosol. Hal yang sama juga terjadi di beberapa titik pemantauan di negara-negara EANET, seperti Jepang, Korea, Rusia, dan Thailand dalam periode yang sama. Adanya potensi sumber pencemar yang berada di sekitar titik sampling berasal dari kegiatan pemupukan, peternakan, tanaman, dan limbah domestik. SO_2 dan HNO_3 maupun garam-garam sulfat dan nitrat berasal dari kegiatan transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil, sementara HCl diduga berasal dari kegiatan industri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada anggota tim pelaksana kegiatan deposisi asam di P3KLL Serpong dan BMKG Bogor atas kerjasamanya dalam menghasilkan data pemantauan.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) APIS. Acid deposition 2015 [cited 2016 16 Oktober]. Available from: www.apis.uk/overview/pollutants/acid-deposition.
- (2) EPA. Acid Rain Wasington DC [cited 2014 23 April]. Available from: www.epa.gov.
- (3) EANET. Acid Deposition Monitoring Network in East Asia (EANET) [cited 2015 November 3]. Available from: <http://www.eanet.asia/event/wspa/wspa.html>.
- (4) Budiwati T, Rachmawati E. Gas NH_3 dan potensi pembentukan amonium (NH_4^+) di daerah rural Serpong-Tangerang. PSTA LAPAN. 2010.
- (5) ADORC. Technical document for filter pack method in East Asia. Niigata: ADORC; 2003. 20 p.
- (6) EMEP. EMEP manual for sampling and chemical analysis 2001 [cited 2015 November 3]. Available from: <http://www.nilu.no/projects/ccc/manual/>.
- (7) Aikawa M, Hiraki T. Difference in the Use of a Quartz Filter and a PTFE Filter as First-Stage Filter in the Four-Stage Filter-Pack Method. Water, Air, & Soil Pollution. 2010;213(1-4):331-9.
- (8) EANET. Interim scientific advisory group of EANET. Guidelines for acid deposition monitoring in East Asia. Niigata: EANET; 2000.
- (9) EANET. Technical manual on dry deposition flux estimation in East Asia. Niigata: EANET; 2010.
- (10) Sorooshian A, Shingler T, Harpold A, Feagles C, Meixner T, Brooks P. Aerosol and precipitation chemistry in the southwestern United States: spatiotemporal trends and interrelationships. Atmospheric Chemistry and Physics. 2013;13(15):7361-79.

- (11) Chughtai M, Mustafa S, Mumtaz M. Study of Physicochemical Parameters of Rainwater: A Case Study of Karachi, Pakistan. *American Journal of Analytical Chemistry*. 2014;5(04):235.
- (12) IK-1/U/LPDL Penentuan komponen partikel Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , NH_4^+ , Cl^- , NO_3^- , dan SO_4^{2-} dan gas – gas SO_2 , HNO_3 , NH_3 , dan HCl dalam deposisi kering dengan metode Filter Pack.
- (13) EANET. Data Report of Acid Deposition in East Asia 2014. Niigata: 2015.
- (14) Lestari RP. Tingkat pencemaran udara berdasarkan parameter deposisi asam. Tangerang Selatan: P3KLL-KLHK, 2016.
- (15) EANET. Strategy paper on future direction of monitoring for dry deposition of the EANET (2016-2020). Niigata: EANET, 2015.
- (16) EANET. Data Report 2015. Niigata: Network center for EANET; 2016.
- (17) Pathak RK, Wu WS, Wang T. Summertime PM 2.5 ionic species in four major cities of China: nitrate formation in an ammonia-deficient atmosphere. *Atmospheric Chemistry and Physics*. 2009;9(5):1711-22.
- (18) Redington AL, Derwent RG. Calculation of sulphate and nitrate aerosol concentrations over Europe using a Lagrangian dispersion model. *Atmospheric Environment*. 2002;36(28):4425-39.
- (19) Yan X, Akimoto H, Ohara T. Estimation of nitrous oxide, nitric oxide and ammonia emissions from croplands in East, Southeast and South Asia. *Global Change Biology*. 2003;9(7):1080-96.
- (20) Budiwati T. Kecenderungan temporal deposisi asam di Serpong dan Jakarta (2001-2009): Studi transboundary polutan. In: Rosida TB, Mahmud, Didi Sutiadi, editor. *Sains Atmosfer: Teknologi dan Aplikasinya - Buku 2*. Bandung: LAPAN; 2013.
- (21) Draaijers G, Ivens W, Bos M, Bleuten W. The contribution of ammonia emissions from agriculture to the deposition of acidifying and eutrophying compounds onto forests. *Environmental Pollution*. 1989;60(1-2):55-66.
- (22) Chao G, Zi-Fa W, Gbaguidi EA. Ammonium Variational Trends and the Ammonia Neutralization Effect on Acid Rain over East Asia. *Atmospheric and Oceanic Science Letters*. 2010;3(2):120-6.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Yanni Sudiyani - LIPI
2. Prof. Dr. Gustan Pari - BLI-KLHK
3. Dr. Hefni Effendi - IPB
4. Prof. Dr. Chairil Anwar Siregar - BLI-KLHK
5. Dr. Budi Haryanto - UI
6. Prof. Dr. Muhyatun Santosa - Batan

Sebagai Mitra Bestari atas kesediaannya melakukan *review* pada Jurnal Ecolab Volume 11 Nomor 2, Juli 2017.

Juli 2017

Dewan Redaksi
Ecolab Jurnal Kualitas Lingkungan Hidup

PETUNJUK PENULISAN NASKAH

1. Naskah asli merupakan hasil penelitian atau kajian ilmiah, maupun makalah yang berkaitan dengan penerapan pada pengelolaan dan kebijakan lingkungan hidup serta belum pernah diterbitkan dalam jurnal maupun prosiding.
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dan (*abstract*) ditulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia.
3. Sistematika
 - a. **JUDUL** (*Title Case, Center, 14 pt, Bold*)
Singkat, jelas dan mencerminkan isi
 - b. **Nama (para) penulis atau baris kepemilikan** (*Center, 11 pt, Bold*)
Ditulis lengkap tanpa gelar, dengan diberi nomor penulis 1,2...dst
Instansi, Alamat, Telepon, Fax, dan E-mail. (*left, 8 pt*) ditulis paling bawah di halaman pertama.
 - c. **ABSTRACT** (*UPPERCASE, left, 12 pt, Bold*)
Berisi intisari makalah, cara penyelesaian masalah, dan hasil yang diperoleh, maksimal 300 kata (*Sentence case, 11 pt*)
Keywords: berisi 5 – 8 kata dalam bahasa Inggris. (*Sentence case, 10 pt, Italic*)
 - d. **PENDAHULUAN** (*UPPERCASE, left, 12pt, Bold*)
Berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, dan ruang lingkup, serta teori yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. (*Sentence case, 12 pt*).
 - e. **METODOLOGI** (*UPPERCASE, left, 12 pt, Bold*)
Berisi tentang subjek yang dibahas, alat, bahan, lokasi (bila ada) pengukuran, prosedur, dan metode analisis yang digunakan. (*Sentence case, 12 pt*)
 - f. **HASIL DAN PEMBAHASAN** (*UPPERCASE, left, 12 pt, Bold*)
Berisi penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, gambar, diagram dan/atau lain sebagainya. Pembahasan dilakukan terhadap hubungan berbagai variabel baik bebas maupun terikat, analisis tentang keterkaitan data dan kesesuaian hasil penelitian terhadap teori yang digunakan berikut alasannya. (*Sentence case, 12 pt*)
 - g. **SIMPULAN** (*UPPERCASE, left, 12 pt, Bold*)
Berisi simpulan dari pembahasan. (*Sentence case, 12 pt*)
 - h. **DAFTAR PUSTAKA** (*UPPERCASE, left, 12 pt, Bold*)
Penulisan daftar pustaka ditulis berdasarkan sistem *Vancouver*, yaitu menggunakan nomor arab (misal: (1). (1-3) dst) berdasarkan urutan pemunculan (*Sentence case, 12pt*).
5. Format Naskah
 - a. Menggunakan MS word, diketik satu setengah (1,5) spasi menggunakan ukuran kertas A4, jenis huruf *Times New Roman*.
 - b. Setiap persamaan, gambar, dan tabel masing-masing diberi nomor sesuai urutan pemunculan. Nomor persamaan ditulis dipinggir kanan dengan menggunakan nomor arab dan berkurung (). Nomor dan judul gambar ditulis di bawah gambar (*left, 10 pt*), sedangkan untuk nomor dan judul tabel ditulis di atas tabel (*left, 10 pt*) dengan isi tabel 10 pt, sumber data (*left, 9 pt*).
 - c. Kurva dibuat dengan latar belakang putih. Kurva yang memuat lebih dari satu garis, dibedakan dengan bentuk titik yang berbeda atau bentuk garis yang berbeda (misalnya dengan — atau ---- atau -----, bukan dengan warna).
 - d. Grafik batang dibuat dengan latar belakang putih. Grafik batang yang memuat lebih dari satu batang harus dibedakan dengan corak yang berbeda, bukan dengan warna.
 - e. Naskah dikirim dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
6. Tata Cara Penulisan Daftar Pustaka
 - a. Jurnal terdiri atas : nama, tahun, judul, nama jurnal, volume, halaman.
 - b. *Textbook* terdiri atas : Nama, tahun, judul buku, kota, penerbit.
 - c. Prosiding, disertasi, tesis dan skripsi, laporan penelitian, terdiri atas: Nama, tahun, judul, kota, penerbit.
 - d. *Website* : Nama, tahun judul, nama situs, tanggal mengakses.

Contoh :

- a. Jurnal: M.J Bauer, Herman R., Martin A. and Zellman H. 1998. *Waste water trethment*, , 38, 185-192
- b. Textbook: A. Hadi. 2005. *Prinsip pengelolaan Pengambilan Sampel Lingkungan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- c. Laporan: Ministry of the Environment of Japan (MoE), Risk Assessment Strategy for Suspected Endocrine, SPEED,98,2000
- d. Website: Sandy. 2003. "Limbah Cair". (<http://www.nicnas.gov.au/foreign/endocrine01.htm>, diakses 22/9/2003).