PERTUMBUHAN DAN KOMPOSISI JENIS PERMUDAAN ALAM PADA RUMPANG TEBANGAN DI KALIMANTAN SELATAN

The Growth and Composition of Wildlings in The Logged-over Gaps at South Kalimantan

Sudin Panjaitan¹⁾

¹⁾ Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru

Jl. A. Yani Km. 28,7 Landasan Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan; Telepon. (0511) 4707872, Fax (0511) 4707872
admin@foreibanjarbaru.or.id

Diterima 17 Juli 2013, direvisi 8 Oktober 2013, disetujui 20 Nopember 2013

ABSTRACT

The Indonesia production forest have changed into logger-over areas due to logging with TPTI system; the remaining were logged-over stands, gaps and skidding trails. Banjarbaru Reforestation Institute since 1985 (Banjarbaru Forestry Research Institute at present) had conducted trials on gap cutting system. The research aimed to determine the growth of wildlings and the biodiversity inside the gaps of 16, 5 and 3 years, respectively. One hundred percentage of sampling intensity was carried out for tree stage while saplings and seedlings was carried out with stratified random sampling, with the plot size of 5 x 5 m for saplings and 2 x 2 m for seedlings. The result showed the basal area for tree was 12.5 m²/ha on the 70 years rotation, the basal area was 54,6 m²/ha. The maximum diameter for saplings were 9.5 cm on 5 years gaps and 8.2 cm on 3 years gap, respectively. There were 38, 37 and 60 species underneath the gaps of 3, 5 and 16 years. It showed that the species composition and stand structure were varied. Shorea johorensis and S. parvifolia dominated the tree species inside 16 and 5 years gaps, respectively, while S. parvistipulata, S. parvifolia and Hopea sangal dominated the sapling species under 16, 5 and 3 years gaps, respectively.

Keywords : Growth, composition, wildlings, gaps, South Kalimantan

ABSTRAK

Hutan produksi Indonesia sebagian besar telah berubah menjadi areal bekas tebangan akibat pembalakan dengan sistem silvikultur TPTI, sehingga merupakan sempalan-semplan tegakan sisa, rumpang-rumpang, jalan sarad dan tempat terbuka. Dari hasil ujicoba Balai Teknologi Reboisasi Banjarbaru sejak tahun 1985 (saat ini berubah nama menjadi Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru) di stasiun Penelitian (KHDTK) Kintap dimana sistem tebang rumpang ("Gap Cutting System") merupakan salah satu sistem silvikultur yang memberikan hasil positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan permudaan alam dan mengetahui keanekaragaman jenis yang terdapat pada rumpang tebangan umur 16 tahun, 5 tahun dan 3 tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah pada rumpang 16 tahun (tingkat pohon), pengambilan sampel dilakukan dengan intensitas 100 %, sedangkan pada tingkat pancang dan tingkat semai dilakukan secara acak bertahap (*Stratified random*) yaitu 4 kwadrat ukuran 5 x 5 m untuk tingkat pancang dan 4 kwadrat ukuran 2 x 2 m untuk tingkat semai. Hasil penelitian menunjukkan pada rumpang 16 tahun luas bidang dasar tingkat pohon 12,5 m²/ha. Pada rotasi 70 tahun dengan riap ratahan tersebut diperoleh luas idang dasar 54.6 m²/ha. Pada rumpang 16 tahun diameter maksimum tingkat pancang sebesar 9,5 cm, pada rumpang 5 tahun 8,2 cm dan pada rumpang 3 tahun 6.5 cm. Permudaan alam tingkat pancang pada rumpang 5 tahun dan 16 tahun ditemukan masing-masing 38 jenis, 37 jenis dan 60 jenis. Hal ini membuktikan bahwa komposisi jenis dan struktur tegakan pada kelas umur rumpang tersebut tidak sama antara satu dengan lainnya. Jenis permudaan yang mendominasi pada tingkat pohon di rumpang 16 tahun dan 5 tahun adalah *Shorea johorensis* dan *Shorea parvifolia*, sedangkan pada tingkat pancang pada rumpang 16 tahun, 5 tahun dan 3 tahun masing-masing didominasi oleh *Shorea parvistipulata*, *Shorea parvifolia* dan *Hopea sangal*.

Kata kunci: pertumbuhan, komposisi, permudaan, rumpang, Kalimantan Selatan

I. PENDAHULUAN

Hutan adalah mosaik rumpang dan tegakan berlapis dari berbagai fase perkembangan dan umur dimana rumpang terjadi di seluruh tipe hutan dengan berbagai tingkat perkembangan.

Whitmore (1975) mengemukakan bahwa terdapat 3 fase perkembangan vegetasi yaitu: 1) fase rumpang artinya saat terjadinya rumpang, 2) fase pertumbuhan yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan vegetasi yang menempati rumpang, dan 3) fase tua yaitu vegetasi mencapai klimaks, struktur berlapis yang setiap saat dapat terjadi rumpang baru. Fase satu dengan lainnya saling terkait dan berkesinambungan.

Hutan produksi Indonesia pada saat ini sebagian besar telah berubah menjadi hutan bekas tebangan setelah kurang lebih selama 25 tahun mengalami pembalakan dengan sistem silvikultur Tebang Pilih Indonesia (TPI), saat ini berubah menjadi Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Hutan bekas tebangan terdiri dari pada sempalan-sembalan tegakan sisa, rumpang-rumpang ("gaps") jalan sarad dan tempat terbuka lainnya sebagai akibat dari pada aktifitas pembalakan.

Di dalam rangka pemantapan sistem tebang rumpang dan pembinaannya, maka perlu dilakukan pengelolaan rumpang lanjutan di hutan bekas tebangan. Rumpang tebangan luasnya bervariasi, hal ini tergantung dari banyaknya pohon yang ditebang/dipanen dalam sistem Tebang Pilih. Konsentrasi dari pada jenis komersil (pada saat ini umumnya dari jenis dipterocarpa, terutama jenis meranti) yang siap dipanen pada suatu areal akan menyebabkan pembukaan/kerusakan tegakan tinggal yang lebih besar pada areal tersebut.

Rumpang tebangan pada umumnya lebih besar dari pada rumpang yang terjadi secara alamiah akibat mati dan tumbang pohon kanopi atas. Pada rumpang besar di samping dapat mengakibatkan akselerasi pertumbuhan jenis anakan yang tertekan pertumbuhannya akibat kanopi tertutup dari permudaan juga tumbuh jenis-jenis pionir yang mempunyai biji yang peningkatan atau kecepatan pertumbuhannya sensitif oleh cahaya matahari.

Penelitian di areal hutan bekas tebangan HPH PT Hutan Kintap pada pertumbuhan anakan alam di dalam rumpang tebangan dengan luas 410 m² -1.240 m² yang telah mengalami pembebasan menunjukkan hasil yang positif. Pertumbuhan anakan selama 6 tahun setelah pembebasan rumpang diperoleh diameter tegakan 7,7 -12,0 cm dan tinggi 9,2 m – 13,6 m yang berasal dari anakan alam (seedling) dengan tinggi awal $\leq 1,3$ m (Tuomela *et.al.*, 1994).

Penelitian ini dilakukan dalam rangka usaha peningkatan produktifitas hutan alam produksi dengan memperhatikan aspek ekologis, ekonomis maupun sosiologis.

Penelitian ini bertujuan : 1) untuk memperoleh data otentik pertumbuhan permudaan alam pada rumpang tebangan, dan 2) untuk mengetahui keanekaragaman jenis setelah mengalami perlakuan pembebasan dan pemeliharaan pada luas rumpang 1.000 m² – 2.000 m².

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di areal hutan produksi meranti perbukitan di KHDTK Kintap, Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Jarak dari Banjarbaru menuju areal penelitian/KHDTK Kintap ± 150 Km. Penelitian dilakukan di areal HPH Hutan Kintap. Letak penelitian secara geografis berada antara 114°50'32" – 115°19'51" Bujur Timur dan 3°36'53" - 3°55'40" Lintang Selatan.

Stasiun Ujicoba Kintap (saat ini KHDTK) Kintap mempunyai topografi datar sampai bergelombang ringan serta berbukit sampai bergunung dengan ketinggian antara 50 – 625 m dpl. dan memiliki kemiringan antara 0 – 23 % yaitu bergelombang ringan sampai berat.

Menurut Peta tanah yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Tanah (LPT) Bogor tahun 1970, tipe tanah di areal ini terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu terdiri dari bahan induk batuan beku dengan fisiografi instrusi dan jenis tanah kompleks podsolik merah kuning dan lateritik

dari bahan induk batuan beku dengan fisiografi dataran.

Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Ferguson, iklim di lokasi penelitian ini termasuk tipe iklim B dengan nilai Q berkisar antara 13,3 – 33,3%. Musim hujan berlangsung antara bulan Nopember – April dan musim kemarau antara bulan Mei – Oktober. Suhu rata-rata adalah 25⁰C dengan suhu minimum dan maksimum adalah 22,6⁰ C dan 29,9⁰ C. Rata-rata curah hujan tahunan 3.017 mm. Rata-rata hari hujan 154 hari/tahun.

Vegetasi yang terdapat di areal penelitian ini didominasi oleh jenis Dipterocarpaceae yaitu Meranti (*Shorea* spp.), Keruing (*Dipterocarpus* spp.), Kapur (*Dryobalanops lanceolata*), Merawan/cengal (*Hopea sangal*). Jenis lainnya Ulin (*Eusideroxylon zwageri*), Geronggang (*Cratoxylon* spp.), Terap (*Artocarpus elasticus*), Binuang (*Octomeles sumatrana*), Medang (*Litsea* sp.) dan lain-lain.

Peralatan yang dipergunakan pada penelitian ini adalah : 1) kompas, 2) Diameter tape, 3) Galah ukur, 4) Meteran, 5) Cat dan patok ulin, dan 6) Peralatan lainnya yang diperlukan.

Rumpang yang diamati terdiri dari rumpang umur 16 tahun, 5 tahun dan 3 tahun setelah tebangan. Tingkat pohon (diameter ≥ 10 cm), diinventarisasi pada masing-masing rumpang dengan intensitas pengambilan contoh 100%. Penarikan contoh untuk tingkat pancang (sapling) dan semai (seedling) dilakukan secara Acak bertahap (Stratified random), yaitu 4 kuadrat ukuran 5 x 5 m untuk tingkat pancang dan 4 kuadrat ukuran 2 x 2 m untuk tingkat semai. Masing-masing kwadrat ditempatkan secara acak pada setiap seperempat lingkaran rumpang. Tingkat pancang dan pohon diidentifikasi dan diukur diameter (cm) pada setinggi dada dan tinggi (m), dan tingkat semai diidentifikasi dan diukur tinggi (cm).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertumbuhan

Hasil pengukuran dan pendataan pertumbuhan permudaan alam baik tingkat pohon/tiang, pancang dan semai pada umur rumpang 16 tahun (R16), 5 tahun (R5) dan 3 tahun n (R3), disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Pertelaan Tingkat pohon/tiang, pancang dan semai di dalam rumpang umur 16 tahun (R16), 5 tahun (R5) dan 3 tahun (R3) di Kintap Kalimantan Selatan

Table 1. Predicted level of trees/poles, saplings and seedlings inside gaps of 16 years (R16), 5 years (R5) and 3 years (R3) at Kintap, South Kalimantan

Nomor (Number)	Pertelaan (Predicted)	Rumpang 16 tahun (16 years gap)	Rumpang 5 tahun (5 years gap)	Rumpang 3 tahun (3 years gap)
1.	Pohon (0,2 ha)			
	Jumlah jenis	21 jenis	4 jenis	
	Kerapatan	75 (375 batang/ha)	18 (90 batang/ha)	
	Bidang Dasar	2,5 m ² (12,5 m ² /ha)	0,18 m ² (0,9 m ² /ha)	
	Volume	27,3 m ³ (136 m ³ /ha)	0,8 m ³ (4 m ³ /ha)	
	Jenis Dominan	<i>Shorea johorensis</i>	<i>Shorea parvifolia</i>	
2.	Pancang (0,01 ha)			
	Jumlah jenis	60 jenis	37 jenis	38 jenis
	Kerapatan	78 (7.800 batang/ha)	98 (9.800 batang/ha)	124 (12.400 batang/ha)
	Bidang Dasar	504,9 cm ² (5 m ² /ha)	697,3 cm ² (6,9 m ² /ha)	579,8 cm ² (5,8 m ² /ha)
	Jenis Dominan	<i>Shorea parvistipulata</i>	<i>Shorea parvifolia</i>	<i>Hopea sangal</i>
3.	Semai (0,0016 ha)			
	Jumlah jenis	25 jenis	18 jenis	9 jenis
	Kerapatan	24 (15.000 batang/ha)	42 (26.250 batang/ha)	27 (16.875 batang/ha)
	Jenis Dominan	Campuran	<i>Dyospyros densa</i>	<i>Hopea sangal</i>

Sumber: diolah dari data primer

Pada rumpang umur 16 tahun setelah pembebasan diperoleh luas bidang dasar pohon (diameter ≥ 10 cm) sebesar 12,5 m²/ha. Sampai pada umur tersebut riap rata-rata bidang dasar adalah 0,78 m²/ha/tahun. Pada rotasi 70 tahun dengan riap rata-rata tersebut, maka akan diperoleh luas bidang dasar sebesar 54,6 m²/ha. Angka ini jauh lebih besar daripada rata-rata luas bidang dasar tingkat pohon (diameter > 10 cm) hutan hujan tropis sebesar 36 m²/ha (Dawkins, 1958 dalam Whitmore, 1984).

Pada rumpang umur 5 tahun diperoleh luas bidang dasar pohon sebesar 0,9 m²/ha, hal ini jauh lebih kecil daripada luas bidang dasar/ha dalam rumpang 16 tahun. Hal tersebut dikaitkan dengan kerapatan pohon yang hanya terdapat 90 pohon/ha pada rumpang umur 5 tahun dibandingkan dengan ditemukan 375 pohon/ha pada rumpang umur 16 tahun. Pada rumpang yang lebih tua terjadi rektur pohon yang berasal daripada rumpang yang lebih muda. Fakta ini dapat dilihat dari kerapatan tingkat pancang yang lebih sedikit pada rumpang lebih tua dibandingkan dengan rumpang yang lebih muda (Tabel 1). Pada rumpang umur 3 tahun belum terjadi rekrut pohon dari tingkat pancang. Diameter maksimum tingkat pancang pada rumpang tersebut adalah 6,5 cm dari jenis *Hopea sangal*.

Diameter maksimum pohon pada rumpang umur 5 tahun adalah 14,0 cm dari jenis *Shorea parvifolia*, sedangkan pada rumpang umur 6

tahun, diameter maksimum adalah 34,4 cm, juga dari jenis *Shorea parvifolia*. Hal ini menunjukkan bahwa jenis dipterocarpa memiliki kecepatan tumbuh relatif lebih cepat. Seperti halnya pada umumnya di daerah lain jenis meranti merah diantaranya *Shorea parvifolia*, *S. leprosula* dan *S. johorensis* adalah jenis-jenis utama dieksploitasi di daerah hutan Kintap. Jenis-jenis dipterocarpa mendominasi tingkat pohon dan tingkat pancang, sedangkan pada tingkat semai jenis dipterocarpa dominan dalam rumpang umur 3 tahun (Tabel 1). Di dalam rumpang umur 16 tahun sesudah terjadi penutupan kanopi, sehingga kemungkinan perkecambahan biji dipterocarpa banyak mengalami kematian setelah perkecambahan karena kurang mendapat cahaya matahari untuk proses pertumbuhannya. Pada rumpang umur 5 tahun tidak terdapat semai dipterocarpa, hal ini disebabkan tidak ditemukan pohon dipterocarpa usia produktif di dalam rumpang tersebut dan tidak terjadi sebaran biji dipterocarpa dari luar rumpang.

Permudaan tingkat pancang dengan diameter < 2 cm, mendominasi sebaran kelas diameter (Tabel 2). Pada rumpang umur 16 tahun diameter tingkat pancang maksimum mencapai 9,5 cm dari jenis *Shorea parvistipulata*, pada rumpang 5 tahun diameter maksimum 8,2 cm dari jenis *Shorea parvifolia*, dari pada rumpang 3 tahun diameter maksimum 6,5 cm dari jenis *Hopea sangal*.

Tabel 2. Jumlah batang sebaran kelas diameter tingkat pancang di dalam rumpang umur 16 tahun (R16), 5 tahun (R5) dan 3 tahun (R3)

Table 2. Number of saplings and their diameter class inside 16 years gaps, 5 years gaps and 3 years gaps

Nomor (Number)	Kelas Diameter (cm) (Diameter class)	Rumpang 16 tahun (16 years gap)	Rumpang 5 tahun (5 years gap)	Rumpang 3 tahun (3 years gap)
1.	$<1,0$	4	18	37
2.	1,0-1,9	39	45	43
3.	2,0-2,9	19	11	18
4.	3,0-3,9	5	3	10
5.	4,0-4,9	5	5	7
6.	5,0-5,9	3	8	6
7.	6,0-6,9	1	7	2
8.	$\geq 7,0$	2	7	-

Sumber: diolah dari data primer

Jenis pohon di dalam rumpang umur 5 tahun seluruhnya terdiri dari jenis dipterocarpaceae kecuali jenis laban (*Vitex pubescens*) termasuk jenis pionir. Jenis Dipterocarpaceae pada rumpang umur 16 tahun dan 5 tahun dapat dilihat pada Tabel 3. Pada rumpang 16 tahun, jumlah bidang dasar jenis Dipterocarpaceae adalah 1,57 m² dalam luas 0,2 ha atau setara dengan 7,85 m²/ha atau 62,8% dari jumlah total bidang dasar semua jenis dalam rumpang tersebut. Pada rumpang umur 5 tahun proporsi bidang dasar jenis Dipterocarpaceae meliputi 94% daripada jumlah total bidang dasar pohon dalam rumpang tersebut.

B. Komposisi Jenis

Permudaan tingkat semai, komposisi jenis dan struktur pada rumpang umur 3 tahun, 5 tahun dan 16 tahun tampak tidak sama. Pada rumpang 3 tahun jenis yang banyak ditemukan adalah jenis *Hopea sangal* termasuk famili Dipterocarpaceae, namun pada rumpang 5 tahun dan 16 tahun masing-masing adalah jenis *Diospyros densa* dan *Hydnocarpus*

sumtranus dimana jenis ini tidak termasuk jenis dari famili Dipterocarpaceae.

Demikian pula komposisi jenis dan struktur tingkat pancang dimana pada rumpang 3 tahun, jenis yang mendominasi adalah *Hopea sangal*, sedangkan pada rumpang umur 5 tahun dan rumpang 16 tahun didominasi oleh jenis *Shorea parvifolia* dan *Shorea parvistipulata*. Ketiga jenis ini termasuk famili Dipterocarpaceae. Permudaan tingkat pohon di rumpang umur 5 tahun dan 16 tahun masing-masing didominasi jenis *Shorea parvifolia* dan *Shorea johorensis* dimana keduanya juga termasuk famili Dipterocarpaceae. Data pengukuran permudaan tingkat tingkat pohon, tingkat pancang dan tingkat semai pada masing-masing rumpang buatan umur 16 tahun (R16), rumpang umur 5 tahun (R5) dan rumpang umur 3 tahun (R3), dapat dilihat pada Lampiran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8.

Untuk mengetahui banyaknya jenis Dipterocarpaceae pada rumpang 16 tahun dan 5 tahun, disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Jenis Dipterocarpaceae pada rumpang umur 16 tahun dan 5 tahun di Kintap Kalimantan Selatan

Table 3. Dipterocarpaceae species inside 16 years and 5 years gaps at Kintap, South Kalimantan

Nomor (Number)	Rumpang (Gap)	Nama Jenis (Species)	Jumlah (bgt) (Amount)	Bidang dasar (cm ²) (Basic Field)
1.	16 tahun (0,2 ha)	<i>Shorea johorensis</i>	36	12.468,2
		<i>Shorea parvifolia</i>	7	2.111,2
		<i>Shorea parvistipulata</i>	5	1.112,7
		Total	48	15.692,1 (=7,85 m ² /ha)
2.	5 tahun (0,2 ha)	<i>Shorea johorensis</i>	2	208,9
		<i>Shorea parvifolia</i>	11	1.183,2
		<i>Shorea parvistipulata</i>	4	796,7
		Total	17	1.737,1 (=0,85 m ² /ha)

Sumber: diolah dari data primer

Menurut hasil penelitian Elias (1996) di hutan hujan tropis bekas tebangan umur 1 tahun dan 2 tahun mengatakan bahwa jenis *Shorea laevifolia* dan *Hopea sangal* adalah merupakan jenis yang berkembang baik pada kondisi saat itu.

Dari uraian di atas tampak bahwa rumpang ("gap") sangat berperan terhadap dinamika

yang terjadi pada vegetasi yang menempati rumpang tersebut. Whitmore (1978) melaporkan bahwa dengan adanya rumpang memberikan kemungkinan cahaya masuk mencapai lantai hutan yang sudah tentu dapat meningkatkan laju dekomposisi.

Lebih lanjut Jordan (1985) mengemukakan bahwa dengan tersedianya rumpang (celah)

yang terbuka ke langit pada tegakan hutan, cahaya matahari dapat mencapai lantai hutan akan menciptakan kondisi temperatur tertentu yang merangsang mikro organisme pengurai seresah semakin aktif yang pada akhirnya akan melepaskan unsur hara yang terkandung di dalam seresah (batang pohon mati, daun-daunan dan ranting).

Keadaan ini tentu akan memberikan keuntungan bagi pertumbuhan dan perkembangan anakan alam sebagai material tegakan yang ada di dalam rumpang, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya relatif lebih cepat dibandingkan pada lokasi di bawah naungan. Namun bila dilihat dari hasil analisis tanah baik rumpang umur 3 tahun, 5 tahun dan 16 tahun, status kesuburannya tergolong rendah. Hal ini diduga bahwa intensitas cahaya yang mencapai lantai hutan tidak optimum bagi aktivitas mikro organisme pengurai, sehingga dekomposisinya relatif lambat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Riap rataan bidang dasar pohon di dalam rumpang umur 16 tahun adalah 0,78 m²/ha.

Diameter maksimum tingkat pancang pada tiap rumpang seluruhnya terdiri dari jenis Dipterocarpa. Pada rumpang 16 tahun diameter maksimum pancang adalah 9,5 cm dari jenis *Shorea parvistipulata*, pada rumpang 5 tahun adalah 8,2 cm dari jenis *Shorea parvifolia* dan pada rumpang 3 tahun sebesar 6,5 cm dari jenis *Hopea sangal*.

Diameter maksimum *Shorea parvifolia* tingkat pohon pada rumpang 16 tahun adalah 34,4 cm, sedangkan pada rumpang umur 5 tahun sebesar 14,0 cm.

Permudaan jenis klimaks akan tumbuh optimal pada iklim mikro rumpang bila mendapat sinar matahari cukup untuk proses pertumbuhannya. Tinggi permudaan pada rumpang umur 3 tahun berkisar 1,5 - 6,7 m, pada rumpang 5 tahun berkisar 1,6 - 8,1 m, sedangkan pada rumpang 16 tahun berkisar 9-20 m.

Pada rumpang umur 16 tahun dan 5 tahun permudaan tingkat pohon dan pancang

didominasi oleh jenis Dipterocarpa. Pada rumpang umur 3 tahun jenis semai Dipterocarpa juga mendominasi, sedangkan pada rumpang umur 16 tahun semai Dipterocarpa susah ditemukan dan pada rumpang 5 tahun semai Dipterocarpa juga susah ditemukan. Penutupan tajuk pada rumpang 16 tahun dapat menghambat perkecambahan maupun pertumbuhan semai Dipterocarpa, sedangkan pada rumpang 5 tahun belum terdapat jenis Dipterocarpa usia produktif dan penyebaran biji Dipterocarpa dari luar rumpang tidak terjadi.

Permudaan alam tingkat semai pada rumpang tebangan umur 3 tahun ditemukan sebanyak 9 jenis dimana jenis dominan adaalah *Hopea sangal* kemudian jenis *Diospyros densa* dan kayu pagar, sedangkan jenis lainnya relatif sedikit. Pada rumpang umur 5 tahun ditemukan 18 jenis dimana jenis *Diospyros densa* sebagai jenis yang mendominasi disusul jenis *Hydnocarpus polypetalus*, *Ardisia* sp. Dan *Alseodaphne* sp. Pada rumpang umur 16 tahun ditemukan sebanyak 25 jenis.

Permudaan alam tingkat pancang pada rumpang umur 3 tahun, 5 tahun dan 16 tahun ditemukan masing-masing 38 jenis dimana jenis dominan adalah *Hopea sangal* disusul jenis *Shorea johorensis* dan *Pouteria declutan*, 37 jenis (jenis dominan *Shorea parvifolia*, *Eusideroxylon zwageri* dan *Palaquium* sp) dan 60 jenis dengan jenis dominan adalah *Shorea parvistipulata* kemudian disusul oleh *Artocarpus* sp dan *Hydnocarpus polypetalus*.

Permudaan tingkat pohon pada rumpang umur 5 tahun ditemukan sebanyak 4 jenis dengan jenis dominan adalah *Shorea parvifolia*, sedangkan pada rumpang 16 tahun ditemukan sebanyak 21 jenis dimana jenis dominan adalah *Shorea johorensis*.

Jenis Dipterocarpa yang umum didapati di lokasi penelitian adalah *Shorea johorensis*, *Shorea parvifolia*, *Shorea parvistipulata* dan *Hopea sangal*. Pada rumpang umur 5 tahun terdapat 18 pohon (diameter > 10 cm) seluruhnya dari jenis Dipterocarpa kecuali satu jenis yaitu Laban (*Vitex pubescens*) yang termasuk jenis pionir.

Permudaan alam baik tingkat pohon, pancang dan semai ditemukan cukup berlimpah di rumpang tebangan yang dijadikan sbagai calon material tegakan oleh sebab itu penanaman perkayaan ("*enrichment planting*") seperti pada kegiatan TPTI tidak perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. 1993. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan nomor 38/KPTS/VIII-HM.3/93 tentang pedoman pembuatan dan pengukuran petak ukur permanen untuk pemantauan pertumbuhan dan riap hutan alam tanah kering bekas tebangan dan pedoman pembuatan dan pengukuran petak ukur permanen untuk pemantauan pertumbuhan dan riap hutan alam rawa dan payau bekas tebangan. Jakarta.
- Eijk-Bos, C. V., Endro S., Harbagung. 1988. Rancangan percobaan dan pendapatan plot permanen untuk pnelitian pertumbuhan dan riap hutan produksi dipterocarpaceae di kalimantan. Tropenbos Indonesia. Belanda.
- Elias, 1996. A Case Study on Forest Harvesting Damages, Structure and Composition Dynamic-Changes in The Residual Stand For Dipterocarps Forest in East Kalimantan, Indonesia. Rimba Indonesia, Vol. XXXI, No. 1.
- Jordan, C.F., 1985. Nutrient Cycling in Tropical Forest Ecosystem. John Wiley and Sons, Ltd.
- Saridan, A. 2005. Teknik Silvikultur untuk Pemuliaan Htuan Bekas Tebangan di Kalimantan Timur. Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kalimantan. Samarinda.
- Simmathiri A., Turnbull, J. M. 1998. A Review of Dipterocarps: Taxonomy, Ecology and Silviculture. Cifor. Bogor-Indonesia.
- Sutisna, M. 1992. Silvikultur Hutan Alam. Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Toumela, K. Kuusipalo, J., Adjers, G. & Vesa, L., 1994. Growth of Dipterocarp Seedling in Artificially Created Gaps : Experiment in A Logged-over Forest in South Kalimantan, Indonesia. In : Suhartoyo, H. & Hadriyanto, D. (Eds). Proceeding of The International Symposium on Asian Tropical Forest Management, Samarinda, Indonesia 13 – 15 September 1994. Hal: 124 -134, Pusrehut-UNMUL and JICA, Center For Reforestation Studies in The Troipical rain Forests, Samarinda, Indonesia.
- Whitmore, T.C., 1978. Tropical Rain Forest of The Far East. Clarendon Press, Oxford.
- Whitmore, T.C., 1984. Tropical Rain Forest of The Far East. Second Edition. Clarendon Press, Oxford.

Lampiran 1. Nama jenis Permudaan Tingkat Pohon yang ditemui pada Plot Penelitian rumpang buatan umur 16 tahun (R16)

Appendix 1. The name of tree species inside 16 years gap

Nomor (Number)	Jenis Permudaan (Species)	Nomor (Number)	Jenis Permudaan (Species)
1	2	1	2
1.	<i>Aporusa</i> sp.	12.	Jenis lain (?)
2.	<i>Arthocarpus</i> sp.	13.	<i>Durio acutifoilus</i>
3.	<i>Barringtonia</i> sp.	14.	<i>Gironniera subaequalinus</i>
4.	<i>Dacryodes rostrata</i>	15.	<i>Gluta wallichii</i>
5.	<i>Dialium</i> sp.	16.	<i>Litocarpus blumeanus</i>
6.	<i>Eusideroxylon zwageri</i>	17.	<i>Macaranga gigantea</i>
7.	<i>Myristica argentea</i>	18.	<i>Macaranga hypoleuca</i>
8.	<i>Ryporosa kostermansii</i>	19.	<i>Macaranga triloba</i>
9.	<i>Shorea johorensis</i>	20.	<i>Palaquium</i> sp.
10.	<i>Shorea parvifolia</i>	21.	<i>Podadenia</i> sp.
11.	<i>Shorea parvistipulata</i>		

Sumber: diolah dari data primer

Lampiran 2. Nama jenis Permudaan Tingkat Pancang yang ditemui pada Plot Penelitian rumpang buatan umur 16 tahun (R16)

Appendix 2. The name of saplings species inside 16 years gap

Nomor (Number)	Jenis Permudaan (Species)	Nomor (Number)	Jenis Permudaan (Species)
1.	<i>Aglaia</i> sp.	31.	<i>Macaranga</i> sp.
2.	<i>Alseodaphne ceratoxylon</i>	32.	<i>Mallotus echinatus</i>
3.	<i>Archidendron jiringa</i>	33.	<i>Mallotus</i> sp.
4.	<i>Artocarpus</i> sp.	34.	<i>Memecylon</i> sp.
5.	<i>Ardisia</i> sp.	35.	<i>Myristica cinerea</i>
6.	<i>Beilschmiedia</i> sp.	36.	<i>Myristica argentea</i>
7.	<i>Cinnamomum parthenoxylon</i>	37.	<i>Myristica maxima</i>
8.	<i>Crudia teysmannii</i>	38.	<i>Neonauclea calycina</i>
9.	<i>Cyathocalyx</i> sp.	39.	<i>Neoscortechinia kingii</i>
10.	<i>Dacryodes rostrata</i>	40.	<i>Palaquium</i> sp.
11.	<i>Dacryodes rugosa</i>	41.	<i>Palaquium rostratum</i>
12.	<i>Dialium</i> sp.	42.	<i>Polyalthia</i> sp.
13.	<i>Durio acutifoilus</i>	43.	<i>Planchonia valida</i>
14.	<i>Ervatamia macrocarpa</i>	44.	<i>Pouteria duclitan</i>
15.	<i>Eugenia</i> sp.	45.	<i>Podadenia</i> sp.
16.	<i>Eusideroxylon zwageri</i>	46.	<i>Ptemandra coerulescens</i>
17.	<i>Fagraea</i> sp.	47.	<i>Ryporosa kostermansii</i>
18.	<i>Ficus</i> sp.	48.	<i>Shorea ovalis</i>
19.	<i>Flacourtia</i> sp.	49.	<i>Shorea parvifolia</i>
20.	<i>Garcinia dioica</i>	50.	<i>Shorea leprosula</i>
21.	<i>Gironniera subaequalis</i>	51.	<i>Shorea johorensis</i>
22.	<i>Gluta wallichii</i>	52.	<i>Shorea parvistipulata</i>
23.	<i>Homalanthus populneus</i>	53.	<i>Sloanea</i> sp.
24.	<i>Hopea mengerawan</i>	54.	<i>Trycalysia</i> sp.
25.	<i>Hydnocarpus sumatranus</i>	55.	<i>Trioma malaccensis</i>
26.	<i>Hydnocarpus polypetalus</i>	56.	<i>Terminalia foetidissima</i>
27.	<i>Intsia palembanica</i>	57.	<i>Sauria</i> sp.
28.	<i>Gluta rengas</i>	58.	<i>Sindora leiocarpa</i>

29.	<i>Litsea roxburghii</i>	59.	<i>Strombosia javanica</i>
30.	<i>Litsea sp.</i>	60.	<i>Xanthophyllum heteropleurum</i>

Sumber: diolah dari data primer

Lampiran 3. Nama Jenis Permudaan Tingkat Semai yang ditemui pada Plot Penelitian pada rumpang buatan umur 16 tahun (R16)

Appendix 3. *The name of seedlings species inside 16 years gap*

Nomor (Number)	Jenis Permudaan (Species)	Nomor (Number)	Jenis Permudaan (Species)
1	2	1	2
1.	<i>Alseodaphne ceratoxylon</i>	14.	<i>Trycalysia sp.</i>
2.	<i>Ardisia sp.</i>	15.	<i>Trioma malaccensis</i>
3.	<i>Dialium sp.</i>	16.	<i>Artocarpus sp.</i>
4.	<i>Diospyros densa</i>	17.	<i>Aglaia sp.</i>
5.	<i>Ervatamia macrocarpa</i>	18.	<i>Gluta wallichii</i>
6.	<i>Eugenia sp.</i>	19.	<i>Hydnocarpus sumatranus</i>
7.	<i>Euphoria sp.</i>	20.	<i>Kayu pagar</i>
8.	<i>Garcinia diocia</i>	21.	<i>Neonauclea sp.</i>
9.	<i>Litsea sp.</i>	22.	<i>Palaquium sp.</i>
10.	<i>Lophopetalum sp.</i>	23.	<i>Pometia pinnata</i>
11.	<i>Mallotus echinatus</i>	24.	<i>Shorea parvifolia</i>
12.	<i>Polyalthia sp.</i>	25.	Jenis lain (?)
13.	<i>Shorea parvistipulata</i>		

Sumber: diolah dari data primer

Lampiran 4. Nama jenis Permudaan Tingkat Pohon yang ditemui pada Plot Penelitian rumpang buatan umur 5 tahun (R5)

Appendix 4. *The name of tree species inside 5 years gap*

Nomor (Number)	Jenis Permudaan (Species)	Nomor (Number)	Jenis Permudaan (Species)
1	2	1	2
1.	<i>Shorea johorensis</i>	3.	<i>Shorea parvistipulata</i>
2.	<i>Shorea parvifolia</i>	4.	<i>Vitex pubescens</i>

Sumber: diolah dari data primer

Lampiran 5. Nama Jenis Permudaan Tingkat Pancang yang ditemui pada Plot Penelitian rumpang buatan umur 5 tahun (R5)

Appendix 5. *The name of saplings species inside 5 years gap*

Nomor (Number)	Jenis Permudaan (Species)	Nomor (Number)	Jenis Permudaan (Species)
1	2	1	2
1.	<i>Aglaia sp.</i>	20.	<i>Macaranga sp.</i>
2.	<i>Aglaia tomentosa</i>	21.	<i>Mallotus sp.</i>
3.	<i>Alangium javanicum</i>	22.	<i>Myristica argentea</i>
4.	<i>Alseodaphne sp.</i>	23.	<i>Neonauclea sp.</i>
5.	<i>Aporosa sp.</i>	24.	<i>Nephelium mutabile</i>
6.	<i>Ardisia sp.</i>	25.	<i>Palaquium sp.</i>
7.	<i>Dacryodes rostrata</i>	26.	<i>Pengkunih</i>
8.	<i>Diospyros densa</i>	27.	<i>Polyalthia celebica</i>
9.	<i>Eugenia sp.</i>	28.	<i>Polyalthia sp.</i>
10.	<i>Eusideroxylon zwageri</i>	29.	<i>Quercus sp.</i>

Nomor (Number)	Jenis Permudaan (Species)	Nomor (Number)	Jenis Permudaan (Species)
1	2	1	2
11.	<i>Ficus sp.</i>	30.	<i>Shorea parvifolia</i>
12.	Gambir	31.	<i>Shorea parvistipulata</i>
13.	<i>Gardenia anisophylla</i>	32.	<i>Sauria sp.</i>
14.	<i>Gironniera subaequalis</i>	33.	<i>Strombosia javanica</i>
15.	<i>Gluta wallichii</i>	34.	<i>Terminalia foetidissima</i>
16.	<i>Hydnocarpus sumatranus</i>	35.	<i>Tricalysia sp.</i>
17.	<i>Hydnocarpus polypetalus</i>	36.	<i>Upas tadung</i>
18.	<i>Macaranga hypoleuca</i>	37.	<i>Vitex pubescens</i>
19.	<i>Macaranga triloba</i>		

Sumber: diolah dari data primer

Lampiran 6. Nama Jenis Permudaan Tingkat Semai yang ditemui pada Plot Penelitian rumput buatan umur 5 tahun (R5)

Appendix 6. The name of seedlings species inside 5 years gap

Nomor (Number)	Jenis Permudaan (Species)	Nomor (Number)	Jenis Permudaan (Species)
1	2	1	2
1.	<i>Aglaia dookoo</i>	20.	<i>Hydnocarpus polypetalus</i>
2.	<i>Alangium javanicum</i>	21.	<i>Ixora sp.</i>
3.	<i>Alseodaphne sp.</i>	22.	<i>Litsea sp.</i>
4.	<i>Ardisia sp.</i>	23.	<i>Mallotus sp.</i>
5.	Belayang merah (?)	24.	Mardupa (?)
6.	<i>Dialium sp.</i>	25.	<i>Polyalthia celebica</i>
7.	<i>Diospyros densa</i>	26.	<i>Shorea parvistipulata</i>
8.	<i>Eusideroxylon zwageri</i>	27.	Siah-siah (?)
9.	<i>Ficus sp.</i>	28.	Siah-siah (berdaun lebar)

Sumber: diolah dari data primer

Lampiran 7. Nama Jenis Permudaan Tingkat Pancang yang ditemui pada Plot Penelitian rumput buatan umur 3 tahun (R3)

Appendix 7. The name of sapling species inside 3 years gap

Nomor (Number)	Jenis Permudaan (Species)	Nomor (Number)	Jenis Permudaan (Species)
1	2	1	2
1.	<i>Artocarpus elasticus</i>	20.	<i>Hopea sangal</i>
2.	<i>Artocarpus sp.</i>	21.	<i>Hydnocarpus polypetalus</i>
3.	<i>Basung paradah</i>	22.	Ketuyung (?)
4.	<i>Beilschmiedia sp.</i>	23.	<i>Litsea roxburghii</i>
5.	<i>Bridelia sp.</i>	24.	<i>Litsea sp.</i>
6.	<i>Cratozylum sp.</i>	25.	<i>Lophopetalum sp.</i>
7.	<i>Croton argyratus</i>	26.	<i>Macaranga hypoleuca</i>
8.	<i>Dillenia axcelsa</i>	27.	<i>Mallotus echinatus</i>
9.	<i>Diospyros curraniopsis</i>	28.	<i>Memecylon sp.</i>
10.	<i>Dipterocarpus sp.</i>	29.	<i>Myristica sp.</i>
11.	<i>Duabanga moluccana</i>	30.	<i>Neonauclea calycina</i>
12.	<i>Durio acutifoilus</i>	31.	<i>Podadenia sp.</i>
13.	<i>Eugenia sp.</i>	32.	<i>Polyalthia celebica</i>
14.	<i>Eusideroxylon zwageri</i>	33.	<i>Pouteria declutan</i>

15.	<i>Ficus</i> sp.	34.	<i>Ptenandra coerulescens</i>
16.	<i>Flacourtia</i> sp.	35.	<i>Shorea johorensis</i>
17.	<i>Geunsia pentandra</i>	36.	<i>Shorea parvifolia</i>
18.	<i>Gironniera subaequalis</i>	37.	<i>Shorea parvistipulata</i>
19.	<i>Gluta wallichii</i>	38.	Tapin (?)

Sumber: diolah dari data primer

Lampiran 8. Nama Jenis Permudaan Tingkat Semai yang ditemui pada Plot Penelitian rumpang buatan umur 3 tahun (R3)

Appendix 8. The name of seedling species inside 3 years gap

Nomor (Number)	Jenis Permudaan (Species)	Nomor (Number)	Jenis Permudaan (Species)
1	2	1	2
1.	<i>Diospyros densa</i>	6.	Kayu pagar (?)
2.	<i>Eugenia</i> sp.	7.	<i>Palaquium</i> sp.
3.	<i>Hopea sangal</i>	8.	<i>Polyalthia celebica</i>
4.	<i>Hydnocarpus</i>	9.	<i>Strombosia javanica</i>
5.	<i>Ixora</i> sp.		

Sumber: diolah dari data primer