ANATOMI PEPAGAN PULAI DAN BEBERAPA JENIS SEKERABAT

Bark Anatomy of Pulau and Several Related Species

Oleh/By:

Y. I. Mandang

ABSTRACT

Bark anatomy of white pulau (Alstonia scholaris R.Br.), black pulau (Alstonia angustiloba Miq.) and bintaro (Cerbera manghas L.) were observed and described for identification purposes. These plants have been used as sources of traditional medicine in South East Asia. Bark of these trees exudes white gum when it was cut; the inner parts are white. The outer surfaces of A. scholaris and C. manghas are gray and usually lenticellate; the outer surface of A. angustiloba contains no lenticel, and the colour is dark brown, with narrow and shallow longitudinal fissures. The main components of bark are phloem, parenchyma, ray, fibre, sclereid and periderm. Fibres are tangentially arranged near the cambium of juvenile stem of all species, then pushed outward by cambium activity as the age of the plant increased. Sclereids were few and thin walled while the plants were young and then increased in quantity and in cell wall thickness as the plants become mature. The main anatomical differences between bark of these plants were in the morphology of the sclereids. Sclereids of A. scholaris are short and chubby, sclereid of A. angustiloba are long and stout while those of C. manghas are long and slender. A tentative identification key is presented.

Keywords: *Alstonia scholaris*, *Alstonia angustiloba*, *Cerbera manghas*, *bark anatomy*.

ABSTRAK

Karakteristik anatomi pepagan pulau putih (*Alstonia scholaris* R.Br.), pulau hitam (*Alstonia angustiloba* Miq.) dan bintaro (*Cerbera manghas* L.) sudah diamati dan dipertelakan guna keperluan identifikasi jenis. Ketiganya diketahui telah lama digunakan sebagai sumber bahan baku obat tradisional di Asia Tenggara. Pepagan ketiga jenis pohon tersebut mengeluarkan getah berwarna putih pada waktu ditetak; bagian dalam pepagan semuanya berwarna putih; permukaan luar pepagan *Alstonia scholaris* dan *Cerbera manghas* berwarna kelabu dan biasanya mengandung lentisel; permukaan luar pepagan *Alstonia angustiloba* tanpa lentisel, berwarna coklat gelap, dan mengandung alur-alur longitudinal yang sempit dan dangkal. Komponen utama pepagan terdiri dari floem, parenkim, jari-jari, serat, sklereid dan periderm. Serat dijumpai berderet tangensial dekat kambium pada pepagan batang belia semua jenis kemudian terdorong keluar oleh aktivitas kambium dan terpencar sejalan dengan meningkatnya usia pohon. Sklereid jarang dan berdinding tipis tatkala pohon masih muda lalu bertambah banyak dan menebal dindingnya sejalan dengan bertambahnya usia pohon. Selanjutnya, beda utama struktur anatomi pepagan ketiga jenis pohon tersebut adalah pada morfologi sklereid. Sklereid *A. scholaris* berbentuk gemuk pendek, sklereid *A. angustiloba* berbentuk panjang gemuk, sedangkan sklereid *Cerbera manghas* berbentuk panjang langsing. Kunci identifikasi sementara disajikan.

Kata kunci: *Alstonia scholaris*, *Alstonia angustiloba*, *Cerbera manghas*, anatomi pepagan.

I. PENDAHULUAN

Salah satu kelompok hasil hutan yang potensial dan dewasa ini sedang mendapat perhatian adalah tumbuhan obat (Wardoyo, dalam Zuhud, 1991; Triyono, 2003). Menurut Hamid *et al.* (1991), di Indonesia tumbuh lebih dari 30 000 jenis tumbuhan. Dari jumlah itu tidak kurang dari 1000 jenis diketahui dapat digunakan sebagai bahan baku obat (Amzu dan Haryanto, 1991). Setiap jenis tumbuhan mengandung puluhan komponen kimia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan mega-gudang bahan kimia.

Minat terhadap tumbuhan obat tradisional semakin meningkat karena 3 alasan utama: (1) masyarakat makin sadar akan perlunya menjaga kesehatan, antara lain dengan minum jamu secara teratur; (2) harga obat tradisional yang umumnya terjangkau oleh hampir seluruh lapisan masyarakat; (3) khawatir akan efek samping dari obat modern, masyarakat mulai mengalihkan perhatian kembali pada obat tradisional. Hal ini mendorong pesatnya pertumbuhan usaha tanaman obat dan jamu. Bahkan pabrik obat modern sudah mulai mengembangkan obat-obatan dari tumbuhan dengan teknik pengolahan modern (Suprana, dalam Zuhud, 1991). Produknya dikenal dengan nama fitofarmaka untuk membedakannya dari istilah "jamu".

Puslitbang Teknologi Hasil Hutan sering diminta penerbitan sertifikat mengenai identitas hasil hutan namun kemampuan dalam hal tersebut masih terbatas pada material yang berupa kayu untuk bahan konstruksi, mebel dan barang kerajinan saja. Kemampuan identifikasi material berupa bahan baku obat masih sangat terbatas. Penelitian mengenai identifikasi tumbuhan yang berkhasiat obat di Puslitbang Teknologi Hasil Hutan baru dimulai. Oleh karena itu hasilnya belum banyak. Namun dapat kami laporkan bahwa dalam tahun 2002 sudah diselesaikan penelitian mengenai 5 jenis kayu gaharu yang tercakup dalam marga *Aetoxylon*, *Aquilaria*, *Gyrinops* dan *Gonystylus*, dari suku Thymeleaceae. Tujuannya untuk mengetahui cara memilah-milahkan kayu gaharu. Masalahnya kualitas gaharu dari jenis-jenis tersebut tidak sama, dan ada diantaranya yang sudah dimasukkan ke dalam Appendix II CITES karena dikuatirkan kelestariannya.

Ada dua masalah penting dalam penyediaan bahan baku obat dari hutan ke industri jamu dan fitofarmaka yaitu: a) suplai bahan baku obat ke industri jamu dan fitofarmaka seringkali keliru dan tercampur dengan bahan lain yang tampak serupa karena kurang tersedianya pedoman identifikasi bahan yang handal; b) bahan yang disuplai juga seringkali kurang baik mutunya atau kandungan bahan aktif yang tidak memadai, karena penyebab yang belum diketahui, apakah oleh pengaruh umur, tempat tumbuh, atau mungkin musim.

Pulai (*Alstonia scholaris* R.Br.) merupakan salah satu dari 10 anggota marga *Alstonia* di Asia Tenggara yang pepagannya sudah diketahui berkhasiat obat, tetapi karakteristik pepagannya sendiri belum dipertelakan secara anatomi sehingga belum ada landasan yang kuat untuk identifikasinya. Perbedaannya dengan pepagan *Alstonia* lainnya juga belum diketahui.

Morfologi *A. scholaris* sudah diuraikan oleh Whitmore (1972) namun karakteristik pepagannya belum diuraikan secara rinci. Hal ini perlu diketahui untuk dasar pengenalan dan pembedaannya dari pepagan jenis kayu lain yang secara sepintas tampak serupa.

Anatomi pepagan tumbuhan secara umum sudah diuraikan oleh Esau (1977). Khusus mengenai struktur floem dalam hubungannya dengan fungsi, sudah diuraikan secara rinci oleh Crafts dan Crisp (1971). Anatomi perbandingan pepagan tumbuhan belum banyak dipelajari. Furuno meneliti 55 jenis pohon dan didapatkan bahwa setiap individu jenis mempunyai kombinasi karakternya masing-masing. Selanjutnya Trockenbrodt (1991, 1994) mendapatkan adanya perubahan karakteristik kualitatif mau pun kuantitatif sehubungan

dengan umur dari 4 jenis pohon yang diamatinya. Berdasarkan pertimbangan diatas maka dalam meneliti pepagan pulai perlu diperhatikan jenis botanis mau pun umurnya.

Penelitian ini bertujuan menyediakan informasi karakteristik anatomi pepagan kayu pulai dari berbagai umur. Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya informasi ilmiah mengenai karakteristik anatomi pepagan pulai dari berbagai umur yang dapat digunakan untuk pengenalan dan pemanfaatannya yang tepat. Luaran yang akan dihasilkan berupa petunjuk identifikasi dan pemilahan pepagan pulai.

II. BAHAN DAN METODE

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Anatomi Kayu Puslitbang Teknologi Hasil Hutan di Bogor dengan bahan yang diperoleh dari Kabupaten Lebak, Propinsi Banten.

B. Bahan dan Alat Penelitian

Bahan yang diteliti berupa pepagan pohon pulai, *Alstonia scholaris* R.Br. dan *Alstonia angustiloba* Miq., suku Apocynaceae. Sebagai pembanding digunakan pepagan bintang (Cerbera manghas L), salah satu jenis dari suku yang sama. Contoh uji dikumpulkan dari desa Ciluwu, Kecamatan Pajagan, Kabupaten Lebak, Banten. Contoh dikumpulkan dari 2 kelompok umur: a) muda, diameter 20 cm, b) dewasa, diameter 30 cm. Untuk medalami pengaruh umur, dikumpulkan juga contoh pepagan dari pohon belia berdiameter 5 – 7 cm.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) mikrotom gelincir untuk pembuatan preparat sayat, 2) mikroskop cahaya yang dilengkapi dengan kamera untuk pengamatan ciri mikroskopik.

C. Prosedur

Ciri yang diamati meliputi ciri umum dan anatomi. Ciri umum yang diamati meliputi: warna, tekstur, alur, pengelupasan, tebal, warna sayatan kulit dalam dan ada tidaknya eksudat. Ciri anatomi yang diamati meliputi floem, jari-jari, parenkim, serat, sklereid dan periderm. Pengamatan dilakukan pada preparat sayat dan maserasi yang dibuat dengan cara berikut: bahan difiksasi dengan larutan formalin asam asetat (FAA) segera setelah diambil dari pohon. Setiba di laboratorium, bahan dicuci dengan air mengalir selama 1 malam. Sesudah itu bahan direndam dalam alkohol 70 persen. Selanjutnya bahan diinfiltrasi dengan poly ethylene glycol 2000 menurut petunjuk Richter (1990). Contoh pepagan dimasukkan ke dalam gelas berisi larutan 20 persen PEG 2000 dalam etanol. Sesudah itu gelas berisi contoh tersebut dimasukkan kedalam oven dengan suhu 60°C selama 3 – 4 hari sampai semua etanol menguap. Penyayatan dilakukan dengan mikrotom gelincir. Untuk membantu agar jaringan tidak sobek, permukaan yang akan disayat dilapisi dengan pita pelekat ("scotch tape"). Selanjutnya pewarnaan dengan safranin dilakukan di kala jaringan masih melekat pada pita.

Ciri anatomi yang diamati meliputi komposisi jaringan, dimensi pembuluh tapis, komposisi dan dimensi jari-jari, sebaran serat, susunan dan dimensi sklereid, inklusi mineral silika dan kristal. Pengamatan dimensi pembuluh dan sklereid dilakukan pada preparat maserasi. Preparat maserasi dibuat dengan memanaskan sepotong bahan pepagan dalam campuran asam asetat glasial dan hidrogen peroksida 1: 1 selama 2 kali 6 jam atau sampai sel-sel mudah terpisah. Bahan yang hampir terurai dicuci dengan air kran sebanyak

3 kali, diwarnai dengan safranin, lalu diamati di bawah mikroskop dengan media gliserin. Istilah anatomi pepagan kayu yang digunakan mengikuti definisi Trockenbrodt (1990) dan Junika (1994) yang di Indonesiakan atau dialih-bahasakan kedalam bahasa Indonesia.

D. Analisis Data

Pengamatan ciri kuantitatif dilakukan pada 5 sampai 25 elemen anatomi per contoh pepagan. Ciri kuantitatif dinyatakan dalam bentuk selang: $\bar{X} \pm t_{0,05} SX$, di mana $\bar{X}$ adalah nilai rata-rata, SX adalah standar eror dan t adalah nilai dalam tabel distribusi t pada tingkat kepercayaan 95%.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pulai Putih (*Alstonia scholaris*)

Lihat gambar 1, 7-12.

Warna permukaan pepagan kelabu sampai agak hitam; permukaan berbintil-bintil lentisel; tebal 6 – 8 mm; bagian dalam berwarna putih; pada waktu ditetak mengeluarkan getah berwarna putih. *Pembuluh tapis*: panjang $702 \pm 86 \mu\text{m}$, diameter $42 \pm 3,9 \mu\text{m}$. *Lempeng tapis*: horisontal sampai miring, mengandung 1 – 6 bidang tapis. *Serat*: sangat panjang, pada pohon muda berderet tangensial dekat kambium, pada pohon dewasa tersebar. *Sklereid*: sedikit dan berdinding tipis waktu pohon masih muda kemudian menjadi banyak dan dindingnya menebal sejalan dengan meningkatnya usia pohon; individu sklereid berbentuk gemuk pendek, panjang $198-220 \mu\text{m}$, diameter $99-113 \mu\text{m}$, hampir isodiametrik. *Jari-jari*: heteroselular dengan satu jalur sel tegak, lebar 1-2 seri, umumnya 2 seri, tinggi rata-rata $565 \pm 49 \mu\text{m}$, frekuensi $8,7 \pm 0,8$ per mm. *Inklusi mineral*: kristal ada, banyak dalam feloderm dan sedikit dalam parenkim.

B. Pulai Hitam (*Alstonia angustiloba*)

Lihat Gambar 3, 13-14.

Permukaan pepagan coklat gelap, dengan alur-alur vertikal yang dangkal dan sempit; tebal 5 – 10 mm, bagian dalam berwarna putih; bila ditetak mengeluarkan getah berwarna putih. *Pembuluh tapis*: panjang $715 \pm 74 \mu\text{m}$, diameter $36 \pm 0,6 \mu\text{m}$. *Lempeng tapis*: horisontal sampai miring, mengandung 1 – 6 bidang tapis. *Serat*: pada pohon muda berderet tangensial dekat kambium, pada pohon dewasa tersebar. *Sklereid*: berbentuk panjang gemuk, berdinding tipis waktu pohon masih muda dan berdinding tebal pada pohon dewasa; panjang beragam dari 315 – 1498 μm , tetapi umumnya lebih dari 1300 μm ; diameter 175 - 261 μm , dan umumnya berkelompok dan berderet tangensial. *Jari-jari*: heteroselular dengan satu jalur sel tegak, lebar 1-2 seri, umumnya 2 seri, tinggi rata-rata $585 \pm 44 \mu\text{m}$, frekuensi $7,6 \pm 0,6$ per mm. *Inklusi mineral*: kristal ada, berderet vertikal dalam parenkim dan beberapa dalam feloderm walau tidak banyak.

C. Bintaro (*Cerbera manghas*)

Lihat Gambar 5, 15-18.

Permukaan pepagan kelabu, halus atau berbintil lentisel; tebal 4 -13.5 mm; bagian dalam berwarna putih; bila ditetak mengeluarkan getah berwarna putih. *Pembuluh tapis*: panjang $678 \pm 16 \mu\text{m}$, diameter $44 \mu\text{m}$. *Lempeng tapis*: horisontal sampai miring dengan 1 - 11 bidang tapis. *Serat*: pada pohon muda berderet tangensial dekat kambium, pada pohon dewasa tersebar. *Sklereid*: berbentuk panjang langsing ke arah longitudinal, panjang $957 \pm 157 \mu\text{m}$ dengan diameter $67 \pm 11 \mu\text{m}$ pada pohon muda ($\varnothing$ 20 cm) dan tidak menunjukkan peningkatan yang nyata setelah pohon dewasa ($\varnothing$ 50 cm); susunannya

berkelompok dan berderet tangensial. *Jari-jari*: heteroselular dengan 1 jalur sel tegak atau lebih, lebar 1-2 seri, tinggi rata-rata $401 \pm 4 \mu\text{m}$, frekuensi $9.8 \pm 1,1$ per mm. *Inklusi mineral*: kristal ada, berderet vertikal dalam parenkim.

Gambar 1. *Alstonia scholaris*: permukaan pepagan, skala 10 cm.;
Gambar 2. *Alstonia scholaris*: penampang lintang kayu, skala = 200 μm).

Fig. 1. *Alstonia scholaris*: bark surface, scale bar = 10 cm;

Fig. 2. *Alstonia scholaris*: transverse surface of wood, scale bar = 200 μm

Gambar 3. *Alstonia angustiloba*: permukaan pepagan, skala 15 cm;
Gambar 4. *Alstonia angustiloba* : penampang lintang kayu, skala = 200 μ m.

Fig. 3. *Alstonia angustiloba*: bark surface, scale bar= 15 cm;

Fig. 4. *Alstonia angustiloba*: transverse surface of wood, scale bar = 200 μ m

Gambar 5. *Cerbera manghas*: permukaan pepagan pohon remaja, skala 10 cm;

Gambar 6. *Cerbera manghas* : penampang lintang kayu, skala = 200 μ m.

Fig. 5. *Cerbera manghas*: bark surface of young tree, scale bar = 10 cm;

Fig. 6. *Cerbera manghas*, transverse surface of wood, scale bar = 200 μ m

Gambar 7-8. Pepagan *Alstonia scholaris* belia (diameter 7 cm): penampang radial, skala = 200 μm .: r = ritidom; fl = felem; fg = felogen; fd = feloderm; p = parenkim; skl = sklereid

Fig. 7-8. Bark of juvenile *Alstonia scholaris* (diameter 7 cm): radial surface, scale bar = 200 μm ; r = rhytidome; fl = phellem; fg = phellogen; fd = phelloderm; p = parenchyma; skl = sclereid

Gambar 9-12. *Alstonia scholaris*. 9) pepagan pohon muda (diameter 20 cm); 10) pepagan pohon dewasa (diameter 30 cm), penampang lintang bagian luar; 11) pepagan pohon dewasa, penampang lintang bagian dalam; 12) pepagan pohon dewasa, penampang radial. Skala= 200 μ m; r = ritidom; fl = felem; fd = feloderm; p = parenkim; skl = sklereid. j = jari-jari; jd= jari-jari terdilatasi.

Figure 9-12. *Alstonia scholaris*. 9) bark of young tree (diameter 20 cm). 10) bark of mature tree (diameter 30 cm), transverse surface of outer portion; 11) bark of mature tree, transverse surface of inner portion; 12) bark of mature tree, radial surface. Scale bar = 200 μ m; r = rhytidome; fl = phellem; fd = phelloderm; p = parenchyma; skl= sklereid; j = ray; jd = dilated ray

Gambar 13-14. Pepagan *Alstonia angustiloba*: 13) penampang lintang pepagan bagian dalam, skala 200 μm . 14) penampang radial pepagan bagian dalam, skala = 200 μm ; skl = sklereid.

Fig. 13-14. Bark of *Alstonia angustiloba*: 13) transverse surface of inner portion, scale = 200 μm ; 14) radial surface of inner portion, scale = 200 μm ; skl = sklereid

Gambar 15-16. *Cerbera manghas*, pepagan pohon belia (diameter 5 cm): 15) penampang lintang, 16) penampang radial: skala = 200 μm ; fl = felem; fg = felogen; fd = feloderm; p = parenkim; s = serat; skl = sklereid.

(Fig. 15-16. *Cerbera manghas*, bark of juvenile tree (diameter 5 cm). 15) transverse surface, 16) radial surface; scale bar = 200 μm ; fl = phellem; fg = phellogen; fd = phleloderm; p = parenchyma; s = fibre; skl = sklereid)

Gambar 17-18. *Cerbera manghas*, pepagan pohon dewasa (diameter 50 cm): 17) penampang lintang, 8) penampang radial: skala = 200 μ m; r = ritidom; fl = felem; fg = fellogen; fd = feloderim; p = parenkim; s = serat; skl = sklereid.

Fig. 17-18. *Cerbera manghas*, bark of mature tree (diameter 50 cm). 17) transverse surface, 18) radial surface; scale bar = 200 μ m; r = rhytidome; fl = phellem; fg = phellogen; fd = phelloderm; p = parenchyma; skl = sclereid)

Dari pertelaan di atas dapat diketahui bahwa ketiga jenis pohon tersebut mempunyai pepagan yang mengeluarkan getah putih bila ditetak. (Tabel 1). Selanjutnya dapat diketahui pula bahwa karakteristik permukaan pepagan ketiga jenis pohon yang diamati dapat berbeda dalam hal warna, derajat kehalusan dan kehadiran lentisel. *Alstonia scholaris* dan *Cerbera manghas* mempunyai pepagan yang permukaan luarnya berwarna kelabu, relatif halus kecuali adanya tonjolan-tonjolan lentisel yang tersebar merata (Gambar 1 dan 5). Di lain pihak, *Alstonia angustiloba* mempunyai pepagan yang bagian terluarnya berwarna coklat gelap, tanpa lentisel tetapi mengandung alur berupa retakan longitudinal agak dangkal (Gambar 3). Ketebalan pepagan antara 4-14 mm, dipengaruhi oleh umur pohon. Makin tua pohonnya makin tebal pepagannya (Tabel 1). Warna bagian dalam semua sama yaitu putih.

Struktur anatomi pepagan pada dasarnya sama pada setiap jenis pohon, yaitu terdiri atas tiga lapisan utama: a) jaringan gabus atau periderm, b) parenkim dan sklerenkim, c) floem. Lapisan pepagan aktif terdiri dari pembuluh tapis, parenkima dan jari-jari. Pada pepagan pohon belia dan muda masih tampak ada serat yang tersusun berderet tangensial dekat kambium. Jari-jari jelas mengalami dilatasi karena tekanan akibat batang pohon yang membesar (Gambar. 11). Periderm terdiri dari 3 lapisan yaitu: felem, felogen dan feloderim.

Pembuluh tapis tidak tegas terlihat pada penampang lintang karena diameternya yang hampir sama dengan parenkim, namun cukup terlihat pada penampang radial atau pada preparat maserasi. Bentuknya panjang langsing dengan ukuran panjang yang tidak jauh berbeda satu sama lain yaitu panjang sekitar 700 μ m dan diameter sekitar 40 μ m (Tabel 2). Lempeng tapis biasanya miring tetapi ada juga yang horisontal pada semua jenis yang

diamati . Lempeng tapis horisontal biasanya hanya mengandung satu bidang tapis tetapi lempeng tapis yang miring mempunyai bidang tapis antara 1- 6 bidang tapis pada pepagan kedua jenis pulau dan 1 – 5 (-11) bidang tapis pada pepagan bintang.

Tabel 1. Perbandingan karakteristik pepagan

Table 1. Comparison of bark characteristics

No.	Karakter (Characters)	<i>Alstonia scholaris</i>	<i>Alstonia angustiloba</i>	<i>Cerbera manghas</i>
1	Warna permukaan (Surface colour)	Kelabu (Gray)	Coklat gelap (Dark brown)	Kelabu (Gray)
2	Lenti sel (Lenticel)	Ada (Present)	Tidak ada (Absent)	Ada (Present)
3	Retak vertikal (Vertical fissures)	Tidak ada (Absent)	Ada (Present)	Tidak ada (Absent)
4	Exudat (Exudate)	Getah putih (White gum)	Getah putih (White gum)	Getah putih (White gum)
5	Tebal (Thickness)	6-8 mm	4-10 mm	4.7-13.5 mm
6	Warna bagian dalam (Colour of inner portion)	Putih (White)	Putih (White)	Putih (White)

Tabel 2. Perbandingan dimensi pembuluh tapis

Table 2. Comparison of sieve tube dimension

No.	Jenis pohon (Tree species)	Panjang (Length), μm	Diameter (Diameter), μm
1	<i>Alstonia scholaris</i>	702	42
2	<i>Alstonia angustiloba</i>	715	36
3	<i>Cerbera manghas</i>	678	44

Tabel 3. Perbandingan dimensi sklerenkim

Table 3. Comparison of sclereid dimension

No.	Jenis pohon (Tree species)	Umur (Age)	Dimensi (μm)	
			Panjang (Length)	Diameter (Diameter)
1	<i>Alstonia scholaris</i>	Muda (Young)	239	136
		Dewasa (Mature)	230	111
2	<i>Alstonia angustiloba</i>	Muda-a (Young-a)	315	175
		Muda-b (Young b)	1164	261
3	<i>Cerbera manghas</i>	Dewasa (Mature)	1498	260
		Muda (Young)	957	67
		Dewasa (Mature)	935	58

Tabel 4. Dimensi jari-jari pepagan

Table 4. Bark ray dimension

No.	Jenis pohon (Tree species)	Tinggi jari-jari (Ray height), μm	Frekuensi jari-jari (Ray frequency), per mm
1	<i>Alstonia scholaris</i>	565	8.7
2	<i>Alstonia angustiloba</i>	585	7.6
3	<i>Cerbera manghas</i>	401	9.8

Serat dijumpai pada pohon belia dan muda, berderet tangensial dekat kambium (Gambar 8, 15, 16). Pada pohon dewasa tampaknya serat tidak lagi dibentuk. Serat yang terbentuk pada waktu muda terdorong keluar akibat batang pohon yang membesar sehingga menjadi terpecar di antara jaringan parenkim.

Kristal prisma umum dijumpai pada ketiga jenis pepagan yang diamati. Pada *A. angustiloba* dan *Cerbera manghas*, kristal berderet vertikal dalam parenkim sedangkan pada *A. scholaris*, kristal terpecar dalam sel sel parenkim dan juga dalam feloderm.

Sklereid berdinding tipis dan jarang pada waktu muda (Gambar. 7, 8) bertambah banyak sejalan dengan bertambahnya umur pohon (Gambar. 9, 10, 11, 12) tetapi diameternya cenderung mengecil. Hal ini tampaknya disebabkan oleh pembelahan sel yang menghasilkan sel dengan ukuran lebih kecil (Tabel 3; Gmb. 11, 12). Jumlahnya juga bertambah dengan meningkatnya usia pohon. Sklereid tersusun dalam kelompok-kelompok yang berderet tangensial disebelah luar jaringan aktif, disebelah dalam periderm. Bentuk dan ukurannya dapat berbeda menurut jenis (Tabel 3): umumnya panjang gemuk pada *A. angustiloba* (Gambar. 13, 14), pendek gemuk pada *A. scholaris* (Gambar. 11-12), dan panjang langsing pada *C. manghas* (Gambar 17, 18). Sklereid pada *A. angustiloba* muda tampaknya lebih beragam, ada yang tidak terlalu panjang tetapi ada juga yang sudah sama panjangnya dengan sklereid pada pohon dewasa (Tabel 3). Penyebab perbedaan yang mencolok ini belum diketahui, apakah karena faktor genetik atau faktor umur.

Jari-jari pada ketiga jenis pepagan yang diamati semua heteroselular dengan lebar 1-2 seri, umumnya 2 seri pada kedua jenis *Alstonia* dan 1 dan 2 seri dalam perbandingan yang kurang lebih sama pada *Cerbera*. Karakteristik jari-jari pada pepagan tampaknya sama dengan karakteristik jari-jari pada kayunya masing-masing. Tinggi dan frekuensi jari-jari pada pepagan kedua jenis pulai hampir sama sedangkan pada pepagan *Cerbera* menunjukkan nilai yang lebih rendah untuk tinggi jari-jari dan nilai yang lebih tinggi untuk frekuensi jari-jari.

Dari uraian di atas dapat dibuat kunci sementara untuk identifikasi pepagan pulai dan bintaro sebagai berikut:

D. Kunci Identifikasi

- Pepagan ditetak mengeluarkan getah berwarna putih.....1
- 1. a. pepagan luar berwarna kelabu, biasanya dengan lentisel.....2
 - b. pepagan luar berwarna coklat, dengan retak retak longitudinal yang tegas, sklereid umumnya panjang gemuk.....*Alstonia angustiloba*
- 2.a. sklereid pendek gemuk, dan dalam feloderm mengandung banyak kristal
 -*Alstonia scholaris*
 - b. sklereid panjang langsing.....*Cerbera manghas*

Kunci tersebut di atas perlu diperluas dengan mengamati lebih lanjut jenis jenis pepagan pulai dan anggota suku Apocynaceae lainnya.

IV. KESIMPULAN

1. Karakteristik pepagan pulai putih (*Alstonia scholaris*), pulai hitam (*Alstonia angustiloba*) dan bintaro (*Cerbera manghas*) sudah diamati dan dipertelakan. Pepagan ketiga jenis pohon tersebut sudah dapat dikenali dan dibedakan satu sama lain berdasarkan karakteristik berikut. Permukaan luar pepagan pulai putih dan bintaro berwarna kelabu dan biasanya mengandung lentisel. Permukaan luar pepagan pulai hitam berwarna coklat gelap, tanpa lentisel, dan mengandung alur longitudinal yang sempit dan dangkal. Pepagan ketiga jenis pohon tersebut sama-sama mengeluarkan getah berwarna putih pada waktu ditetak. Bagian dalam pepagan semuanya berwarna putih. Komponen utama pepagan terdiri dari floem, parenkim, jari-jari, serat, sklereid dan periderm. Serat dijumpai berderet tangensial dekat kambium pada pepagan batang belia semua jenis kemudian terdorong keluar oleh aktivitas kambium lalu terpecah sejalan dengan meningkatnya usia pohon. Sklereid jarang dan berdinding tipis tatkala pohon masih muda lalu bertambah banyak dan menebal dindingnya sejalan dengan bertambahnya usia pohon. Selanjutnya, beda utama struktur anatomi pepagan ketiga jenis pohon tersebut adalah pada morfologi sklereid. Sklereid *A. scholaris* berbentuk gemuk pendek, sklereid *A. angustiloba* berbentuk panjang gemuk, sedangkan sklereid *Cerbera manghas* berbentuk panjang langsing. Kunci identifikasi sementara disajikan.
2. Saran: karakteristik pepagan jenis pulai lainnya perlu juga diselidiki dan dibandingkan dengan karakteristik pepagan pulai putih dan pulai hitam yang sudah dipertelakan.

Maklumat

Penulis bersyukur kepada Dra. G. Sumarni, Ahli Peneliti Utama pada Puslitbang Teknologi Hasil Hutan Bogor yang mengkoordinasikan penelitian ini. Juga kepada Dr. H.G. Richter dari Institut für Holzbiologie, Hamburg, atas saran dan bantuan yang sangat berharga.

Acknowledgement

The author wish to express his sincere gratitude to Mrs. Dra. G. Sumarni, Principal Researcher at Forest Products Technology Research and Development Center Bogor, for coordinating this research. Also to Dr. H. G. Richter of Institut für Holzbiologie, Hamburg, for his invaluable help and suggestions.

DAFTAR PUSTAKA

- Amzu, E. dan Haryanto. 1991. Pelestarian Pemanfaatan Tumbuhan Obat di Indonesia. Dalam Zuhud, E.A.M (Penyunting) 1991. Pelestarian pemanfaatan tumbuhan obat dari hutan tropis Indonesia (Prosiding). Kerjasama Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan IPB Bogor dan Yayasan Pembina Suaka Alam dan Margasatwa Indonesia. Bogor. Hal.:13-26.
- Crafts, A.S. dan C.E. Crisp. 1971. Phloem transport in plants. Freeman & Co. San Francisco.
- Esau, K. 1977. Anatomy of seed plants. 2nd edition. John Wiley & Sons. New York.

- Furuno, T. 1990. Bark structure of deciduous broad-leaved trees grown in the San'in region, Japan. IAWA Bull. 11(3): 239-254. National Herbarium, Leiden-The Netherlands.
- Hamid, A. E.A. Hadad dan O. Rostiana. 1991. Upaya pelestarian tumbuhan obat di Indonesia. Dalam Zuhud, E.A.M (Penyunting) 1991. Pelestarian pemanfaatan tumbuhan obat dari hutan tropis Indonesia (Prosiding). Kerjasama Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan IPB Bogor dan Yayasan Pembina Suaka Alam dan Margasatwa Indonesia. Bogor. Hal.: 36-53
- Junika, L. 1994. Survey of English macroscopic bark terminology. IAWA Journal 15(1): 3 - 45. National Herbarium, Leiden-The Netherlands.
- Mandang, Y.I. dan Bambang Wiyono. 2002. Anatomi kayu gaharu (*Aquilaria malaccensis* Lamk.) dan beberapa jenis sekerabat. Bulletin Penelitian Hasil Hutan 20(2):107-126. Pusat Litbang Teknologi Hasil Hutan. Bogor.
- Richter, H.G. & A.E. van Wijk. 1990. Wood and bark anatomy of Lauraceae IV. *Dahlgrenodendron* J.J.M. van Wyk. IAWA Bull. 11(2):173-182. National Herbarium Leiden -The Netherlands.
- Sudibyo, M. 1991. Tinjauan kondisi stok dan supply - demand tumbuhan obat. Dalam Zuhud, E.A.M (Penyunting) 1991. Pelestarian pemanfaatan tumbuhan obat dari hutan tropis Indonesia (Prosiding). Kerjasama Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan IPB Bogor dan Yayasan Pembina Suaka Alam dan Margasatwa Indonesia. Bogor. Hal.: 73-79.
- Suprana, J. 1991. Prospek pengembangan industri jamu. Dalam Zuhud, E.A.M (Penyunting) 1991. Pelestarian pemanfaatan tumbuhan obat dari hutan tropis Indonesia (Prosiding). Kerjasama Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan IPB Bogor dan Yayasan Pembina Suaka Alam dan Margasatwa Indonesia. Bogor. Hal.: 57-62.
- Triyono, 2003. Kebijakan pengembangan aneka usaha kehutanan dalam mendukung usaha kecil menengah dan social forestry. Makalah Utama disampaikan pada Ekspose Hasil Hasil Litbang Hasil Hutan dalam mendukung restrukturisasi industri kehutanan, 16 Desember 2003. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan. Bogor.
- Trockenbrodt, M. 1990. Survey and discussion of the terminology used in bark anatomy. IAWA Bull. n.s. 11(2):141-166. National Herbarium Leiden- The Netherlands.
- _____. 1991. Qualitative structural changes during bark development in *Quercus robur*, *Ulmus glabra*, *Populus tremula* and *Betula pendula*. IAWA Bull. N.s. 12(1): 5-22. National Herbarium Leiden-The Netherlands.
- _____. 1994. Quantitative changes of some anatomical characters during bark development in *Quercus robur*, *Ulmus glabra*, *Populus tremula* and *Betula pendula*. IAWA Bull. n.s. 15(4): 387-398. National Herbarium Leiden-The Netherlands.
- Wardoyo. 1991. Pidato pengarahan Menteri Kehutanan pada Seminar Pelestarian Pemanfaatan Tumbuhan Obat. Dalam Zuhud, E.A.M (Penyunting) 1994. Pelestarian pemanfaatan tumbuhan obat hutan tropis Indonesia (Prosiding). Kerjasama Jurusan

Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan IPB Bogor dan Yayasan Pembina Suaka Alam dan Margasatwa Indonesia. Bogor. Hlm.: xvii-xix

Whitmore, T.C.1972. Apocynaceae. Tree flora of Malaya, A manual for foresters. Vol. II. Forest Department, Ministry of Primary Industries. Malaysia.

Zuhud, E.A.M (Penyunting) 1991. Pelestarian pemanfaatan tumbuhan obat hutan tropis Indonesia (Prosiding). Kerjasama Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan IPB Bogor dan Yayasan Pembina Suaka Alam dan Margasatwa Indonesia. Bogor. 285 Hlm.

INDEKS PENGARANG

A

- Abdurrohim, Sasa, "Keterawetan 41 Jenis Kayu Terhadap Bahan Pengawet CCB", 22 (3) : 167-174.

B

- Basari, Zakaria, "Analisis Biaya Pemanenan Kayu Bulat Sistem Kemitraan HPH-Koperasi Desa di Kalimantan Tengah", 22 (2) : 113-122.
 Basri, Efrida, "Hubungan Sifat Dasar dan Sifat Pengeringan Lima Jenis Kayu Andalan Jawa Barat", 22 (3) : 155-166.
 Basri, Efrida, "Pengaruh Umur dan Posisi Letak Ruas pada Batang Terhadap Sifat Pengeringan Tiga Jenis Bambu", 22 (3) : 123-134.

D

- Dahlian, Erik, "Komponen Aktif 20 Jenis Tumbuhan Obat di Taman Nasional Gunung Halimun", 22 (1) : 43-50.
 Dahlian, Erik, "Percobaan Pembuatan Pernis dari Kopal Asal Probolinggo", 22 (1) : 35-41.
 Dahlian, Erik, "Teknik Pembuatan Pernis dari Damar untuk Usaha Kecil", 22 (4) : 205-213.
 Djarwanto, "Ketahanan Lima Jenis Kayu Terhadap Beberapa Jamur Perusak Kayu", 22 (4) : 239-246.
 Djarwanto, "Ketahanan Tiga Jenis Kayu untuk Bantalan Rel Kereta Api Terhadap Jamur Perusak Kayu Secara Laboratoris", 22 (4) : 215-221.

E

- Edriana, E. "Teknik Pembuatan Pernis dari Damar untuk Usaha Kecil", 22 (4) : 205-213.
 Edriana, E. "Percobaan Pembuatan Pernis dari Kopal Asal Probolinggo", 22 (1) : 35-41.
 Endom, Wesman, "Kajian Penggunaan Lahan Hutan dan Perubahannya Menggunakan Data Citra Spot Landsat dan Radar", 22 (2) : 95-111.

H

- Hadjib, Nurwati, "Hubungan Sifat Dasar dan Sifat Pengeringan Lima Jenis Kayu Andalan Jawa Barat", 22 (3) : 155-166.
 Haryono, "Kajian Penggunaan Lahan Hutan dan Perubahannya Menggunakan Data Citra Spot Landsat dan Radar", 22 (2) : 95-111.
 Hastuti, Puji, "Sifat-Sifat Kopal Manila Dari Probolinggo, Jawa Timur", 22 (2) : 87-94.
 Hendalastuti, H., "Pengaruh Pembuatan Takik Rebah dan Takik Balas Terhadap Arah Jatuh Pohon : Studi Kasus di Hutan Tanaman di Pulau Laut Kalimantan Selatan", 22 (1) : 51-59.
 Hidayat, Asep, "Pengaruh Pembuatan Takik Rebah dan Takik Balas Terhadap Arah Jatuh Pohon : Studi Kasus di Hutan Tanaman di Pulau Laut Kalimantan Selatan", 22 (1) : 51-59.
 Hudiansyah, "Ketahanan Lima Jenis Kayu Terhadap Beberapa Jamur Perusak Kayu", 22 (4) : 239-246.

J

- Jasni, "The Resistance of Treated Rubberwood Particleboard to the Drywood Termite", 22 (2) : 69-74.

K

- Komarayati, Sri, "Beberapa Sifat dan Pemanfaatan Arang dari Serasah dan Kulit Kayu Pinus", 22 (1) : 17-22.
- Komarayati, Sri, "Penggunaan Arang Kompos pada Media Tumbuh Anakan Mahoni", 22 (4) : 193-203.
- Krisdianto, "Pengaruh Perlakuan Pendahuluan Terhadap Kecepatan Pengeringan Kayu Mangium", 22 (3) : 135-142.
- Kulsum, Umi, "Komponen Aktif 20 Jenis Tumbuhan Obat di Taman Nasional Gunung Halimun", 22 (1) : 43-50.
- Kusmiyati, Evi, "Sifat-Sifat Kopal Manila Dari Probolinggo, Jawa Timur", 22 (2) : 87-94.

L

- Lempang, Mody, "Sifat Anatomi dan Fisis Kayu Jati dari Muna dan Kendari Selatan", 22 (4) : 231-237.
- Lestari, Setyani B., "Sifat Pulp Sulfat Kayu Kurang Dikenal Asal Jawa Barat", 22 (2) : 75-86.

M

- Mahpudin, "Beberapa Sifat dan Pemanfaatan Arang dari Serasah dan Kulit Kayu Pinus", 22 (1) : 17-22.
- Malik, Jamaludin, "Pengaruh Perlakuan Pendahuluan Terhadap Kecepatan Pengeringan Kayu Mangium", 22 (3) : 135-142.
- Mandang, Y. I., "Anatomi Pepagan Pulai dan Beberapa Jenis Sekerabat", 22 (4) : 247-261.
- Muslich, Mohammad, "Keawetan 52 Jenis Kayu Indonesia", 22 (1) : 1-8.
- Muslich, Mohammad, "Ketahanan 62 Jenis Kayu Indonesia Terhadap Penggerek Kayu di Laut", 22 (3) : 183-191.

N

- Novriyanti, Eka, "Pengawetan Bambu Talang Secara Sederhana", 22 (4) : 223-230.
- Nurrohman, Edi, "Pengawetan Bambu Talang Secara Sederhana", 22 (4) : 223-230.

R

- Rulliaty, Sri, "Sifat Anatomi dan Fisis Kayu Jati dari Muna dan Kendari Selatan", 22 (4) : 231-237.

S

- Saefudin, "Pengaruh Umur dan Posisi Letak Ruas pada Batang Terhadap Sifat Pengeringan Tiga Jenis Bambu", 22 (3) : 123-134.
- Santoso, Adi, "Pemanfaatan Lignin dari Lindi Hitam untuk Pembuatan Kopolimer Lignin Resorsinol Formaldehida Sebagai Perekat Kayu Lamina", 22 (3) : 143-154.
- Santoso, Adi, "Pengaruh Fumigasi Amonium Hidroksida Terhadap Emisi Formaldehida Kayu Lapis dan Papan Partikel", 22 (1) : 9-16.
- Santoso, Adi, "Pengaruh Tepung Gaplek dan Dekstrin Sebagai Ekstender Perekat Urea Formaldehida Terhadap Keteguhan Rekat Kayu Lapis Kapur", 22 (2) : 61-68.
- Setiawan, Dadang, "Beberapa Sifat dan Pemanfaatan Arang dari Serasah dan Kulit Kayu Pinus", 22 (1) : 17-22.
- Setyawan, Dendy, "Pengaruh Tempat Tumbuh, Jenis dan Diameter Batang Terhadap Produktivitas Pohon Penghasil Biji Tengkawang", 22 (1) : 23-33.
- Siagian, Rena M., "Sifat Pulp Sulfat Kayu Kurang Dikenal Asal Jawa Barat", 22 (2) : 75-86.

- Sinaga, Marolop, "Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Penebangan Kayu Mangium di Satu Perusahaan Hutan Tanaman di Propinsi Jambi", 22 (3) : 175-182.
- Sudika, Didik A., "Keterawetan 41 Jenis Kayu Terhadap Bahan Pengawet CCB", 22 (3) : 167-174.
- Suhartana, Sona, "Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Penebangan Kayu Mangium di Satu Perusahaan Hutan Tanaman di Propinsi Jambi", 22 (3) : 175-182.
- Sulastiningsih, I. M., "The Resistance of Treated Rubberwood Particleboard to the Drywood Termite", 22 (2) : 69-74.
- Sumadiwangsa, E. S., "Komponen Aktif 20 Jenis Tumbuhan Obat di Taman Nasional Gunung Halimun", 22 (1) : 43-50.
- Sumadiwangsa, E. S., "Pengaruh Tempat Tumbuh, Jenis dan Diameter Batang Terhadap Produktivitas Pohon Penghasil Biji Tengkawang", 22 (1) : 23-33.
- Sumadiwangsa, E. S., "Sifat-Sifat Kopal Manila Dari Probolinggo, Jawa Timur", 22 (2) : 87-94.
- Sumadiwangsa, E. S., "Teknik Pembuatan Pernis dari Damar untuk Usaha Kecil", 22 (4) : 205-213.
- Sumantri, Ishak, "Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Penebangan Kayu Mangium di Satu Perusahaan Hutan Tanaman di Propinsi Jambi", 22 (3) : 175-182.
- Sumarni, Ginuk, "Keawetan 52 Jenis Kayu Indonesia", 22 (1) : 1-8.
- Sumarni, Ginuk, "Ketahanan 62 Jenis Kayu Indonesia Terhadap Penggerek Kayu di Laut", 22 (3) : 183-191.
- Suprapti, Sihati, "Ketahanan Lima Jenis Kayu Terhadap Beberapa Jamur Perusak Kayu", 22 (4) : 239-246.
- Suprapti, Sihati, "Ketahanan Tiga Jenis Kayu untuk Bantalan Rel Kereta Api Terhadap Jamur Perusak Kayu Secara Laboratoris", 22 (4) : 215-221.
- Sutigno, Paribotro, "Pengaruh Fumigasi Amonium Hidroksida Terhadap Emisi Formaldehida Kayu Lapis dan Papan Partikel", 22 (1) : 9-16.
- Sutigno, Paribotro, "Pengaruh Tepung Gaplek dan Dekstrin Sebagai Ekstender Perekat Urea Formaldehida Terhadap Keteguhan Rekat Kayu Lapis Kapur", 22 (2) : 61-68.

W

- Waluyo, Totok K., "Percobaan Pembuatan Pernis dari Kopal Asal Probolinggo", 22 (1) : 35-41.
- Waluyo, Totok K., "Sifat-Sifat Kopal Manila Dari Probolinggo, Jawa Timur", 22 (2) : 87-94.
- Winarni, Ina, "Pengaruh Tempat Tumbuh, Jenis dan Diameter Batang Terhadap Produktivitas Pohon Penghasil Biji Tengkawang", 22 (1) : 23-33.

Y

- Yoswita, "Sifat Pulp Sulfat Kayu Kurang Dikenal Asal Jawa Barat", 22 (2) : 75-86.

Z

- Zulnely, "Komponen Aktif 20 Jenis Tumbuhan Obat di Taman Nasional Gunung Halimun", 22 (1) : 43-50.

PETUNJUK BAGI PENULIS

BAHASA: Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

FORMAT: Naskah diketik di atas kertas putih A4, pada satu permukaan dengan 2 spasi. Pada semua tepi kertas dikosongkan minimal 3,5 cm.

JUDUL: Judul dibuat tidak lebih dari 2 baris dan harus mencerminkan isi tulisan. Nama penulis dicantumkan di bawah judul.

ABSTRAK: Naskah dalam bahasa Indonesia, abstrak dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Naskah dalam bahasa Inggris, abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Abstrak dibuat tidak lebih dari 200 kata berupa intisari dari makalah secara menyeluruh dan informatif.

KATA KUNCI: Kata kunci dicantumkan di bawah ringkasan.

TABEL: Judul tabel dan keterangan yang diperlukan ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris dengan jelas dan singkat. Tabel harus diberi nomor. Penggunaan tanda koma (,) dan titik (.) pada angka di dalam tabel masing-masing menunjukkan nilai pecahan desimal dan kebulatan seribu.

GAMBAR: Grafik dan ilustrasi lain yang berupa gambar harus kontras dan dibuat dengan tinta hitam. Setiap gambar harus diberi nomor, judul dan keterangan yang jelas dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

FOTO: Foto harus mempunyai ketajaman yang baik, diberi judul dan keterangan yang jelas dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

DAFTAR PUSTAKA: Daftar pustaka yang dirujuk harus disusun menurut abjad nama pengarang dengan mencantumkan nama pengarang, tahun terbit, judul pustaka, media (vol., No., hlm.), penerbit dan kota penerbit,

NOTES FOR AUTHORS

LANGUAGE: Manuscripts must be written in Indonesian or English.

FORMAT: Manuscripts should be typed double spaced, on one face of A4 white paper. Margin of 3,5 cm should be left on all sides.

TITLE: Title must not exceed two lines and should reflect the content of the manuscript. The author's name follows immediately under the title.

ABSTRACT: Manuscripts in Indonesian with English and Indonesian abstract. Manuscripts in English with Indonesian and English abstract. Abstract must not exceed 200 words, and should consist of the essence of the article.

KEYWORDS: Keywords should be written after the summary.

TABLE: Title of tables and all necessary remarks must be written both in Indonesian and English. Tables should be numbered. The uses of comma (,) and point (.) in all figures in the table indicate a decimal fraction, and a thousand multiplication, respectively.

DRAWING: Graphs and other drawing illustrations must be drawn in high contrast black ink. Each drawing must be numbered, titled and given clear remarks in Indonesian and English.

PHOTO: Photo must be titled and given clear remarks in both Indonesian and English.

REFERENCES: References must be listed in alphabetical order of author's name each followed by year, topic, medium (vol., no., pages), publisher, and city of publisher, as follows:

Steel, R. G. D. and J. H. Torrie. 1960. Principles and Procedures of Statistic. Mc Graw-Hill Book Co. Inc. New York.

Artistien, S. dan Y. I. Mandang. 2002. Anatomi dan kualitas serat kayu *Hibiscus macrophyllus* Roxb. dan *Artocarpus horridus* Jarret. Buletin Penelitian Hasil Hutan 20(3): 243-257. Pusat Litbang Teknologi Hasil Hutan. Bogor.