**ANALISIS VEGETASI PADA HUTAN KORIDOR CAGAR ALAM
PEGUNUNGAN TAMRAU UTARA DAN SUAKA MARGASATWA
JAMURSBA-MEDI SORONG**

(Vegetation Analysis on Forest Corridor of Nature Reserve Mountain Range at North
Tamrau and The Game Reserve Jamursba-Medi Sorong)

Oleh / By :

Krisma Lekitoo, Julius D. Nugroho, dan / and Rocky CH. Metalmety

ABSTRACT

*Nature Reserve of North Tamrau Mountains and Game Reserve Jamursba-Medi were two conservation areas at Papua. These two areas were established in 2000 and were suggested to be merged into one national park of North Tamrau Mountain – Jamursba-Medi. This national park is a conservation areal and it has some priorities based on types, endemic, habitat diversity and unique values. This study is to know structure and composition of wooden plants on both forests. This study used descriptive method and the data were collected by doing survey. Sampling vegetation used in this study were based on modified sampling plot of Witthaker. The plots were laid down purposively considering to slope, elevation and distance from river factors. Results of this study showed that population of forest on both locations consisted of 52 kinds of trees, 23 kinds of poles, 28 kinds of boundary poles and 42 kinds of young plants. For level of tree, there were found 23 families, level of pole were 15 families, level of boundary pole were 18 families and level of young plant were 30 families. On level seedling, there were dominated by *Drypetes longifolia*, *Memecylon* sp., and *Sizygium* sp., on level pertaining to youth boundary poles were dominated by *Canarium indica*, *Vatica papuana*, and *Lithocarpus rufovillosus*, youth poles were dominated by *L. rufovillosus*, *Reinwardtiidendron* sp., and *Urandra brasii*, while on level of trees were dominated by *L. rufovillosus*, *Intsia palembanica*, and *Pometia pinnata*.*

Key words : Analysis, vegetation, corridor, nature reserve, game reserve, Tamrau, Jamursba-Medi

ABSTRAK

Cagar Alam Pegunungan Tamrau Utara dan Suaka Margasatwa Jamursba Medi adalah dua kawasan konservasi yang terdapat di Papua. Kedua kawasan konservasi ini mulai tahun 2000 telah diusulkan untuk digabungkan menjadi satu yaitu kawasan Taman Nasional Pegunungan Tamrau Utara – Pantai Jamursba-Medi. Sebagai kawasan konservasi kedua kawasan itu memiliki beberapa prioritas yang berdasarkan pada kekayaan jenis, keanekaragaman habitat, dan nilai keunikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur dan komposisi jenis tumbuhan berkayu pada hutan dataran rendah koridor Cagar Alam (CA) Pegunungan Tamrau Utara dan Suaka Margasatwa (SM) Jamursba-Medi Sorong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik survey. Pengambilan contoh vegetasi menggunakan petak contoh Witthaker yang telah dimodifikasi. Peletakan petak contoh dilakukan secara purposif dengan memperhatikan faktor kelereng, ketinggian tempat, dan jarak dari sungai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa populasi hutan di koridor C.A. Pegunungan Tamrau Utara – S.M. Pantai Jamursba-Medi tersusun atas 52 jenis pohon, 23 jenis tiang, 28 jenis pancang, dan 42 jenis anakan. Pada tingkat pohon terdapat 23 famili, tingkat tiang 15 famili, tingkat pancang 18 famili, dan tingkat anakan 30 famili. Pada tingkat permudaan semai vegetasi berkayu (pohon) yang dominan adalah *Drypetes longifolia*, *Memecylon* sp., dan *Sizygium* sp.; pada tingkat permudaan pancang jenis yang dominan adalah *Canarium indica*, *Vatica papuana*, dan *Lithocarpus rufovillosus*; tingkat permudaan tiang jenis yang dominan adalah *L. rufovillosus*, *Reinwardtiidendron* sp., dan *Urandra brasii*; sedangkan pada tingkat pohon jenis yang dominan adalah *L. rufovillosus*, *Intsia palembanica*, dan *Pometia pinnata*.

Kata kunci : Analisis, vegetasi, koridor, cagar alam, suaka margasatwa, Tamrau, Jamursba-Medi

I. PENDAHULUAN

Provinsi Papua dengan luas 416.000 km² merupakan daerah tropik yang memiliki kekayaan sumberdaya alam flora dan fauna yang beragam. Jumlah flora yang terdapat di Papua lebih kurang 15.000-20.000 jenis (Petocz, 1987). Flora penyusun hutan tropis menurut Polunin (1997) terdiri atas lumut, jamur paku-pakuan, herba, liana, epifit, palem, rotan, bambu, perdu, dan pohon.

Pada dasarnya pemanfaatan sumberdaya alam berupa hutan harus dikelola secara optimal, berkesinambungan, dan lestari. Salah satu langkah terpenting dalam melestarikan komunitas hayati adalah dengan penentuan kawasan lindung secara legal. Penetapan kawasan lindung dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun dua mekanisme yang paling utama yaitu melalui penetapan pemerintah dan oleh organisasi konservasi (Primack *et al.*, 1998).

Banyak potensi keragaman hayati flora dan fauna yang ada saat ini telah mengalami tekanan, baik habitat maupun populasinya yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat maupun aktivitas pembalakan oleh pihak swasta. Di sisi lain kegiatan penelitian untuk mengetahui potensi dan jenis vegetasi guna pengelolaan lebih lanjut sesuai status kawasan belum banyak dilakukan.

Cagar Alam (CA) Pegunungan Tamrau Utara merupakan salah satu kawasan suaka alam yang telah dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 820/Kpts/Um/11/1982 tanggal 10 November 1982. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan suaka alam berdasarkan usulan Petocz (1987) yang menduga bahwa di dalam kawasan tersebut memiliki keanekaragaman hayati yang unik dan bentang alam yang spesifik. Kawasan ini termasuk dalam dua kabupaten yaitu Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong. Sementara itu Suaka Margasatwa (SM) Jamursba-Medi terletak di Kecamatan Sausapor, Kabupaten Sorong. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan suaka alam karena merupakan pantai tempat peneluran penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*). Kedua kawasan suaka alam tersebut mulai tahun 2000 telah diusulkan untuk digabung menjadi satu kawasan

Taman Nasional Pegunungan Tamrau Utara – Pantai Jamursba-Medi. Sebagai kawasan lindung, kedua kawasan tersebut memiliki beberapa prioritas yang didasarkan pada kekayaan jenis, keendemikan, keanekaragaman habitat, dan nilai keunikan. Usulan penggabungan kedua kawasan lindung ini dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pelestarian flora dan fauna di kedua kawasan tersebut, pemanfaatan yang lestari, melindungi hak-hak adat masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di sekitarnya dalam pengelolaan kawasan tersebut. Inisiator pengusulan adalah WWF Bioregional Sahul-Papua, sedangkan studi awal telah dilakukan oleh beberapa instansi terkait termasuk Balai Penelitian Kehutanan Manokwari. Namun sampai saat ini belum ada persetujuan dari pihak Departemen Kehutanan mengenai penggabungan kedua kawasan konservasi tersebut.

Dalam rangka mendukung pengusulan penggabungan kedua kawasan lindung tersebut, maka data mengenai jenis-jenis flora dan keadaan ekologi pada koridor kedua kawasan lindung tersebut perlu diketahui, sehingga diperoleh gambaran umum tentang jenis-jenis flora sebagai data dasar dalam pengelolaan selanjutnya. Fokus perhatian diutamakan pada kelompok tumbuhan berkayu, rotan dan palem, tumbuhan liana, tumbuhan epifit (anggrek) dan bambu.

II. METODOLOGI

A. Lokasi dan Waktu

Penelitian dilakukan pada bulan Agustus tahun 2002 di kawasan hutan koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi yang secara administrasi termasuk wilayah Kampung Saubeba, Kecamatan Sausapor, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua. Daerah ini terletak pada koordinat 0°24'056" BT-132°33'176" LS dan 0°24'063" BT-132°32'928" LS.

Daerah ini beriklim panas dan lembab seperti pada umumnya daerah dataran rendah Papua. Curah hujan dari stasiun cuaca Sorong 2.879 mm per tahun (tipe iklim menurut Oldeman Af) dengan bulan-bulan basah saat ketersediaan air tinggi terjadi pada bulan Maret-September. Pada saat

dilakukan penelitian telah memasuki bulan kering, sehingga tampak jelas keadaan hutan yang sangat kering dengan tumpukan serasah dalam jumlah banyak di lantai hutan.

Daerah penelitian merupakan punggung-punggungan dan bukit-bukit yang tinggi dan tidak teratur. Daerah datar umumnya terhampar pada sisi kiri-kanan sungai. Batuan umumnya berupa batu gamping, konglomerat, batu pasir, dan batu lempung. Jenis tanah umumnya merupakan tanah dari ordo Inceptisols (Eutropepts). Inceptisol adalah tanah-tanah muda tetapi lebih berkembang daripada Entisols. Pada umumnya mempunyai horison kambik. Karena tanah belum berkembang lanjut, kebanyakan tanah ini cukup subur. Tanah ini dulu termasuk tanah Aluvial, Andosol, dan Gleihumus (Hardjowigeno, 1987). Pada daerah yang datar umumnya terdiri atas tanah endapan aluvial, dengan tekstur berpasir hingga debu berpasir; sedangkan pada daerah yang miring umumnya terdiri atas tanah dengan singkapan batuan gamping lepas sehingga sangat peka terhadap longsor maupun erosi.

B. Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain *tally sheet*, papan data lapangan, meteran roll, plakban bening,

plastik *trash bag*, hagameter, *clinometer*, tali nilon besar dan kecil, tali rafia, gunting stek, foto kamera, foto digital, altimeter, peta 1 : 100.000, *Geographic Positioning System* (GPS), parang, kompas, kertas koran, spirtus, alkohol 75 %, alat tulis menulis, dan peralatan penunjang lainnya.

C. Cara Kerja

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik survey. Pengambilan contoh vegetasi menggunakan petak contoh Whittaker yang telah dimodifikasi. Empat petak contoh disebar di daerah penelitian dalam radius diperkirakan sekitar 1 km². Peletakan petak contoh dilakukan secara purposif dengan memperhatikan faktor aspek, lereng, ketinggian tempat, dan jarak dari sungai yang berbeda sehingga dapat diperoleh keragaman habitat yang dapat mewakili lokasi tersebut.

Plot Whittaker ini berukuran 20 m x 50 m yang terdiri dari sepuluh sub plot berukuran 0,5 m x 2 m, dua sub plot berukuran 2 m x 5 m, serta sebuah sub plot berukuran 5 m x 20 m (Gambar 1).

Sub plot ukuran 0,5 m x 2 m dibuat untuk pengamatan tumbuhan herba, anakan, dan rumput. Semua tumbuhan yang tingginya

Gambar (Figure) 1. Sketsa plot Whittaker dan bagian-bagian sub plot (*Whittaker plot sketch and part of sub plots*)

kurang dari 50 cm dihitung kelimpahannya (tanpa pengukuran dbh dan tinggi). Pengukuran di 10 sub plot ini dilakukan lebih dahulu mengingat pengukuran pada sub plot lainnya akan menyebabkan banyak vegetasi terinjak.

Pada sub plot berukuran 2 m x 5 m dilakukan pengamatan semua pohon dengan *Diameter at Breast High* (dbh) 1 cm atau lebih (dicatat dbh dan tinggi semua individu). Pada sub plot berukuran 5 m x 20 m diukur dan diidentifikasi semua tumbuhan berkayu dengan (dbh) 5 cm sampai kurang dari 10 cm. Selanjutnya seluruh plot (kecuali sub plot 2 m x 5 m dan 5 m x 20 m) dilakukan pengukuran dan pengidentifikasian pohon dengan dbh 10 cm atau lebih, tanpa mengukur ulang tumbuhan pada sub plot yang sudah dikerjakan.

Dari hasil pengukuran dapat dihitung besaran-besaran sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Kerapatan (K)} &= \frac{\text{Jumlah individu}}{\text{Luas contoh}} \\ \text{Kerapatan relatif (KR)} &= \frac{\text{Kerapatan suatu jenis}}{\text{Kerapatan seluruh jenis}} \times 100\% \\ \text{Dominasi (D)} &= \frac{\text{Jumlah bidang dasar}}{\text{Luas contoh}} \\ \text{Dominasi relatif (DR)} &= \frac{\text{Dominasi dari suatu jenis}}{\text{Dominasi seluruh jenis}} \times 100\% \\ \text{Frekuensi (F)} &= \frac{\text{Jumlah plot ditemukannya suatu jenis}}{\text{Jumlah seluruh plot}} \\ \text{Frekuensi relatif (FR)} &= \frac{\text{Frekuensi suatu jenis}}{\text{Frekuensi seluruh jenis}} \times 100\% \\ \text{Nilai Penting (NP)} &= \text{KR} + \text{FR} + \text{DR} \end{aligned}$$

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Struktur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hutan di koridor CA Pegunungan

Tamrau Utara – SM Pantai Jamursba-Medi tersusun atas 53 jenis pohon, 23 jenis tiang, 28 jenis pancang, dan 42 jenis anakan. Pada tingkat pohon terdapat 23 famili, tingkat tiang 15 famili, tingkat pancang 18 famili, dan tingkat semai 30 famili. Struktur populasi tersebut menunjukkan struktur yang tidak normal, miskin vegetasi pada tingkat tiang dan pancang. Demikian pula keragaman famili pada tingkat pohon dan anakan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat tiang dan pancang.

Menurut Polunin (1997), variasi kekayaan spesies tampak nyata tergantung kepada lokasi geografi, variasi dalam ciri lokasi, dan status kesuburan. Sedangkan menurut Ewusie (1990) beberapa tumbuhan hidup dalam lingkungan dengan keanekaragaman yang lebih luas daripada yang lain, dan kebanyakan tumbuhan toleran terhadap jangkauan yang agak sempit pada keadaan lingkungan tertentu. Dengan demikian bagi kebanyakan tumbuhan jika keadaan habitatnya berubah menjadi keadaan yang tidak sesuai atau kurang menguntungkan, mereka akan mati atau tak dapat tumbuh normal. Keadaan ini disebabkan oleh adanya faktor adaptasi dan seleksi alam.

B. Komposisi Floristik

Kurva spesies area (Gambar 2) menunjukkan bahwa penambahan petak contoh hingga petak contoh yang keempat masih memberikan penambahan jenis yang nyata terutama pada tingkat pertumbuhan pohon dan anakan. Kurva ini juga sekaligus menerangkan adanya suatu perbedaan yang sangat nyata dalam komposisi jenis antar petak contoh yang satu dengan petak contoh lainnya.

1. Permudaan Tingkat Semai

Pada fase permudaan terdapat 42 spesies (pohon). *Drypetes longifolia* merupakan jenis penting dalam penyusun populasi pada tingkat permudaan semai kemudian disusul oleh jenis-jenis semai vegetasi berkayu seperti *Memecylon* sp., *Sizygium* sp., *Vatica papuana*, *Neprolepis indica* (non kayu), *Ryparosa* sp., *Palaquium lobianum*, *Chisocheton ceramiquis*, dan *Gonocaryum* sp. (Tabel 1). Hasil analisis vegetasi tingkat

permudaan semai secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Conservation International dalam Stephen dan Suryadi (2002) pada kawasan hutan Jari (Yongsu) di daerah pesisir utara CA Pegunungan Cyclop, Kabupaten Jayapura ditemukan 50 jenis permudaan tingkat semai. Sedangkan hasil penelitian Kuswandi *et al.*

(1993), pada kawasan hutan Prafi Kabupaten Manokwari terdapat 35 jenis tingkat semai dan di kawasan hutan Tuanwouwi Kabupaten Manokwari terdapat 26 jenis tingkat semai. Hasil penelitian Remetwa dalam Setio *et al.* (2001) pada Gunung Arbuejo CA Pegunungan Tamrau Utara ditemukan 63 jenis permudaan tingkat semai. Dengan demikian keanekaragaman

Gambar (Figure) 2. Jumlah akumulatif spesies pada daerah koridor CA Pegunungan Tamrau Utara – SM Pantai Jamursba-Medi (*Total species acumulation at the area of coridor Nature Reserve North Tamrau Mountains and Game Reserve Jamursba-Medi*)

Tabel (Table) 1. Sepuluh jenis vegetasi tingkat anakan dengan indeks nilai penting tertinggi di daerah koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi (*Ten vegetation types seedlings level with highest important value index at the area of oridor Nature Reserve North Tamrau Mountains and Game Reserve Jamursba-Medi*)

Nama botani (Botanical name)	Famili (Family)	K (n/ha)	KR (%)	F (%)	FR (%)	INP (%)
<i>Drypetes longifolia</i>	Euphorbiaceae	5.750	10,41	0,25	9,09	19,59
<i>Memexylon sp.</i>	Melastomataceae	1.750	3,17	0,18	6,36	9,53
<i>Sizygium sp.</i>	Myrtaceae	1.500	2,72	0,15	5,46	8,17
<i>Vatica papuana</i>	Dipterocarpaceae	2.000	3,62	0,10	3,64	7,26
<i>Pterygota horsfieldia</i>	Sterculiaceae	1.000	1,81	0,10	3,64	5,45
<i>Ryparosa sp.</i>	Flacourtiaceae	1.000	1,81	1,10	3,64	5,45
<i>Palaquium lobianum</i>	Sapotaceae	1.000	1,81	0,10	3,64	5,45
<i>Gonocheton ceramiquis</i>	Meliaceae	1.000	1,81	0,08	2,73	4,54
<i>Gonocaryum sp.</i>	Icacinaceae	1.000	1,81	1,08	2,73	4,54
<i>Glochidion sp.</i>	Euphorbiaceae	2.000	3,62	0,03	0,91	4,53

Catatan (Note) : K = Kerapatan (*Density*) FR = Frekuensi relatif (*Relative frequency*)
 KR = Kerapatan relatif (*Relative density*) INP = Indeks Nilai Penting (*Important Value Index*)
 F = Frekuensi (*Frequency*)

jenis permudaan tingkat semai pada kawasan koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi tergolong sedang.

Pada Tabel 1 tampak bahwa *D. longifolia* merupakan jenis yang memiliki INP tertinggi (19,60 %). Jenis *D. longifolia* merupakan jenis dominan pada hutan koridor CA Pegunungan Tamrau dan SM Jamursba-Medi disebabkan karena penyebaran individunya yang merata dan jumlah individunya paling banyak. *Memecylon* sp. merupakan jenis dominan kedua (9,53 %), meskipun memiliki jumlah individu yang tidak terlalu banyak (1.750 batang/ha) namun memiliki penyebaran yang cukup merata di lokasi penelitian (FR = 6,36). Sedangkan *Sizygium* sp. merupakan jenis dominan ketiga (8,17 %). Jenis ini memiliki penyebaran merata (FR = 5,46).

2. Permudaan Tingkat Pancang

Pada tingkat pancang dijumpai 21 jenis permudaan, 10 jenis dominan yaitu *Canarium indica*, *V. papuana*, *Lithocarpus rufovillosus*, *Maniltoa brownoides*, *Sizygium* sp., *Inocarpus fagiverus*, *Intsia palembanica*, *Memecylon* sp., *Gonocarium* sp., dan *P. lobianum* (Tabel 2). Hasil analisis vegetasi tingkat pancang secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Conservation International dalam Stephen dan Suyadi.(2002) pada kawasan hutan Jari (Yongsu) di daerah pesisir utara CA Pegunungan Cyclop, Kabupaten Jayapura ditemukan 32 jenis permudaan tingkat pancang. Hasil penelitian Kuswandi *et al.* (1993) pada kawasan hutan Prafi Kabupaten Manokwari ditemukan 51 jenis tingkat pancang dan pada kawasan hutan Tuanwouwi ditemukan 36 jenis tingkat pancang serta hasil penelitian Remetwa dalam Setio *et al.* (2001) pada gunung Arbuejo CA Pegunungan Tamrau Utara ditemukan 51 jenis permudaan tingkat pancang. Oleh karena itu keanekaragaman jenis permudaan tingkat pancang pada kawasan koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi tergolong sangat rendah. Hal ini disebabkan karena penyebaran jenis tingkat pancang pada daerah ini tidak merata.

Dari Tabel 2 tampak bahwa *C. indica* merupakan jenis yang memiliki INP tertinggi pada tingkat pancang (33,46 %). Jenis ini dominan karena penyebarannya merata pada lokasi penelitian dan memiliki rata-rata pertumbuhan diameter baik, bukan karena memiliki jumlah individu yang tinggi (250 batang/ha). *V. papuana* merupakan jenis vegetasi tingkat pancang yang memiliki INP

Tabel (Table) 2. Sepuluh jenis vegetasi tingkat pancang dengan indeks nilai penting tertinggi di daerah koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi (*Ten vegetation types of sapling level with highest important value index at the area of coridor Nature Reserve North Tamrau Mountains and Game Reserve Jamursba-Medi*)

Nama botani (Botanical name)	Famili (Family)	Diameter (cm)	FR (%)	DR (%)	INP (%)
<i>Canarium indica</i>	Burseraceae	3,0	2,86	26,25	33,46
<i>Vatica Papuana</i>	Dipterocarpaceae	2,0	2,86	6,79	20,51
<i>Lithocarpus rufovillosus</i>	Fagaceae	7,0	2,86	3,54	15,09
<i>Dacusocarpus walichianus</i>	Podocarpaceae	3,0	5,72	4,72	14,78
<i>Sizygium</i> sp.	Myrtaceae	2,5	5,71	1,77	14,01
<i>Inocarpus fagiverus</i>	Fabaceae	1,3	5,72	2,66	12,72
<i>Intsia palembanica</i>	Fabaceae	2,0	2,86	5,90	10,93
<i>Memecylon</i> sp.	Melastomataceae	1,5	2,86	5,90	10,39
<i>Gonocarium</i> sp.	Icacinaceae	4,0	2,86	2,66	9,86
<i>Palaquium lobianum</i>	Papilionaceae	4,0	2,86	4,72	9,75

Catatan (Note) : KR = Kerapatan relatif (Relative density)

FR = Frekuensi relatif (Relative frequency)

DR = Dominansi relatif (Relative dominant)

INP = Indeks Nilai Penting (Important Value Index)

tertinggi kedua (20,51 %). Jenis ini merupakan jenis dominan kedua disebabkan karena memiliki jumlah individu banyak (625 batang/ha), bukan karena penyebarannya merata. *L. rufovillosus* merupakan jenis yang memiliki INP tertinggi ketiga (15,09 %). Jenis ini merupakan jenis dominan ketiga bukan karena jumlah individunya tinggi tetapi karena persebarannya cukup merata dan memiliki rata-rata diameter pertumbuhan baik.

3. Permudaan Tingkat Tiang

Vegetasi tingkat tiang di daerah koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi terdiri atas 22 spesies. Jenis yang dominan adalah *L. rufovillosus*, *Reinwardtiodendron* sp., *Urandra brasii*, *C. ceramikus*, *Sizygium* sp., *Haplolobus floribunda*, *Parishia* sp., *Myristica* sp., *Disoxylum molle*, dan *D. glabosa* (Tabel 3). Hasil analisis vegetasi tingkat tiang secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 3.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Conservation International dalam Stephen dan Suryadi (2002) pada kawasan hutan Jari (Yongsu) di daerah pesisir utara CA Pegunungan Cyclop Kabupaten Jayapura ditemukan 27 jenis tingkat tiang. Hasil penelitian Kuswandi *et al.* (1993) pada kawasan hutan Prafi Kabupaten Manokwari

ditemukan 69 jenis tingkat tiang dan di kawasan hutan Tuanwouwi Kabupaten Manokwari ditemukan 44 jenis tingkat tiang. Hasil penelitian Remetwa dalam Setio *et al.* (2001) pada Gunung Arbuejo CA Pegunungan Tamrau Utara ditemukan 21 jenis permudaan tingkat tiang, maka dapat dikatakan keanekaragaman jenis permudaan tingkat tiang pada kawasan koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi tergolong cukup rendah.

Dari Tabel 3 tampak bahwa *L. rufovillosus* merupakan jenis yang memiliki INP tertinggi (33,76 %) meskipun pada fase pancang jenis ini ada pada urutan dominan ke-3. Jenis ini dominan pada fase tiang disebabkan memiliki jumlah individu yang sangat tinggi (200 batang/ha). Walaupun memiliki jumlah individu tinggi namun penyebarannya tidak merata pada lokasi penelitian (FR = 3,85). Penyebaran yang tidak merata disebabkan karena jenis ini umumnya dijumpai pada ketinggian di atas 150 m dpl, pada punggung-punggung bukit dan lereng. Jenis vegetasi lain yang penyebarannya tidak merata adalah *C. ceramikus*, *H. floribunda*, *Myristica* sp., *Parishia* sp., *D. molle*, dan *D. glabosa*. *Reinwardtiodendron* sp. merupakan jenis yang memiliki INP tertinggi kedua (32,26 %) dengan jumlah individu yang cukup banyak (125 batang/ha). Jenis

Tabel (Table) 3. Sepuluh jenis vegetasi tingkat tiang dengan Indeks Nilai Penting tertinggi di daerah koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi (*Ten vegetation types of pole level with highest important value index at the area of coridor Nature Reserve North Tamrau Mountains and Game Reserve Jamursba-Medi*)

Nama botani (Botanical name)	Famili (Family)	KR (%)	FR (%)	DR (%)	INP (%)
<i>Lithocarpus rufovillosus</i>	Meliaceae	12,20	3,85	13,87	33,76
<i>Reinwardtiodendron</i> sp.	Fagaceae	19,51	7,69	4,15	27,51
<i>Urandra brasii</i>	Icacinaceae	7,32	7,69	7,84	22,85
<i>Chisocheton ceramikus</i>	Meliaceae	7,32	3,85	11,60	22,76
<i>Sizygium</i> sp.	Myrtaceae	4,88	7,69	4,80	17,37
<i>Haplolobus floribunda</i>	Burseraceae	4,88	3,85	5,51	14,23
<i>Myristica</i> sp.	Myristicaceae	2,44	3,85	5,25	11,54
<i>Parishia</i> sp.	Anacardiaceae	2,44	3,85	5,25	11,54
<i>Disoxylum molle</i>	Meliaceae	2,44	3,85	4,15	10,43
<i>Drypetes glabosa</i>	Euphorbiaceae	2,44	3,85	4,15	10,43

Catatan (Note): KR = Kerapatan relatif (*Relative density*)
 FR = Frekuensi relatif (*Relative frequency*)
 DR = Dominansi relatif (*Relative dominant*)
 INP = Indeks Nilai Penting (*Important Value Index*)

ini memiliki penyebaran yang cukup merata pada lokasi penelitian ($FR = 7,69$). *U. brasii* merupakan jenis yang memiliki INP tertinggi ketiga (22, 85 %). Jenis ini pada lokasi penelitian memiliki jumlah individu yang setara dengan jenis *C. ceramicus* (75 batang/ha) namun memiliki penyebaran yang cukup merata ($FR = 7,69$).

4. Tingkat Pohon

Hutan koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi terdiri atas 50 spesies vegetasi tingkat pohon, 10 jenis utama dengan nilai INP tertinggi yaitu *L. rufovillosus*, *I. palembanica*, *P. pinnata*, *C. ceramicus*, *D. longifolia*, *Pimelliodendron amboinicum*, *Disoxylum octandrum*, *Canarium decumanum*, *Linociera macrophylla*, dan *Parishia* sp. (Tabel 4). Hasil analisis vegetasi tingkat pohon secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 4.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Conservation International dalam Stephen dan Suryadi (2002) pada kawasan hutan Jari (Yongsu) di daerah pesisir utara CA Pegunungan Cyclop Kabupaten Jayapura ditemukan 88 jenis tingkat pohon. Hasil penelitian Kuswandi *et al.* (1993) pada kawasan hutan Prafi Kabupaten Manokwari terdapat 38 jenis tingkat pohon, dan di

kawasan hutan Tuanwouwi Kabupaten Manokwari terdapat 37 jenis tingkat pohon. Sedangkan hasil penelitian Rametwa dalam Setio *et al.* (2001) pada gunung Arbuejo di CA Pegunungan Tamrau Utara ditemukan 56 jenis permudaan tingkat pohon, maka keanekaragaman jenis vegetasi tingkat pohon pada kawasan koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi tergolong rendah sampai sedang. Hal ini disebabkan karena penyebaran jenis vegetasi tingkat pohon pada daerah koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi yang tidak merata. Hasil pengamatan lapangan diketahui bahwa umumnya vegetasi tingkat pohon tumbuh berkelompok membentuk asosiasi-asosiasi vegetasi seperti asosiasi hutan campuran *L. rufovillosus* dan *Vatica papuana*. Proses suksesi yang berlangsung selama bertahun-tahun tersebut akan menciptakan bentuk-bentuk vegetasi yang mampu beradaptasi dengan faktor pembatas dan sesuai dengan keadaan habitatnya. Vegetasi-vegetasi hutan tersebut akan membentuk satuan vegetasi hutan yang dikenal dengan formasi hutan. Formasi hutan tersebut akan berbeda dengan kawasan hutan lainnya meskipun kedua kawasan tersebut memiliki persamaan, baik geologi, topografi, maupun ketinggian tempat (Arief, 1994).

Tabel (Table) 4. Sepuluh jenis vegetasi tingkat pohon dengan Indeks Nilai Penting tertinggi di daerah koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi (*Ten vegetation types of tree level with highest important value index at the area of Coridor Nature Reserve North Tamrau Mountains and Game Reserve Jamursba Medi*)

Nama botani (<i>Botanical name</i>)	Famili (<i>Family</i>)	KR (%)	FR (%)	DR (%)	INP (%)
<i>Lithocarpus rufovillosus</i>	Fagaceae	16,25	1,37	5,95	23,79
<i>Intsia palembanica</i>	Fabaceae	2,50	4,11	17,18	23,57
<i>Pometia pinnata</i>	Sapindaceae	6,88	4,11	7,79	18,78
<i>Chisocheton ceramicus</i>	Meliaceae	4,38	4,11	3,04	11,53
<i>Drypetes longifolia</i>	Euphorbiaceae	5,63	2,74	2,42	10,78
<i>Pimelliodendron amboinicum</i>	Euphorbiaceae	4,38	4,11	2,27	10,75
<i>Disoxylum octandrum</i>	Meliaceae	2,50	4,11	3,61	10,22
<i>Canarium decumanum</i>	Burseraceae	0,63	1,37	7,12	9,11
<i>Linociera macrophylla</i>	Oleaceae	3,13	1,37	3,65	8,15
<i>Parishia</i> sp	Anacardiaceae	3,13	1,37	3,54	8,03

Catatan (*Note*): KR = Kerapatan relatif (*Relative density*)
 FR = Frekuensi relatif (*Relative frequency*)
 DR = Dominansi relatif (*Relative dominant*)
 INP = Indeks Nilai Penting (*Important Value Index*)

Dari Tabel 4 terlihat bahwa untuk tingkat pertumbuhan pohon, *L. rufovillosus* masih merupakan jenis yang memiliki INP tertinggi (23,57 %). Hal ini disebabkan karena *L. rufovillosus* memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dengan habitatnya. *L. rufovillosus* selain memiliki INP tertinggi juga memiliki kerapatan individu yang tertinggi ($K = 65$ batang/ha) namun penyebaran jenis ini tidak merata di lokasi penelitian ($FR = 1,37$). Hasil pengamatan di lapangan, khusus untuk *L. rufovillosus* umumnya tumbuh pada habitat di atas 150 m dpl yaitu pada lereng-lereng dan punggung bukit. *I. palembanica* (Caesalpinaceae) merupakan jenis pohon yang memiliki INP tertinggi nomor dua namun jenis ini memiliki kerapatan individu yang sangat rendah ($K = 10$ batang/ha). Jenis lainnya yang memiliki kerapatan individu yang sangat rendah adalah *Dysoxylum octandrum* ($K = 10$ batang/ha), *D. longifolia* ($K = 7,5$ batang/ha), dan *Canarium decumanum* ($K = 3$ batang/ha). Keadaan ini bukan disebabkan kemampuan adaptasi *I. palembanica* yang rendah terhadap habitatnya, tetapi disebabkan adanya faktor seleksi alam yaitu semai *I. palembanica* untuk mencapai fase pertumbuhan tingkat pancang sangat sulit. Di samping itu semai jenis ini sering dikonsumsi oleh satwa liar (rusa). *P. pinnata* (Sapindaceae) yang merupakan jenis pohon dengan INP tertinggi ketiga ternyata memiliki kerapatan individu yang cukup tinggi (28 batang/ha). Jenis *P. pinnata* paling banyak dijumpai pada habitat dengan ketinggian di bawah 150 m dpl, jenis ini sering dijumpai tumbuh bersama-sama dengan *I. palembanica* dan *Intsia bijuga*.

5. Struktur Komunitas Tumbuhan Dominan

Berdasarkan hasil analisis vegetasi, struktur komunitas tumbuhan berkayu hutan hujan tropis di kawasan hutan dataran rendah koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi adalah sebagai berikut : fase semai, pancang, tiang, dan pohon masing-masing dikuasai oleh *D. longifolia*, *C. indica*, dan *L. rufovillosus* (Tabel 5).

Dari Tabel 5 tampak bahwa struktur komunitas tumbuhan dominan pada hutan hujan dataran rendah koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi memiliki kecenderungan yang tidak normal. Menurut Arief (2001) hal ini disebabkan adanya persaingan antara individu dalam suatu jenis maupun antara jenis yang berbeda terhadap penyerapan unsur hara, air, sinar matahari, ataupun tempat tumbuh. Sedangkan Ewusie (1990) menyatakan bahwa keadaan tersebut disebabkan oleh dua faktor yang saling berkaitan yaitu strategi jenis tersebut untuk mempertahankan keberadaannya dan adanya faktor seleksi alam yang disebut seleksi -r. Hubungan kedua faktor tersebut adalah untuk mempertahankan keseimbangan dan keberadaan jenis tersebut di alam yang pada akhirnya peran kuantitas jenis akan berubah menjadi kualitas jenis.

Jenis *D. longifolia* yang pada fase semai memiliki dominansi tertinggi, sedangkan pada fase pancang terjadi pergeseran di mana jenis yang memiliki dominansi tertinggi adalah *C. indica*. Jenis *D. longifolia* ada pada tingkat pancang, tiang, dan pohon namun jenis ini tidak bersifat dominan.

Demikian pula dengan jenis *C. indica* meskipun terdapat pada tingkat semai, tiang,

Tabel (Table) 5. Struktur komunitas tumbuhan dominan pada koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi (*Community structure of dominant plant at the area of corridor Nature Reserve North Tamrau Mountains and Game Resrve Jamurba-Medi*)

No. (Number)	Fase pertumbuhan (Growth level)	Nama botani (Botanical name)	Famili (Family)	Kerapatan (Density) (n/ha)
1.	Semai (Seedling)	<i>Drypetes longifolia</i>	Euphorbiaceae	5750
2.	Pancang (Sapling)	<i>Canarium indica</i>	Burseraceae	250
3.	Tiang (Pole)	<i>Lithocarpus rufovillosus</i>	Fagaceae	125
4.	Pohon (Tree)	<i>Lithocarpus rufovillosus</i>	Fagaceae	65

dan pohon tetapi jenis ini tidak bersifat dominan. Jenis *L. rufovillosus* yang pada fase semai dan pancang tidak memiliki dominansi tertinggi tetapi pada tingkat tiang dan pohon memiliki dominansi yang tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa struktur komunitas vegetasi hutan hujan dataran rendah koridor CA Pegunungan Tamrau dan SM Jamursba-Medi memiliki dinamika yang sangat aktif dan terjadi kecenderungan-kecenderungan suksesi di luar dugaan.

Menurut Ewusie (1990), hampir setiap populasi memiliki tiga umur ekologi, yaitu umur pra-biak, biak, dan pasca biak, keadaan ini mengacu pada rentang waktu nisbi setiap tahapan itu dalam rentang hidup populasi. Sering pembiakan terbatas pada kelompok umur menengah dan yang lebih tua, terutama pada tumbuhan dan hewan tingkat yang lebih tinggi. Secara kasar dapat dilihat adanya tiga jenis struktur umur, yaitu (a) Populasi yang berkembang pesat yang biasanya sebagian besar terdiri dari individu muda; (b) Populasi dengan sebaran kelas umur yang merata; dan (c) Populasi yang menurun dengan sebagian besar terdiri dari individu tua. Dalam penelitian dapat diketahui bahwa dinamika struktur komunitas tumbuhan dominan adalah populasi yang menurun dengan sebagian besar terdiri dari individu tua.

6. Struktur Populasi Beberapa Jenis Dominan

Berdasarkan hasil analisis vegetasi, struktur populasi tiga jenis vegetasi dominan pada hutan hujan tropis di kawasan hutan dataran rendah koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi secara lengkap disajikan pada Tabel 6.

Pada Tabel 6 tampak bahwa struktur populasi *L. rufovillosus* tergolong normal

karena jumlah individu muda (semai, pancang, dan tiang) lebih banyak dari individu yang dewasa (pohon). Walaupun pada tingkat permudaan semai dan pancang jenis ini memiliki individu yang sama, namun pada fase tiang terjadi pengurangan individu sebesar 375 individu (500-125) atau 75 %, hanya 25 % yang mencapai fase tiang. Dari fase tiang ke pohon terjadi pengurangan individu sebesar 24,75 atau 99,8 %, hanya 0,2 % yang mencapai fase pohon.

Struktur populasi *D. longifolia* dan *C. indica* tergolong tidak normal karena tidak terdapat individu pada tingkat tiang. Kedua jenis vegetasi ini merupakan jenis pohon berukuran besar dengan diameter batang dapat mencapai 200-250 m, umumnya tumbuh pada hutan alam (primer) di Papua dan merupakan jenis yang pertumbuhannya lambat. Walaupun pada fase semai *D. longifolia* memiliki jumlah individu yang banyak (5.750 individu/ha), namun pada fase pancang terjadi penurunan jumlah individu yang sangat drastis sebanyak 5.625 atau 97,83 %. Jadi hanya 2,17 % yang mencapai fase pancang. Kehadiran individu jenis *D. longifolia* pada fase tiang tidak ada namun pada fase pohon terdapat individu yaitu 0,75 individu/ha. Kecenderungan yang sama diperlihatkan oleh *C. indica*, yaitu pada tingkat permudaan semai dan pancang memiliki jumlah individu yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa jenis ini pada tingkat semai dan pancang memiliki kemampuan bersaing dan beradaptasi yang tinggi dengan lingkungan habitatnya. Namun kehadiran individu jenis ini pada fase tiang tidak ada tetapi pada fase pohon terdapat individu yaitu 0,5 individu/ha. Struktur populasi demikian merupakan fenomena yang perlu untuk dipelajari secara seksama melalui penelitian

Tabel (Table) 6. Struktur populasi tiga jenis vegetasi dominan (*Population structure of three dominant vegetation types*)

No. (Number)	Tingkat pertumbuhan (Growth level)	<i>Lithocarpus rufovillosus</i> K (Ind/ha)	<i>Drypetes longifolia</i> K (Ind/ha)	<i>Canarium indica</i> K (Ind/ha)
1.	Semai (<i>Seedling</i>)	500	5750	250
2.	Pancang (<i>Sapling</i>)	500	125	250
3.	Tiang (<i>Pole</i>)	125	-	-
4.	Pohon (<i>Tree</i>)	0,25	0,75	0,5

Catatan (Note) : K = Kerapatan (*Density*)

ekologi tumbuhan, khususnya menyangkut dinamika populasi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Lokasi penelitian terletak di hutan koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi terdapat 50 jenis pohon, 22 jenis tiang, 21 jenis pancang, dan 42 jenis anakan.
2. Pada tingkat semai tumbuhan berkayu *D. longifolia* memiliki Indeks Nilai Penting (INP) tertinggi (19,59 %), tingkat pancang *C. indica* memiliki INP tertinggi (33,46 %), sedangkan pada tingkat tiang dan pohon *L. rufovillosus* memiliki INP tertinggi, masing-masing (33,76 %) dan (23,79 %).
3. Struktur populasi vegetasi pada hutan dataran rendah koridor CA Pegunungan Tamrau dan SM Jamursba-Medi menunjukkan struktur populasi yang tidak normal yaitu miskin vegetasi pada tingkat tiang dan pancang.

B. Saran

Perlu untuk dilakukan suatu kajian ekologi terhadap komunitas dan habitat vegetasi pada hutan dataran rendah koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi, khususnya menyangkut dinamika populasi. Struktur komunitas vegetasi di lokasi penelitian ini memiliki dinamika yang sangat aktif dan kecenderungan-kecenderungan suksesi di luar dugaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. 1994. Hutan Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Arief, A. 2001. Hutan dan Kehutanan. Kanisius. Yogyakarta.
- Ewusie, J. Y. 1990. Pengantar Ekologi Tropika. Institut Teknologi Bandung (ITB). Bandung.
- Hardjowigeno, S. 1987. Ilmu Tanah Mediatama Sara Perkasa.
- Kuswandi, R., H. Remetwa, dan M.J. Tokede. 1993. Analisis komposisi jenis vegetasi di Kelompok Hutan Prafi dan Tuanwouwi, Manokwari. Paratropika, Journal Penelitian Kehutanan I(2):19-30.
- Petocz, R. G. 1987. Konservasi Alam dan Pembangunan di Irian Jaya. Pustaka Grafitipers. Jakarta.
- Polunin, N. 1997. Teori Ekosistem dan Penerapannya. Gadjah Mada University Press.
- Primack, Supriatna, Indrawan, dan Kramadibrata. 1998. Biologi Konservasi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Setio, P., H. Remetwa, T. M. Untarto, H. S. Innah dan A. Tuharea. 2001. Kajian keanekaragaman hayati di Cagar Alam Pegunungan Tamrau Utara. Materi disampaikan pada Ekspose Hasil-Hasil Penelitian BPK Manokwari, 12 Desember 2001.
- Stephen, J.R. dan S. Suryadi (editors). 2002. A biodiversity assessment of Yongsu – Cyclop mountains and the Southern Memberamo basin, Papua, Indonesia. RAP Bulletin of Biological Assessment 25. Conservation International, Washington, DC, USA.

Lampiran (Appendix) 1. Hasil analisis vegetasi tingkat semai pada koridor C.A. Pegunungan Tamrau Utara dan Suaka Margasatwa Jamursba-Medi (*The analysis results of vegetation seedlings level at the corridor Native Preserve North Tamrau Mountain and Game Reserve Jamursba-Medi*)

No. (Number)	Nama botani (Botanical name)	Kerapatan (Density)	KR (Relative density) %	Frekuensi (Frequency)	FR (Relative frequency) %	INP (Important Value Index) %
1	<i>Syzigium</i> sp.	1.500	4,20	0,15	6,98	11,17
2	<i>Pterygota horsfieldii</i>	1.000	2,80	0,10	4,65	7,45
3	<i>Diospyros</i> s.p.	250	0,70	0,03	1,16	1,86
4	<i>Chisocheton ceramicus</i>	1.000	2,80	0,08	3,49	6,29
5	<i>Ficus coonora</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
6	<i>Palaquium lobianum</i>	1.000	2,80	0,10	4,65	7,45
7	<i>Aglaia</i> sp.	250	0,70	0,03	1,16	1,86
8	<i>Drypetes longifolia</i>	5.750	16,08	0,25	11,63	27,71
9	<i>Cloaxylon polot</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
10	<i>Gonocaryum</i> sp.	1.000	2,80	0,03	3,49	6,29
11	<i>Inocarpus fagiverus</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
12	<i>Pimellioidendron amboinensis</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
13	<i>Pandanus tectorius</i>	7.250	20,28	0,03	3,49	23,77
14	<i>Memecylon</i> sp.	1.750	4,90	0,18	8,14	13,03
15	<i>Ryparosa</i> sp.	1.000	2,80	0,10	4,65	7,45
16	<i>Dacusocarpus walichianus</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
17	<i>Lithocarpus rufovillosus</i>	500	1,40	0,05	2,33	3,72
18	<i>Neprolepis indica</i>	1.250	3,5	0,03	5,81	9,31
19	<i>Xanthophyllum</i> sp.	250	0,70	0,03	1,16	1,86
20	<i>Calophyllum postanum</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
21	<i>Urandra brasii</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
22	<i>Linociera macrophylla</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
23	<i>Canarium indica</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
24	<i>Pisonia grandis</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
25	<i>Actinodaphne nitida</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
26	<i>Pometia pinnata</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
27	<i>Drypetes glabosa</i>	500	1,40	0,03	1,16	2,56
28	<i>Vatica papuana</i>	2.000	5,59	0,10	4,65	10,25
29	<i>Myristica tubiflora</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
30	<i>Blumeodendron concolor</i>	500	1,40	0,03	1,16	2,56
31	<i>Elaeocarpus grandiflora</i>	500	1,40	0,03	1,16	2,56
32	<i>Litsea tuberculata</i>	500	1,40	0,03	1,16	2,56
33	<i>Celtis latifolia</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
34	<i>Alphitonia microcarpa</i>	750	2,10	0,05	2,33	4,42
35	<i>Glochidion</i> sp.	2.000	5,59	0,03	1,16	6,76
36	<i>Chrysophyllum</i> sp.	250	0,70	0,03	1,16	1,86
37	<i>Pentaphalangium</i> sp.	250	0,70	0,03	1,16	1,86
38	<i>Disoxyllum octandrum</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
39	<i>Gnetum gnemon</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
40	<i>Duabanga moluccana</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
41	<i>Heritiera ovigiera</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
42	<i>Semecarpus papuana</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
Jumlah (Total)		35.750	100	2,15	100	200

Lampiran (Appendix) 2. Hasil analisis vegetasi tingkat pancang pada koridor C.A. Pegunungan Tamrau Utara dan Suaka Margasatwa Jamursba-Medi (The analysis results of vegetation sampling level at the corridor Nature Reserve North Tamrau Mountain and Game Reserve Jamursba-Medi)

No. (Number)	Nama botani (Botanical name)	Kerapatan (Density)	KR (Relative density)	Frekuensi (Frequency)	FR (Relative frequency)	Dominansi (Dominance)	DR (Relative dominance)	INP (Important Value Index)
			%		%		%	%
1	<i>Actinodaphne nitida</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,04	1,33	6,94
2	<i>Blumeodendron concolor</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,01	0,33	5,94
3	<i>Callophyllum postanum</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,04	1,33	6,94
4	<i>Canarium indica</i>	250	4,76	0,13	3,23	0,87	29,57	37,56
5	<i>Celtis latifolia</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,01	0,33	5,94
6	<i>Chisocheton ceramikus</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,09	2,99	8,60
7	<i>Chrysophyllum sp.</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,04	1,33	6,94
8	<i>Dacusocarpus wallichianus</i>	250	4,76	0,25	6,45	0,16	5,32	16,53
9	<i>Diospyros sp.</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,16	5,32	10,92
10	<i>Drypetes longifolia</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,01	0,33	5,94
11	<i>Gonocaryum sp.</i>	250	4,76	0,13	3,23	0,09	2,99	10,98
12	<i>Inocarpus fagiverus</i>	250	4,76	0,25	6,45	0,09	2,99	14,2
13	<i>Intsia palembanica</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,20	6,65	12,25
14	<i>Lithocarpus rufovillosus</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,12	3,99	16,74
15	<i>Litsea tuberculata</i>	500	9,52	0,13	3,23	0,09	2,99	8,6
16	<i>Mangifera laurina</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,04	1,33	6,94
17	<i>Maniltoa brownoides</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,04	1,33	9,32
18	<i>Memecylon sp.</i>	250	4,76	0,13	3,23	0,20	6,65	12,25
19	<i>Myristica tubiflora</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,01	0,33	5,94
20	<i>Palaquium lobianum</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,16	5,32	10,92
21	<i>Parishia sp.</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,04	1,33	6,94
22	<i>Pterygota horsfieldia</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,09	2,99	8,6
23	<i>Schizomeria catastega</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,01	0,33	5,94
24	<i>Semecarpus papuana</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,04	1,33	6,94
25	<i>Sizygium sp.</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,06	1,99	15,59
26	<i>Terminalia canaliculata</i>	375	7,14	0,25	6,45	0,01	0,33	5,94
27	<i>Urandra brasii</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,04	1,33	6,94
28	<i>Vatica papuana</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,23	7,64	22,77
	Jumlah (Total)	625	11,91	0,13	3,23	2,95	100	300
		5.250	100	3,875	100			

Lampiran (Appendix) 3. Hasil analisis vegetasi tingkat tiang pada koridor C.A Pegunungan Tamrau Utara dan Suaka Margasatwa Jamursba-Medi Sorong (*The analysis results of vegetation pole level at the corridor Nature Reserve North Tamrau Mountain and Game Reserve Jamursba-Medi Sorong*)

No. (Number)	Nama latin (Latin name)	Kerapatan (Density)	O (Relative density)	Frekuensi (Frequency)	FR (Relative frequency)	Dominansi (Dominance)	DR (Relative dominance)	INP (Important Value Index)
			%		%		%	%
1	<i>Abroma angustifolia</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Blumeodendron concolor</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Chisocheton ceramicus</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Disoxylum molle</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<i>Drypetes glabosa</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Elaeocarpus sphaericus</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Garcinia dulcis</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<i>Gymnarchantera paniculata</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<i>Haplolobus floribunda</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<i>Haplolobus lanceolatus</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<i>Knema</i> sp.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<i>Lithocarpus rufovillosus</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<i>Madhuca crasipes</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<i>Memecylon</i> sp.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<i>Myristica</i> sp.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<i>Parishia</i> sp.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<i>Pisonia umbellifera</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<i>Pterygota horsfieldia</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<i>Reinwardtiadendron</i> sp.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<i>Schizomeria catastega</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<i>Semecarpus papuana</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<i>Syzgium</i> sp.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<i>Urandra brasii</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah (Total)		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Lampiran (Appendix) 4. Hasil analisis vegetasi tingkat pohon pada Koridor C.A. Pegunungan Tamrau Utara dan Suaka Margasatwa Jamursba-Medi Sorong (The analysis results of vegetation tree level at the corridor Nature Reserve North Tamrau Mountain and Game Reserve Jamursba-Medi)

No.	Nama botani	Kerapatan	KR	FR	Dominansi	DR	INP
(Number)	(Botanical name)	(Density)	(Relative Frekuensi density) (Frequency)	(Relative frequency)	(Dominance)	(Relative dominance)	(Important Value Index)
			%	%		%	%
1	<i>Actinodaphne nitida</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,09	2,30
2	<i>Anisoptera costata</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,23	2,80
3	<i>Artocarpus communis</i>	5,0	1,25	0,50	2,74	0,06	4,21
4	<i>Blumeodendron concolor</i>	10,0	2,50	0,50	2,74	0,76	7,91
5	<i>Calophyllum postanum</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,04	2,13
6	<i>Cananga odorata</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,30	3,05
7	<i>Canarium asperum</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,03	2,09
8	<i>Canarium indica</i>	7,5	1,88	0,50	2,74	0,70	7,08
9	<i>Canarium decumanum</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	2,01	9,11
10	<i>Celtis latifolia</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,04	2,15
11	<i>Celtis philipinensi</i>	5,0	1,25	0,50	2,74	0,05	4,16
12	<i>Chisocheton ceramicus</i>	17,5	4,38	0,75	4,11	0,86	11,53
13	<i>Chrysophyllum sp.</i>	7,5	1,88	0,50	2,74	0,72	7,17
14	<i>Cloaxylon polot</i>	5,0	1,25	0,25	1,37	0,07	2,86
15	<i>Dendrocnide peltata</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,02	2,06
16	<i>Disoxylum acutangulum</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,11	2,39
17	<i>Disoxylum molle</i>	7,5	1,88	0,25	1,37	0,25	4,11
18	<i>Disoxylum octandrum</i>	10,0	2,50	0,75	4,11	1,02	10,22
19	<i>Dracontomelon doa</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,49	3,73
20	<i>Drypetes glabosa</i>	7,5	1,88	0,50	2,74	0,26	5,54
21	<i>Drypetes longifolia</i>	22,5	5,63	0,50	2,74	0,68	10,78
22	<i>Eugenia anomala</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,79	4,78
23	<i>Ficus coonora</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,03	2,09
24	<i>Garcinia dulcis</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,17	2,58
25	<i>Gnetum gnemon</i>	12,5	3,13	0,50	2,74	0,18	6,51
26	<i>Haplolobus lanceolatus</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,31	3,11
27	<i>Heritira ovigiera</i>	7,5	1,88	0,25	1,37	0,36	4,52
28	<i>Homalium foetidum</i>	5,0	1,25	0,25	1,37	0,26	3,55
29	<i>Intsia palembanica</i>	10,0	2,50	0,75	4,11	4,86	23,79
30	<i>Linociera macrophylla</i>	12,5	3,13	0,25	1,37	1,03	8,15
31	<i>Lithocarpus rufovillosus</i>	65,0	16,25	0,25	1,37	1,68	23,57
32	<i>Litsea sp.</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,02	2,08
33	<i>Litsea tuberculata</i>	7,5	1,88	0,50	2,74	0,54	6,52
34	<i>Madhuca crasipes</i>	10,0	2,50	0,25	1,37	0,33	5,05
35	<i>Memecylon sp.</i>	10,0	2,50	0,25	1,37	0,37	5,16
36	<i>Mesua ferea</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,18	2,62
37	<i>Paraltropis philipinensis</i>	5,0	1,25	0,25	1,37	0,24	3,48
38	<i>Parartocarpus venenosa</i>	7,5	1,88	0,50	2,74	0,37	5,92
39	<i>Parishia sp.</i>	12,5	3,13	0,25	1,37	1,00	8,03
40	<i>Pentaphalangium pachycarpum</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,02	2,06
41	<i>Pimelliodendron amboinensis</i>	17,5	4,38	0,75	4,11	0,64	10,75
42	<i>Pisonia umbellifera</i>	5,0	1,25	0,25	1,37	0,04	2,77
43	<i>Pometia pinnata</i>	27,5	6,88	0,75	4,11	2,20	18,78
44	<i>Pterygota horsfieldii</i>	5,0	1,25	0,50	2,74	0,31	5,10
45	<i>Reinwardtiadendron sp.</i>	5,0	1,25	0,25	1,37	0,38	3,95
46	<i>Ryparosa sp.</i>	5,0	1,25	0,25	1,37	0,21	3,35
47	<i>Semecarpus papuana</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,21	2,75
48	<i>Spentum andum</i>	5,0	1,25	0,25	1,37	1,14	6,64
49	<i>Spondias dulcis</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,03	2,09
50	<i>Urandra brasii</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,17	2,58
51	<i>Vatica papuana</i>	7,5	1,88	0,25	1,37	0,83	6,18
52	<i>Xanthostemon sp.</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,59	4,09
Jumlah		400	100	18,25	100	28,28199	300,00

ANALISIS VEGETASI PADA HUTAN KORIDOR CAGAR ALAM
PEGUNUNGAN TAMRAU UTARA DAN SUAKA MARGASATWA
JAMURSBA-MEDI SORONG

(Vegetation Analysis on Forest Corridor of Nature Reserve Mountain Range at North
Tamrau and The Game Reserve Jamursba-Medi Sorong)

Oleh / By :

Krisma Lekitoo, Julius D. Nugroho, dan / and Rocky CH. Metalmety

ABSTRACT

Nature Reserve of North Tamrau Mountains and Game Reserve Jamursba-Medi were two conservation areas at Papua. These two areas were established in 2000 and were suggested to be merged into one national park of North Tamrau Mountain – Jamursba-Medi. This national park is a conservation areal and it has some priorities based on types, endemic, habitat diversity and unique values. This study is to know stucture and composition of wooden plants on both forests. This study used descriptif method and the data were collected by doing survey. Sampling vegetation used in this study were based on modified sampling plot of Witthaker. The plots were laid down purposifly considering to slope, elevation and distance from river factors. Results of this study showed that population of forest on both locations consisted of 52 kinds of trees, 23 kinds of poles, 28 kinds of boundary poles and 42 kinds of young plants. For level of tree, there were found 23 families, level of pole were 15 families, level of boundary pole were 18 families and level of young plant were 30 families. On level seedling, there were dominated by *Drypetes longifolia*, *Memecylon sp.*, and *Sizygium sp.*, on level pertaining to youth boundary poles were dominated by *Canarium indica*, *Vatica papuana*, and *Lithocarpus rufovillosus*, youth poles were dominated by *L. rufovillosus*, *Reinwardtiidendron sp.*, and *Urandra brasii*, while on level of trees were dominated by *L. rufovillosus*, *Intsia palembanica*, and *Pometia pinnata*.

Key words : Analysis, vegetation, corridor, nature reserve, game reserve, Tamrau, Jamursba-Medi

ABSTRAK

Cagar Alam Pegunungan Tamrau Utara dan Suaka Margasatwa Jamursba Medi adalah dua kawasan konservasi yang terdapat di Papua. Kedua kawasan konservasi ini mulai tahun 2000 telah diusulkan untuk digabungkan menjadi satu yaitu kawasan Taman Nasional Pegunungan Tamrau Utara – Pantai Jamursba-Medi. Sebagai kawasan konservasi kedua kawasan itu memiliki beberapa prioritas yang berdasarkan pada kekayaan jenis, keanekaragaman habitat, dan nilai keunikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur dan komposisi jenis tumbuhan berkayu pada hutan dataran rendah koridor Cagar Alam (CA) Pegunungan Tamrau Utara dan Suaka Margasatwa (SM) Jamursba-Medi Sorong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik survey. Pengambilan contoh vegetasi menggunakan petak contoh Witthaker yang telah dimodifikasi. Peletakan petak contoh dilakukan secara purposif dengan memperhatikan faktor kelerengan, ketinggian tempat, dan jarak dari sungai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa populasi hutan di koridor C.A. Pegunungan Tamrau Utara – S.M. Pantai Jamursba-Medi tersusun atas 52 jenis pohon, 23 jenis tiang, 28 jenis pancang, dan 42 jenis anakan. Pada tingkat pohon terdapat 23 famili, tingkat tiang 15 famili, tingkat pancang 18 famili, dan tingkat anakan 30 famili. Pada tingkat permudaan semai vegetasi berkayu (pohon) yang dominan adalah *Drypetes longifolia*, *Memecylon sp.*, dan *Sizygium sp.*; pada tingkat permudaan pancang jenis yang dominan adalah *Canarium indica*, *Vatica papuana*, dan *Lithocarpus rufovillosus*; tingkat permudaan tiang jenis yang dominan adalah *L. rufovillosus*, *Reinwardtiidendron sp.*, dan *Urandra brasii*; sedangkan pada tingkat pohon jenis yang dominan adalah *L. rufovillosus*, *Intsia palembanica*, dan *Pometia pinnata*.

Kata kunci : Analisis, vegetasi, koridor, cagar alam, suaka margasatwa, Tamrau, Jamursba-Medi

I. PENDAHULUAN

Provinsi Papua dengan luas 416.000 km² merupakan daerah tropik yang memiliki kekayaan sumberdaya alam flora dan fauna yang beragam. Jumlah flora yang terdapat di Papua lebih kurang 15.000-20.000 jenis (Petocz, 1987). Flora penyusun hutan tropis menurut Polunin (1997) terdiri atas lumut, jamur paku-pakuan, herba, liana, epifit, palem, rotan, bambu, perdu, dan pohon.

Pada dasarnya pemanfaatan sumberdaya alam berupa hutan harus dikelola secara optimal, berkesinambungan, dan lestari. Salah satu langkah terpenting dalam melestarikan komunitas hayati adalah dengan penentuan kawasan lindung secara legal. Penetapan kawasan lindung dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun dua mekanisme yang paling utama yaitu melalui penetapan pemerintah dan oleh organisasi konservasi (Primack *et al.*, 1998).

Banyak potensi keragaman hayati flora dan fauna yang ada saat ini telah mengalami tekanan, baik habitat maupun populasinya yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat maupun aktivitas pembalakan oleh pihak swasta. Di sisi lain kegiatan penelitian untuk mengetahui potensi dan jenis vegetasi guna pengelolaan lebih lanjut sesuai status kawasan belum banyak dilakukan.

Cagar Alam (CA) Pegunungan Tamrau Utara merupakan salah satu kawasan suaka alam yang telah dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 820/Kpts/Um/11/1982 tanggal 10 November 1982. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan suaka alam berdasarkan usulan Petocz (1987) yang menduga bahwa di dalam kawasan tersebut memiliki keanekaragaman hayati yang unik dan bentang alam yang spesifik. Kawasan ini termasuk dalam dua kabupaten yaitu Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong. Sementara itu Suaka Margasatwa (SM) Jamursba-Medi terletak di Kecamatan Sausapor, Kabupaten Sorong. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan suaka alam karena merupakan pantai tempat peneluran penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*). Kedua kawasan suaka alam tersebut mulai tahun 2000 telah diusulkan untuk digabung menjadi satu kawasan

Taman Nasional Pegunungan Tamrau Utara – Pantai Jamursba-Medi. Sebagai kawasan lindung, kedua kawasan tersebut memiliki beberapa prioritas yang didasarkan pada kekayaan jenis, keendemikan, keanekaragaman habitat, dan nilai keunikan. Usulan penggabungan kedua kawasan lindung ini dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pelestarian flora dan fauna di kedua kawasan tersebut, pemanfaatan yang lestari, melindungi hak-hak adat masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di sekitarnya dalam pengelolaan kawasan tersebut. Inisiator pengusulan adalah WWF Bioregional Sahul-Papua, sedangkan studi awal telah dilakukan oleh beberapa instansi terkait termasuk Balai Penelitian Kehutanan Manokwari. Namun sampai saat ini belum ada persetujuan dari pihak Departemen Kehutanan mengenai penggabungan kedua kawasan konservasi tersebut.

Dalam rangka mendukung pengusulan penggabungan kedua kawasan lindung tersebut, maka data mengenai jenis-jenis flora dan keadaan ekologi pada koridor kedua kawasan lindung tersebut perlu diketahui, sehingga diperoleh gambaran umum tentang jenis-jenis flora sebagai data dasar dalam pengelolaan selanjutnya. Fokus perhatian diutamakan pada kelompok tumbuhan berkayu, rotan dan palem, tumbuhan liana, tumbuhan epifit (anggrek) dan bambu.

II. METODOLOGI

A. Lokasi dan Waktu

Penelitian dilakukan pada bulan Agustus tahun 2002 di kawasan hutan koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi yang secara administrasi termasuk wilayah Kampung Saubeba, Kecamatan Sausapor, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua. Daerah ini terletak pada koordinat 0°24'056" BT-132°33'176" LS dan 0°24'063" BT-132°32'928" LS.

Daerah ini beriklim panas dan lembab seperti pada umumnya daerah dataran rendah Papua. Curah hujan dari stasiun cuaca Sorong 2.879 mm per tahun (tipe iklim menurut Oldeman Af) dengan bulan-bulan basah saat ketersediaan air tinggi terjadi pada bulan Maret-September. Pada saat

dilakukan penelitian telah memasuki bulan kering, sehingga tampak jelas keadaan hutan yang sangat kering dengan tumpukan serasah dalam jumlah banyak di lantai hutan.

Daerah penelitian merupakan punggung-punggungan dan bukit-bukit yang tinggi dan tidak teratur. Daerah datar umumnya terhampar pada sisi kiri-kanan sungai. Batuan umumnya berupa batu gamping, konglomerat, batu pasir, dan batu lempung. Jenis tanah umumnya merupakan tanah dari ordo Inceptisols (Eutropepts). Inceptisol adalah tanah-tanah muda tetapi lebih berkembang daripada Entisols. Pada umumnya mempunyai horison kambik. Karena tanah belum berkembang lanjut, kebanyakan tanah ini cukup subur. Tanah ini dulu termasuk tanah Aluvial, Andosol, dan Gleihumus (Hardjowigeno, 1987). Pada daerah yang datar umumnya terdiri atas tanah endapan aluvial, dengan tekstur berpasir hingga debu berpasir; sedangkan pada daerah yang miring umumnya terdiri atas tanah dengan singkapan batuan gamping lepas sehingga sangat peka terhadap longsor maupun erosi.

B. Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain *tally sheet*, papan data lapangan, meteran roll, plakban bening,

plastik *trash bag*, hagameter, *clinometer*, tali nilon besar dan kecil, tali rafia, gunting stek, foto kamera, foto digital, altimeter, peta 1 : 100.000, *Geographic Positioning System* (GPS), parang, kompas, kertas koran, spirtus, alkohol 75 %, alat tulis menulis, dan peralatan penunjang lainnya.

C. Cara Kerja

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik survey. Pengambilan contoh vegetasi menggunakan petak contoh Whittaker yang telah dimodifikasi. Empat petak contoh disebar di daerah penelitian dalam radius diperkirakan sekitar 1 km². Peletakan petak contoh dilakukan secara purposif dengan memperhatikan faktor aspek, lereng, ketinggian tempat, dan jarak dari sungai yang berbeda sehingga dapat diperoleh keragaman habitat yang dapat mewakili lokasi tersebut.

Plot Whittaker ini berukuran 20 m x 50 m yang terdiri dari sepuluh sub plot berukuran 0,5 m x 2 m, dua sub plot berukuran 2 m x 5 m, serta sebuah sub plot berukuran 5 m x 20 m (Gambar 1).

Sub plot ukuran 0,5 m x 2 m dibuat untuk pengamatan tumbuhan herba, anakan, dan rumput. Semua tumbuhan yang tingginya

Gambar (Figure) 1. Sketsa plot Whittaker dan bagian-bagian sub plot (*Whittaker plot sketch and part of sub plots*)

kurang dari 50 cm dihitung kelimpahannya (tanpa pengukuran dbh dan tinggi). Pengukuran di 10 sub plot ini dilakukan lebih dahulu mengingat pengukuran pada sub plot lainnya akan menyebabkan banyak vegetasi terinjak.

Pada sub plot berukuran 2 m x 5 m dilakukan pengamatan semua pohon dengan *Diameter at Breast High* (dbh) 1 cm atau lebih (dicatat dbh dan tinggi semua individu). Pada sub plot berukuran 5 m x 20 m diukur dan diidentifikasi semua tumbuhan berkayu dengan (dbh) 5 cm sampai kurang dari 10 cm. Selanjutnya seluruh plot (kecuali sub plot 2 m x 5 m dan 5 m x 20 m) dilakukan pengukuran dan pengidentifikasian pohon dengan dbh 10 cm atau lebih, tanpa mengukur ulang tumbuhan pada sub plot yang sudah dikerjakan.

Dari hasil pengukuran dapat dihitung besaran-besaran sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Kerapatan (K)} &= \frac{\text{Jumlah individu}}{\text{Luas contoh}} \\ \text{Kerapatan relatif (KR) (\%)} &= \frac{\text{Kerapatan suatu jenis}}{\text{Kerapatan seluruh jenis}} \times 100\% \\ \text{Dominasi (D)} &= \frac{\text{Jumlah bidang dasar}}{\text{Luas contoh}} \\ \text{Dominasi relatif (DR) (\%)} &= \frac{\text{Dominasi dari suatu jenis}}{\text{Dominasi seluruh jenis}} \times 100\% \\ \text{Frekuensi (F)} &= \frac{\text{Jumlah plot ditemukannya suatu jenis}}{\text{Jumlah seluruh plot}} \\ \text{Frekuensi relatif (FR) (\%)} &= \frac{\text{Frekuensi suatu jenis}}{\text{Frekuensi seluruh jenis}} \times 100\% \\ \text{Nilai Penting (NP) (\%)} &= \text{KR} + \text{FR} + \text{DR} \end{aligned}$$

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Struktur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hutan di koridor CA Pegunungan

Tamrau Utara – SM Pantai Jamursba-Medi tersusun atas 53 jenis pohon, 23 jenis tiang, 28 jenis pancang, dan 42 jenis anakan. Pada tingkat pohon terdapat 23 famili, tingkat tiang 15 famili, tingkat pancang 18 famili, dan tingkat semai 30 famili. Struktur populasi tersebut menunjukkan struktur yang tidak normal, miskin vegetasi pada tingkat tiang dan pancang. Demikian pula keragaman famili pada tingkat pohon dan anakan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat tiang dan pancang.

Menurut Polunin (1997), variasi kekayaan spesies tampak nyata tergantung kepada lokasi geografi, variasi dalam ciri lokasi, dan status kesuburan. Sedangkan menurut Ewusie (1990) beberapa tumbuhan hidup dalam lingkungan dengan keanekaragaman yang lebih luas daripada yang lain, dan kebanyakan tumbuhan toleran terhadap jangkauan yang agak sempit pada keadaan lingkungan tertentu. Dengan demikian bagi kebanyakan tumbuhan jika keadaan habitatnya berubah menjadi keadaan yang tidak sesuai atau kurang menguntungkan, mereka akan mati atau tak dapat tumbuh normal. Keadaan ini disebabkan oleh adanya faktor adaptasi dan seleksi alam.

B. Komposisi Floristik

Kurva spesies area (Gambar 2) menunjukkan bahwa penambahan petak contoh hingga petak contoh yang keempat masih memberikan penambahan jenis yang nyata terutama pada tingkat pertumbuhan pohon dan anakan. Kurva ini juga sekaligus menerangkan adanya suatu perbedaan yang sangat nyata dalam komposisi jenis antar petak contoh yang satu dengan petak contoh lainnya.

1. Permudaan Tingkat Semai

Pada fase permudaan terdapat 42 spesies (pohon). *Drypetes longifolia* merupakan jenis penting dalam penyusun populasi pada tingkat permudaan semai kemudian disusul oleh jenis-jenis semai vegetasi berkayu seperti *Memecylon* sp., *Sizygium* sp., *Vatica papuana*, *Neprolepis indica* (non kayu), *Ryparosa* sp., *Palaquium lobianum*, *Chisocheton ceramiquis*, dan *Gonocaryum* sp. (Tabel 1). Hasil analisis vegetasi tingkat

permudaan semai secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Conservation International dalam Stephen dan Suryadi (2002) pada kawasan hutan Jari (Yongsu) di daerah pesisir utara CA Pegunungan Cyclop, Kabupaten Jayapura ditemukan 50 jenis permudaan tingkat semai. Sedangkan hasil penelitian Kuswandi *et al.*

(1993), pada kawasan hutan Prafi Kabupaten Manokwari terdapat 35 jenis tingkat semai dan di kawasan hutan Tuanwouwi Kabupaten Manokwari terdapat 26 jenis tingkat semai. Hasil penelitian Remetwa dalam Setio *et al.* (2001) pada Gunung Arbuejo CA Pegunungan Tamrau Utara ditemukan 63 jenis permudaan tingkat semai. Dengan demikian keanekaragaman

Gambar (Figure) 2. Jumlah akumulatif spesies pada daerah koridor CA Pegunungan Tamrau Utara – SM Pantai Jamursba-Medi (*Total species acumulation at the area of coridor Nature Reserve North Tamrau Mountains and Game Reserve Jamursba-Medi*)

Tabel (Table) 1. Sepuluh jenis vegetasi tingkat anakan dengan indeks nilai penting tertinggi di daerah koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi (*Ten vegetation types seedlings level with highest important value index at the area of oridor Nature Reserve North Tamrau Mountains and Game Reserve Jamursba-Medi*)

Nama botani (Botanical name)	Famili (Family)	K (n/ha)	KR (%)	F (%)	FR (%)	INP (%)
<i>Drypetes longifolia</i>	Euphorbiaceae	5.750	10,41	0,25	9,09	19,59
<i>Memexylon sp.</i>	Melastomataceae	1.750	3,17	0,18	6,36	9,53
<i>Sizygium sp.</i>	Myrtaceae	1.500	2,72	0,15	5,46	8,17
<i>Vatica papuana</i>	Dipterocarpaceae	2.000	3,62	0,10	3,64	7,26
<i>Pterygota horsfieldia</i>	Sterculiaceae	1.000	1,81	0,10	3,64	5,45
<i>Ryparosa sp.</i>	Flacourtiaceae	1.000	1,81	1,10	3,64	5,45
<i>Palaquium lobianum</i>	Sapotaceae	1.000	1,81	0,10	3,64	5,45
<i>Gonocheton ceramiquis</i>	Meliaceae	1.000	1,81	0,08	2,73	4,54
<i>Gonocaryum sp.</i>	Icacinaceae	1.000	1,81	1,08	2,73	4,54
<i>Glochidion sp.</i>	Euphorbiaceae	2.000	3,62	0,03	0,91	4,53

Catatan (Note) : K = Kerapatan (*Density*) KR = Kerapatan relatif (*Relative density*) F = Frekuensi (*Frequency*) FR = Frekuensi relatif (*Relative frequency*) INP = Indeks Nilai Penting (*Important Value Index*)

jenis permudaan tingkat semai pada kawasan koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi tergolong sedang.

Pada Tabel 1 tampak bahwa *D. longifolia* merupakan jenis yang memiliki INP tertinggi (19,60 %). Jenis *D. longifolia* merupakan jenis dominan pada hutan koridor CA Pegunungan Tamrau dan SM Jamursba-Medi disebabkan karena penyebaran individunya yang merata dan jumlah individunya paling banyak. *Memecylon* sp. merupakan jenis dominan kedua (9,53 %), meskipun memiliki jumlah individu yang tidak terlalu banyak (1.750 batang/ha) namun memiliki penyebaran yang cukup merata di lokasi penelitian (FR = 6,36). Sedangkan *Sizygium* sp. merupakan jenis dominan ketiga (8,17 %). Jenis ini memiliki penyebaran merata (FR = 5,46).

2. Permudaan Tingkat Pancang

Pada tingkat pancang dijumpai 21 jenis permudaan, 10 jenis dominan yaitu *Canarium indica*, *V. papuana*, *Lithocarpus rufovillosus*, *Maniltoa brownoides*, *Sizygium* sp., *Inocarpus fagiverus*, *Intsia palembanica*, *Memecylon* sp., *Gonocarium* sp., dan *P. lobianum* (Tabel 2). Hasil analisis vegetasi tingkat pancang secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Conservation International dalam Stephen dan Suyadi.(2002) pada kawasan hutan Jari (Yongsu) di daerah pesisir utara CA Pegunungan Cyclop, Kabupaten Jayapura ditemukan 32 jenis permudaan tingkat pancang. Hasil penelitian Kuswandi *et al.* (1993) pada kawasan hutan Prafi Kabupaten Manokwari ditemukan 51 jenis tingkat pancang dan pada kawasan hutan Tuanwouwi ditemukan 36 jenis tingkat pancang serta hasil penelitian Remetwa dalam Setio *et al.* (2001) pada gunung Arbuejo CA Pegunungan Tamrau Utara ditemukan 51 jenis permudaan tingkat pancang. Oleh karena itu keanekaragaman jenis permudaan tingkat pancang pada kawasan koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi tergolong sangat rendah. Hal ini disebabkan karena penyebaran jenis tingkat pancang pada daerah ini tidak merata.

Dari Tabel 2 tampak bahwa *C. indica* merupakan jenis yang memiliki INP tertinggi pada tingkat pancang (33,46 %). Jenis ini dominan karena penyebarannya merata pada lokasi penelitian dan memiliki rata-rata pertumbuhan diameter baik, bukan karena memiliki jumlah individu yang tinggi (250 batang/ha). *V. papuana* merupakan jenis vegetasi tingkat pancang yang memiliki INP

Tabel (Table) 2. Sepuluh jenis vegetasi tingkat pancang dengan indeks nilai penting tertinggi di daerah koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi (*Ten vegetation types of sapling level with highest important value index at the area of coridor Nature Reserve North Tamrau Mountains and Game Reserve Jamursba-Medi*)

Nama botani (Botanical name)	Famili (Family)	Diameter (cm)	FR (%)	DR (%)	INP (%)
<i>Canarium indica</i>	Burseraceae	3,0	2,86	26,25	33,46
<i>Vatica Papuana</i>	Dipterocarpaceae	2,0	2,86	6,79	20,51
<i>Lithocarpus rufovillosus</i>	Fagaceae	7,0	2,86	3,54	15,09
<i>Dacusocarpus walichianus</i>	Podocarpaceae	3,0	5,72	4,72	14,78
<i>Sizygium</i> sp.	Myrtaceae	2,5	5,71	1,77	14,01
<i>Inocarpus fagiverus</i>	Fabaceae	1,3	5,72	2,66	12,72
<i>Intsia palembanica</i>	Fabaceae	2,0	2,86	5,90	10,93
<i>Memecylon</i> sp.	Melastomataceae	1,5	2,86	5,90	10,39
<i>Gonocarium</i> sp.	Icacinaceae	4,0	2,86	2,66	9,86
<i>Palaquium lobianum</i>	Papilionaceae	4,0	2,86	4,72	9,75

Catatan (Note) : KR = Kerapatan relatif (Relative density)

FR = Frekuensi relatif (Relative frequency)

DR = Dominansi relatif (Relative dominant)

INP = Indeks Nilai Penting (Important Value Index)

tertinggi kedua (20,51 %). Jenis ini merupakan jenis dominan kedua disebabkan karena memiliki jumlah individu banyak (625 batang/ha), bukan karena penyebarannya merata. *L. rufovillosus* merupakan jenis yang memiliki INP tertinggi ketiga (15,09 %). Jenis ini merupakan jenis dominan ketiga bukan karena jumlah individunya tinggi tetapi karena persebarannya cukup merata dan memiliki rata-rata diameter pertumbuhan baik.

3. Permudaan Tingkat Tiang

Vegetasi tingkat tiang di daerah koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi terdiri atas 22 spesies. Jenis yang dominan adalah *L. rufovillosus*, *Reinwardtiodendron* sp., *Urandra brasii*, *C. ceramikus*, *Sizygium* sp., *Haplolobus floribunda*, *Parishia* sp., *Myristica* sp., *Disoxylum molle*, dan *D. glabosa* (Tabel 3). Hasil analisis vegetasi tingkat tiang secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 3.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Conservation International dalam Stephen dan Suryadi (2002) pada kawasan hutan Jari (Yongsu) di daerah pesisir utara CA Pegunungan Cyclop Kabupaten Jayapura ditemukan 27 jenis tingkat tiang. Hasil penelitian Kuswandi *et al.* (1993) pada kawasan hutan Prafi Kabupaten Manokwari

ditemukan 69 jenis tingkat tiang dan di kawasan hutan Tuanwouwi Kabupaten Manokwari ditemukan 44 jenis tingkat tiang. Hasil penelitian Remetwa dalam Setio *et al.* (2001) pada Gunung Arbuejo CA Pegunungan Tamrau Utara ditemukan 21 jenis permudaan tingkat tiang, maka dapat dikatakan keanekaragaman jenis permudaan tingkat tiang pada kawasan koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi tergolong cukup rendah.

Dari Tabel 3 tampak bahwa *L. rufovillosus* merupakan jenis yang memiliki INP tertinggi (33,76 %) meskipun pada fase pancang jenis ini ada pada urutan dominan ke-3. Jenis ini dominan pada fase tiang disebabkan memiliki jumlah individu yang sangat tinggi (200 batang/ha). Walaupun memiliki jumlah individu tinggi namun penyebarannya tidak merata pada lokasi penelitian (FR = 3,85). Penyebaran yang tidak merata disebabkan karena jenis ini umumnya dijumpai pada ketinggian di atas 150 m dpl, pada punggung-punggung bukit dan lereng. Jenis vegetasi lain yang penyebarannya tidak merata adalah *C. ceramikus*, *H. floribunda*, *Myristica* sp., *Parishia* sp., *D. molle*, dan *D. glabosa*. *Reinwardtiodendron* sp. merupakan jenis yang memiliki INP tertinggi kedua (32,26 %) dengan jumlah individu yang cukup banyak (125 batang/ha). Jenis

Tabel (Table) 3. Sepuluh jenis vegetasi tingkat tiang dengan Indeks Nilai Penting tertinggi di daerah koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi (*Ten vegetation types of pole level with highest important value index at the area of coridor Nature Reserve North Tamrau Mountains and Game Reserve Jamursba-Medi*)

Nama botani (Botanical name)	Famili (Family)	KR (%)	FR (%)	DR (%)	INP (%)
<i>Lithocarpus rufovillosus</i>	Meliaceae	12,20	3,85	13,87	33,76
<i>Reinwardtiodendron</i> sp.	Fagaceae	19,51	7,69	4,15	27,51
<i>Urandra brasii</i>	Icacinaceae	7,32	7,69	7,84	22,85
<i>Chisocheton ceramikus</i>	Meliaceae	7,32	3,85	11,60	22,76
<i>Sizygium</i> sp.	Myrtaceae	4,88	7,69	4,80	17,37
<i>Haplolobus floribunda</i>	Burseraceae	4,88	3,85	5,51	14,23
<i>Myristica</i> sp.	Myristicaceae	2,44	3,85	5,25	11,54
<i>Parishia</i> sp.	Anacardiaceae	2,44	3,85	5,25	11,54
<i>Disoxylum molle</i>	Meliaceae	2,44	3,85	4,15	10,43
<i>Drypetes glabosa</i>	Euphorbiaceae	2,44	3,85	4,15	10,43

Catatan (Note): KR = Kerapatan relatif (*Relative density*)
 FR = Frekuensi relatif (*Relative frequency*)
 DR = Dominansi relatif (*Relative dominant*)
 INP = Indeks Nilai Penting (*Important Value Index*)

ini memiliki penyebaran yang cukup merata pada lokasi penelitian ($FR = 7,69$). *U. brasii* merupakan jenis yang memiliki INP tertinggi ketiga (22, 85 %). Jenis ini pada lokasi penelitian memiliki jumlah individu yang setara dengan jenis *C. ceramiquis* (75 batang/ha) namun memiliki penyebaran yang cukup merata ($FR = 7,69$).

4. Tingkat Pohon

Hutan koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi terdiri atas 50 spesies vegetasi tingkat pohon, 10 jenis utama dengan nilai INP tertinggi yaitu *L. rufovillosus*, *I. palembanica*, *P. pinnata*, *C. ceramiquis*, *D. longifolia*, *Pimelliodendron amboinicum*, *Disoxylum octandrum*, *Canarium decumanum*, *Linociera macrophylla*, dan *Parishia* sp. (Tabel 4). Hasil analisis vegetasi tingkat pohon secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 4.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Conservation International dalam Stephen dan Suryadi (2002) pada kawasan hutan Jari (Yongsu) di daerah pesisir utara CA Pegunungan Cyclop Kabupaten Jayapura ditemukan 88 jenis tingkat pohon. Hasil penelitian Kuswandi *et al.* (1993) pada kawasan hutan Prafi Kabupaten Manokwari terdapat 38 jenis tingkat pohon, dan di

kawasan hutan Tuanwouwi Kabupaten Manokwari terdapat 37 jenis tingkat pohon. Sedangkan hasil penelitian Rametwa dalam Setio *et al.* (2001) pada gunung Arbuejo di CA Pegunungan Tamrau Utara ditemukan 56 jenis permudaan tingkat pohon, maka keanekaragaman jenis vegetasi tingkat pohon pada kawasan koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi tergolong rendah sampai sedang. Hal ini disebabkan karena penyebaran jenis vegetasi tingkat pohon pada daerah koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi yang tidak merata. Hasil pengamatan lapangan diketahui bahwa umumnya vegetasi tingkat pohon tumbuh berkelompok membentuk asosiasi-asosiasi vegetasi seperti asosiasi hutan campuran *L. rufovillosus* dan *Vatica papuana*. Proses suksesi yang berlangsung selama bertahun-tahun tersebut akan menciptakan bentuk-bentuk vegetasi yang mampu beradaptasi dengan faktor pembatas dan sesuai dengan keadaan habitatnya. Vegetasi-vegetasi hutan tersebut akan membentuk satuan vegetasi hutan yang dikenal dengan formasi hutan. Formasi hutan tersebut akan berbeda dengan kawasan hutan lainnya meskipun kedua kawasan tersebut memiliki persamaan, baik geologi, topografi, maupun ketinggian tempat (Arief, 1994).

Tabel (Table) 4. Sepuluh jenis vegetasi tingkat pohon dengan Indeks Nilai Penting tertinggi di daerah koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi (*Ten vegetation types of tree level with highest important value index at the area of Coridor Nature Reserve North Tamrau Mountains and Game Reserve Jamursba Medi*)

Nama botani (<i>Botanical name</i>)	Famili (<i>Family</i>)	KR (%)	FR (%)	DR (%)	INP (%)
<i>Lithocarpus rufovillosus</i>	Fagaceae	16,25	1,37	5,95	23,79
<i>Intsia palembanica</i>	Fabaceae	2,50	4,11	17,18	23,57
<i>Pometia pinnata</i>	Sapindaceae	6,88	4,11	7,79	18,78
<i>Chisocheton ceramiquis</i>	Meliaceae	4,38	4,11	3,04	11,53
<i>Drypetes longifolia</i>	Euphorbiaceae	5,63	2,74	2,42	10,78
<i>Pimelliodendron amboinicum</i>	Euphorbiaceae	4,38	4,11	2,27	10,75
<i>Disoxylum octandrum</i>	Meliaceae	2,50	4,11	3,61	10,22
<i>Canarium decumanum</i>	Burseraceae	0,63	1,37	7,12	9,11
<i>Linociera macrophylla</i>	Oleaceae	3,13	1,37	3,65	8,15
<i>Parishia</i> sp	Anacardiaceae	3,13	1,37	3,54	8,03

Catatan (*Note*): KR = Kerapatan relatif (*Relative density*)
 FR = Frekuensi relatif (*Relative frequency*)
 DR = Dominansi relatif (*Relative dominant*)
 INP = Indeks Nilai Penting (*Important Value Index*)

Dari Tabel 4 terlihat bahwa untuk tingkat pertumbuhan pohon, *L. rufovillosus* masih merupakan jenis yang memiliki INP tertinggi (23,57 %). Hal ini disebabkan karena *L. rufovillosus* memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dengan habitatnya. *L. rufovillosus* selain memiliki INP tertinggi juga memiliki kerapatan individu yang tertinggi ($K = 65$ batang/ha) namun penyebaran jenis ini tidak merata di lokasi penelitian ($FR = 1,37$). Hasil pengamatan di lapangan, khusus untuk *L. rufovillosus* umumnya tumbuh pada habitat di atas 150 m dpl yaitu pada lereng-lereng dan punggung bukit. *I. palembanica* (Caesalpinaceae) merupakan jenis pohon yang memiliki INP tertinggi nomor dua namun jenis ini memiliki kerapatan individu yang sangat rendah ($K = 10$ batang/ha). Jenis lainnya yang memiliki kerapatan individu yang sangat rendah adalah *Dysoxylum octandrum* ($K = 10$ batang/ha), *D. longifolia* ($K = 7,5$ batang/ha), dan *Canarium decumanum* ($K = 3$ batang/ha). Keadaan ini bukan disebabkan kemampuan adaptasi *I. palembanica* yang rendah terhadap habitatnya, tetapi disebabkan adanya faktor seleksi alam yaitu semai *I. palembanica* untuk mencapai fase pertumbuhan tingkat pancang sangat sulit. Di samping itu semai jenis ini sering dikonsumsi oleh satwa liar (rusa). *P. pinnata* (Sapindaceae) yang merupakan jenis pohon dengan INP tertinggi ketiga ternyata memiliki kerapatan individu yang cukup tinggi (28 batang/ha). Jenis *P. pinnata* paling banyak dijumpai pada habitat dengan ketinggian di bawah 150 m dpl, jenis ini sering dijumpai tumbuh bersama-sama dengan *I. palembanica* dan *Intsia bijuga*.

5. Struktur Komunitas Tumbuhan Dominan

Berdasarkan hasil analisis vegetasi, struktur komunitas tumbuhan berkayu hutan hujan tropis di kawasan hutan dataran rendah koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi adalah sebagai berikut : fase semai, pancang, tiang, dan pohon masing-masing dikuasai oleh *D. longifolia*, *C. indica*, dan *L. rufovillosus* (Tabel 5).

Dari Tabel 5 tampak bahwa struktur komunitas tumbuhan dominan pada hutan hujan dataran rendah koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi memiliki kecenderungan yang tidak normal. Menurut Arief (2001) hal ini disebabkan adanya persaingan antara individu dalam suatu jenis maupun antara jenis yang berbeda terhadap penyerapan unsur hara, air, sinar matahari, ataupun tempat tumbuh. Sedangkan Ewusie (1990) menyatakan bahwa keadaan tersebut disebabkan oleh dua faktor yang saling berkaitan yaitu strategi jenis tersebut untuk mempertahankan keberadaannya dan adanya faktor seleksi alam yang disebut seleksi -r. Hubungan kedua faktor tersebut adalah untuk mempertahankan keseimbangan dan keberadaan jenis tersebut di alam yang pada akhirnya peran kuantitas jenis akan berubah menjadi kualitas jenis.

Jenis *D. longifolia* yang pada fase semai memiliki dominansi tertinggi, sedangkan pada fase pancang terjadi pergeseran di mana jenis yang memiliki dominansi tertinggi adalah *C. indica*. Jenis *D. longifolia* ada pada tingkat pancang, tiang, dan pohon namun jenis ini tidak bersifat dominan.

Demikian pula dengan jenis *C. indica* meskipun terdapat pada tingkat semai, tiang,

Tabel (Table) 5. Struktur komunitas tumbuhan dominan pada koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi (*Community structure of dominant plant at the area of corridor Nature Reserve North Tamrau Mountains and Game Resrve Jamurba-Medi*)

No. (Number)	Fase pertumbuhan (Growth level)	Nama botani (Botanical name)	Famili (Family)	Kerapatan (Density) (n/ha)
1.	Semai (Seedling)	<i>Drypetes longifolia</i>	Euphorbiaceae	5750
2.	Pancang (Sapling)	<i>Canarium indica</i>	Burseraceae	250
3.	Tiang (Pole)	<i>Lithocarpus rufovillosus</i>	Fagaceae	125
4.	Pohon (Tree)	<i>Lithocarpus rufovillosus</i>	Fagaceae	65

dan pohon tetapi jenis ini tidak bersifat dominan. Jenis *L. rufovillosus* yang pada fase semai dan pancang tidak memiliki dominansi tertinggi tetapi pada tingkat tiang dan pohon memiliki dominansi yang tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa struktur komunitas vegetasi hutan hujan dataran rendah koridor CA Pegunungan Tamrau dan SM Jamursba-Medi memiliki dinamika yang sangat aktif dan terjadi kecenderungan-kecenderungan suksesi di luar dugaan.

Menurut Ewusie (1990), hampir setiap populasi memiliki tiga umur ekologi, yaitu umur pra-biak, biak, dan pasca biak, keadaan ini mengacu pada rentang waktu nisbi setiap tahapan itu dalam rentang hidup populasi. Sering pembiakan terbatas pada kelompok umur menengah dan yang lebih tua, terutama pada tumbuhan dan hewan tingkat yang lebih tinggi. Secara kasar dapat dilihat adanya tiga jenis struktur umur, yaitu (a) Populasi yang berkembang pesat yang biasanya sebagian besar terdiri dari individu muda; (b) Populasi dengan sebaran kelas umur yang merata; dan (c) Populasi yang menurun dengan sebagian besar terdiri dari individu tua. Dalam penelitian dapat diketahui bahwa dinamika struktur komunitas tumbuhan dominan adalah populasi yang menurun dengan sebagian besar terdiri dari individu tua.

6. Struktur Populasi Beberapa Jenis Dominan

Berdasarkan hasil analisis vegetasi, struktur populasi tiga jenis vegetasi dominan pada hutan hujan tropis di kawasan hutan dataran rendah koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi secara lengkap disajikan pada Tabel 6.

Pada Tabel 6 tampak bahwa struktur populasi *L. rufovillosus* tergolong normal

karena jumlah individu muda (semai, pancang, dan tiang) lebih banyak dari individu yang dewasa (pohon). Walaupun pada tingkat permudaan semai dan pancang jenis ini memiliki individu yang sama, namun pada fase tiang terjadi pengurangan individu sebesar 375 individu (500-125) atau 75 %, hanya 25 % yang mencapai fase tiang. Dari fase tiang ke pohon terjadi pengurangan individu sebesar 24,75 atau 99,8 %, hanya 0,2 % yang mencapai fase pohon.

Struktur populasi *D. longifolia* dan *C. indica* tergolong tidak normal karena tidak terdapat individu pada tingkat tiang. Kedua jenis vegetasi ini merupakan jenis pohon berukuran besar dengan diameter batang dapat mencapai 200-250 m, umumnya tumbuh pada hutan alam (primer) di Papua dan merupakan jenis yang pertumbuhannya lambat. Walaupun pada fase semai *D. longifolia* memiliki jumlah individu yang banyak (5.750 individu/ha), namun pada fase pancang terjadi penurunan jumlah individu yang sangat drastis sebanyak 5.625 atau 97,83 %. Jadi hanya 2,17 % yang mencapai fase pancang. Kehadiran individu jenis *D. longifolia* pada fase tiang tidak ada namun pada fase pohon terdapat individu yaitu 0,75 individu/ha. Kecenderungan yang sama diperlihatkan oleh *C. indica*, yaitu pada tingkat permudaan semai dan pancang memiliki jumlah individu yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa jenis ini pada tingkat semai dan pancang memiliki kemampuan bersaing dan beradaptasi yang tinggi dengan lingkungan habitatnya. Namun kehadiran individu jenis ini pada fase tiang tidak ada tetapi pada fase pohon terdapat individu yaitu 0,5 individu/ha. Struktur populasi demikian merupakan fenomena yang perlu untuk dipelajari secara seksama melalui penelitian

Tabel (Table) 6. Struktur populasi tiga jenis vegetasi dominan (*Population structure of three dominant vegetation types*)

No. (Number)	Tingkat pertumbuhan (Growth level)	<i>Lithocarpus rufovillosus</i> K (Ind/ha)	<i>Drypetes longifolia</i> K (Ind/ha)	<i>Canarium indica</i> K (Ind/ha)
1.	Semai (<i>Seedling</i>)	500	5750	250
2.	Pancang (<i>Sapling</i>)	500	125	250
3.	Tiang (<i>Pole</i>)	125	-	-
4.	Pohon (<i>Tree</i>)	0,25	0,75	0,5

Catatan (Note) : K = Kerapatan (*Density*)

ekologi tumbuhan, khususnya menyangkut dinamika populasi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Lokasi penelitian terletak di hutan koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi terdapat 50 jenis pohon, 22 jenis tiang, 21 jenis pancang, dan 42 jenis anakan.
2. Pada tingkat semai tumbuhan berkayu *D. longifolia* memiliki Indeks Nilai Penting (INP) tertinggi (19,59 %), tingkat pancang *C. indica* memiliki INP tertinggi (33,46 %), sedangkan pada tingkat tiang dan pohon *L. rufovillosus* memiliki INP tertinggi, masing-masing (33,76 %) dan (23,79 %).
3. Struktur populasi vegetasi pada hutan dataran rendah koridor CA Pegunungan Tamrau dan SM Jamursba-Medi menunjukkan struktur populasi yang tidak normal yaitu miskin vegetasi pada tingkat tiang dan pancang.

B. Saran

Perlu untuk dilakukan suatu kajian ekologi terhadap komunitas dan habitat vegetasi pada hutan dataran rendah koridor CA Pegunungan Tamrau Utara dan SM Jamursba-Medi, khususnya menyangkut dinamika populasi. Struktur komunitas vegetasi di lokasi penelitian ini memiliki dinamika yang sangat aktif dan kecenderungan-kecenderungan suksesi di luar dugaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. 1994. Hutan Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Arief, A. 2001. Hutan dan Kehutanan. Kanisius. Yogyakarta.
- Ewusie, J. Y. 1990. Pengantar Ekologi Tropika. Institut Teknologi Bandung (ITB). Bandung.
- Hardjowigeno, S. 1987. Ilmu Tanah Mediatama Sara Perkasa.
- Kuswandi, R., H. Remetwa, dan M.J. Tokede. 1993. Analisis komposisi jenis vegetasi di Kelompok Hutan Prafi dan Tuanwouwi, Manokwari. Paratropika, Journal Penelitian Kehutanan I(2):19-30.
- Petocz, R. G. 1987. Konservasi Alam dan Pembangunan di Irian Jaya. Pustaka Grafitipers. Jakarta.
- Polunin, N. 1997. Teori Ekosistem dan Penerapannya. Gadjah Mada University Press.
- Primack, Supriatna, Indrawan, dan Kramadibrata. 1998. Biologi Konservasi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Setio, P., H. Remetwa, T. M. Untarto, H. S. Innah dan A. Tuharea. 2001. Kajian keanekaragaman hayati di Cagar Alam Pegunungan Tamrau Utara. Materi disampaikan pada Ekspose Hasil-Hasil Penelitian BPK Manokwari, 12 Desember 2001.
- Stephen, J.R. dan S. Suryadi (editors). 2002. A biodiversity assessment of Yongsu – Cyclop mountains and the Southern Memberamo basin, Papua, Indonesia. RAP Bulletin of Biological Assessment 25. Conservation International, Washington, DC, USA.

Lampiran (Appendix) 1. Hasil analisis vegetasi tingkat semai pada koridor C.A. Pegunungan Tamrau Utara dan Suaka Margasatwa Jamursba-Medi (*The analysis results of vegetation seedlings level at the corridor Native Preserve North Tamrau Mountain and Game Reserve Jamursba-Medi*)

No. (Number)	Nama botani (Botanical name)	Kerapatan (Density)	KR (Relative density) %	Frekuensi (Frequency)	FR (Relative frequency) %	INP (Important Value Index) %
1	<i>Syzigium</i> sp.	1.500	4,20	0,15	6,98	11,17
2	<i>Pterygota horsfieldii</i>	1.000	2,80	0,10	4,65	7,45
3	<i>Diospyros</i> s.p.	250	0,70	0,03	1,16	1,86
4	<i>Chisocheton ceramicus</i>	1.000	2,80	0,08	3,49	6,29
5	<i>Ficus coonora</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
6	<i>Palaquium lobianum</i>	1.000	2,80	0,10	4,65	7,45
7	<i>Aglaia</i> sp.	250	0,70	0,03	1,16	1,86
8	<i>Drypetes longifolia</i>	5.750	16,08	0,25	11,63	27,71
9	<i>Cloaxylon polot</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
10	<i>Gonocaryum</i> sp.	1.000	2,80	0,03	3,49	6,29
11	<i>Inocarpus fagiverus</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
12	<i>Pimellioidendron amboinensis</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
13	<i>Pandanus tectorius</i>	7.250	20,28	0,03	3,49	23,77
14	<i>Memecylon</i> sp.	1.750	4,90	0,18	8,14	13,03
15	<i>Ryparosa</i> sp.	1.000	2,80	0,10	4,65	7,45
16	<i>Dacusocarpus walichianus</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
17	<i>Lithocarpus rufovillosus</i>	500	1,40	0,05	2,33	3,72
18	<i>Neprolepis indica</i>	1.250	3,5	0,03	5,81	9,31
19	<i>Xanthophyllum</i> sp.	250	0,70	0,03	1,16	1,86
20	<i>Calophyllum postanum</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
21	<i>Urandra brasii</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
22	<i>Linociera macrophylla</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
23	<i>Canarium indica</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
24	<i>Pisonia grandis</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
25	<i>Actinodaphne nitida</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
26	<i>Pometia pinnata</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
27	<i>Drypetes glabosa</i>	500	1,40	0,03	1,16	2,56
28	<i>Vatica papuana</i>	2.000	5,59	0,10	4,65	10,25
29	<i>Myristica tubiflora</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
30	<i>Blumeodendron concolor</i>	500	1,40	0,03	1,16	2,56
31	<i>Elaeocarpus grandiflora</i>	500	1,40	0,03	1,16	2,56
32	<i>Litsea tuberculata</i>	500	1,40	0,03	1,16	2,56
33	<i>Celtis latifolia</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
34	<i>Alphitonia microcarpa</i>	750	2,10	0,05	2,33	4,42
35	<i>Glochidion</i> sp.	2.000	5,59	0,03	1,16	6,76
36	<i>Chrysophyllum</i> sp.	250	0,70	0,03	1,16	1,86
37	<i>Pentaphalangium</i> sp.	250	0,70	0,03	1,16	1,86
38	<i>Disoxyllum octandrum</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
39	<i>Gnetum gnemon</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
40	<i>Duabanga moluccana</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
41	<i>Heritiera ovigiera</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
42	<i>Semecarpus papuana</i>	250	0,70	0,03	1,16	1,86
Jumlah (Total)		35.750	100	2,15	100	200

Lampiran (Appendix) 2. Hasil analisis vegetasi tingkat pancang pada koridor C.A. Pegunungan Tamrau Utara dan Suaka Margasatwa Jamursba-Medi (The analysis results of vegetation sampling level at the corridor Nature Reserve North Tamrau Mountain and Game Reserve Jamursba-Medi)

No. (Number)	Nama botani (Botanical name)	Kerapatan (Density)	KR (Relative density)	Frekuensi (Frequency)	FR (Relative frequency)	Dominansi (Dominance)	DR (Relative dominance)	INP (Important Value Index)
			%		%		%	%
1	<i>Actinodaphne nitida</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,04	1,33	6,94
2	<i>Blumeodendron concolor</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,01	0,33	5,94
3	<i>Callophyllum postanum</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,04	1,33	6,94
4	<i>Canarium indica</i>	250	4,76	0,13	3,23	0,87	29,57	37,56
5	<i>Celtis latifolia</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,01	0,33	5,94
6	<i>Chisocheton ceramikus</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,09	2,99	8,60
7	<i>Chrysophyllum sp.</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,04	1,33	6,94
8	<i>Dacusocarpus wallichianus</i>	250	4,76	0,25	6,45	0,16	5,32	16,53
9	<i>Diospyros sp.</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,16	5,32	10,92
10	<i>Drypetes longifolia</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,01	0,33	5,94
11	<i>Gonocaryum sp.</i>	250	4,76	0,13	3,23	0,09	2,99	10,98
12	<i>Inocarpus fagiverus</i>	250	4,76	0,25	6,45	0,09	2,99	14,2
13	<i>Intsia palembanica</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,20	6,65	12,25
14	<i>Lithocarpus rufovillosus</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,12	3,99	16,74
15	<i>Litsea tuberculata</i>	500	9,52	0,13	3,23	0,09	2,99	8,6
16	<i>Mangifera laurina</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,04	1,33	6,94
17	<i>Maniltoa brownoides</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,04	1,33	9,32
18	<i>Memecylon sp.</i>	250	4,76	0,13	3,23	0,20	6,65	12,25
19	<i>Myristica tubiflora</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,01	0,33	5,94
20	<i>Palaquium lobianum</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,16	5,32	10,92
21	<i>Parishia sp.</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,04	1,33	6,94
22	<i>Pterygota horsfieldia</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,09	2,99	8,6
23	<i>Schizomeria catastega</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,01	0,33	5,94
24	<i>Semecarpus papuana</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,04	1,33	6,94
25	<i>Sizygium sp.</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,06	1,99	15,59
26	<i>Terminalia canaliculata</i>	375	7,14	0,25	6,45	0,01	0,33	5,94
27	<i>Urandra brasii</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,04	1,33	6,94
28	<i>Vatica papuana</i>	125	2,38	0,13	3,23	0,23	7,64	22,77
	Jumlah (Total)	625	11,91	0,13	3,23	2,95	100	300
		5.250	100	3,875	100			

Lampiran (Appendix) 3. Hasil analisis vegetasi tingkat tiang pada koridor C.A Pegunungan Tamrau Utara dan Suaka Margasatwa Jamursba-Medi Sorong (*The analysis results of vegetation pole level at the corridor Nature Reserve North Tamrau Mountain and Game Reserve Jamursba-Medi Sorong*)

No. (Number)	Nama latin (Latin name)	Kerapatan (Density)	O (Relative density)	Frekuensi (Frequency)	FR (Relative frequency)	Dominansi (Dominance)	DR (Relative dominance)	INP (Important Value Index)
			%		%		%	%
1	<i>Abroma angustifolia</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Blumeodendron concolor</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Chisocheton ceramikus</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Disoxylum molle</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<i>Drypetes glabosa</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Elaeocarpus sphaericus</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Garcinia dulcis</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<i>Gymnachantera paniculata</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<i>Haplolobus floribunda</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<i>Haplolobus lanceolatus</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<i>Knema</i> sp.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<i>Lithocarpus rufovillosus</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<i>Madhuca crasipes</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<i>Memecylon</i> sp.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<i>Myristica</i> sp.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<i>Parishia</i> sp.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<i>Pisonia umbellifera</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<i>Pterygota horsfieldia</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<i>Reinwardtiadendron</i> sp.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<i>Schizomeria catastega</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<i>Semecarpus papuana</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<i>Syzgium</i> sp.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<i>Urandra brasii</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah (Total)		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Lampiran (Appendix) 4. Hasil analisis vegetasi tingkat pohon pada Koridor C.A. Pegunungan Tamrau Utara dan Suaka Margasatwa Jamursba-Medi Sorong (The analysis results of vegetation tree level at the corridor Nature Reserve North Tamrau Mountain and Game Reserve Jamursba-Medi)

No.	Nama botani	Kerapatan	KR	FR	Dominansi	DR	INP
(Number)	(Botanical name)	(Density)	(Relative Frekuensi density) (Frequency)	(Relative frequency)	(Dominance)	(Relative dominance)	(Important Value Index)
			%	%		%	%
1	<i>Actinodaphne nitida</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,09	2,30
2	<i>Anisoptera costata</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,23	2,80
3	<i>Artocarpus communis</i>	5,0	1,25	0,50	2,74	0,06	4,21
4	<i>Blumeodendron concolor</i>	10,0	2,50	0,50	2,74	0,76	7,91
5	<i>Calophyllum postanum</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,04	2,13
6	<i>Cananga odorata</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,30	3,05
7	<i>Canarium asperum</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,03	2,09
8	<i>Canarium indica</i>	7,5	1,88	0,50	2,74	0,70	7,08
9	<i>Canarium decumanum</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	2,01	9,11
10	<i>Celtis latifolia</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,04	2,15
11	<i>Celtis philipinensi</i>	5,0	1,25	0,50	2,74	0,05	4,16
12	<i>Chisocheton ceramicus</i>	17,5	4,38	0,75	4,11	0,86	11,53
13	<i>Chrysophyllum sp.</i>	7,5	1,88	0,50	2,74	0,72	7,17
14	<i>Cloaxylon polot</i>	5,0	1,25	0,25	1,37	0,07	2,86
15	<i>Dendrocnide peltata</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,02	2,06
16	<i>Disoxylum acutangulum</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,11	2,39
17	<i>Disoxylum molle</i>	7,5	1,88	0,25	1,37	0,25	4,11
18	<i>Disoxylum octandrum</i>	10,0	2,50	0,75	4,11	1,02	10,22
19	<i>Dracontomelon doa</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,49	3,73
20	<i>Drypetes glabosa</i>	7,5	1,88	0,50	2,74	0,26	5,54
21	<i>Drypetes longifolia</i>	22,5	5,63	0,50	2,74	0,68	10,78
22	<i>Eugenia anomala</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,79	4,78
23	<i>Ficus coonora</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,03	2,09
24	<i>Garcinia dulcis</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,17	2,58
25	<i>Gnetum gnemon</i>	12,5	3,13	0,50	2,74	0,18	6,51
26	<i>Haplolobus lanceolatus</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,31	3,11
27	<i>Heritira ovigiera</i>	7,5	1,88	0,25	1,37	0,36	4,52
28	<i>Homalium foetidum</i>	5,0	1,25	0,25	1,37	0,26	3,55
29	<i>Intsia palembanica</i>	10,0	2,50	0,75	4,11	4,86	23,79
30	<i>Linociera macrophylla</i>	12,5	3,13	0,25	1,37	1,03	8,15
31	<i>Lithocarpus rufovillosus</i>	65,0	16,25	0,25	1,37	1,68	23,57
32	<i>Litsea sp.</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,02	2,08
33	<i>Litsea tuberculata</i>	7,5	1,88	0,50	2,74	0,54	6,52
34	<i>Madhuca crasipes</i>	10,0	2,50	0,25	1,37	0,33	5,05
35	<i>Memecylon sp.</i>	10,0	2,50	0,25	1,37	0,37	5,16
36	<i>Mesua ferea</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,18	2,62
37	<i>Paraltropis philipinensis</i>	5,0	1,25	0,25	1,37	0,24	3,48
38	<i>Parartocarpus venenosa</i>	7,5	1,88	0,50	2,74	0,37	5,92
39	<i>Parishia sp.</i>	12,5	3,13	0,25	1,37	1,00	8,03
40	<i>Pentaphalangium pachycarpum</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,02	2,06
41	<i>Pimelliodendron amboinensis</i>	17,5	4,38	0,75	4,11	0,64	10,75
42	<i>Pisonia umbellifera</i>	5,0	1,25	0,25	1,37	0,04	2,77
43	<i>Pometia pinnata</i>	27,5	6,88	0,75	4,11	2,20	18,78
44	<i>Pterygota horsfieldii</i>	5,0	1,25	0,50	2,74	0,31	5,10
45	<i>Reinwardtiadendron sp.</i>	5,0	1,25	0,25	1,37	0,38	3,95
46	<i>Ryparosa sp.</i>	5,0	1,25	0,25	1,37	0,21	3,35
47	<i>Semecarpus papuana</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,21	2,75
48	<i>Spentum andum</i>	5,0	1,25	0,25	1,37	1,14	6,64
49	<i>Spondias dulcis</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,03	2,09
50	<i>Urandra brasii</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,17	2,58
51	<i>Vatica papuana</i>	7,5	1,88	0,25	1,37	0,83	6,18
52	<i>Xanthostemon sp.</i>	2,5	0,63	0,25	1,37	0,59	4,09
Jumlah		400	100	18,25	100	28,28199	300,00