**POTENSI HABITAT DAN PENDUGAAN POPULASI ORANGUTAN
(*Pongo abelii* Lesson 1827) DI CAGAR ALAM DOLOK SIBUAL-BUALI,
SUMATERA UTARA (*Potency of Habitat and Population Estimation of Orangutans
(Pongo abelii) in Dolok Sibual-buali Nature Reserve, North Sumatra*)**

Oleh / By :

Wanda Kuswanda dan / and Sugiarti

ABSTRACT

*Orangutan is a threaten wild animal in its natural habitat. Habitat loss and fragmentation cruse of the threats. Dolok Sibual-buali Nature Reserve is one of conservation area as a natural habitat of orangutans in North Sumatra. This research was conducted to know habitat condition and estimated population to be used for a guidance on managing and conserving sumatra orangutan. Field observation were conducted in two research areas : West (Aek Nabara) and East (Sealaman) area. Vegetation analysis to know habitat potency was approached by using line transect method. About 10 sample plots with their size about 20 m x 20 m and 50 metre distance each were set. The result of vegetation analysis where then classified into food source and orangutans nest tree. Population estimation was done indirected based on the amount of nest found. The result showed that 53 species was found at west area and 39 species at east area on which 36 species were as orangutans food source. The dominant species are medang nangka (*Eleaocarpus obtusus*), hau dolok (*Eugenia* sp.), and hoteng (*Quercus maingayi*). Index of Similarity showed that there were dissimilarity between two research area. Mean of population density of orangutan were 0.791 animals/sq. km at west area and 0.271 animals/ sq.km at east area.*

Key words : Orangutans, habitat, population, Dolok Sibual-buali Nature Reserve

ABSTRAK

Orangutan termasuk satwaliar yang terancam punah pada habitat alaminya. Fragmentasi dan kerusakan habitat menjadi penyebab utama menurunnya populasi dan distribusi orangutan liar. Cagar Alam Dolok Sibual-buali adalah salah satu areal konservasi sebagai habitat alami orangutan di Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi habitat dan pendugaan populasi orangutan sebagai bahan acuan dalam pengelolaan cagar alam dan konservasi orangutan Sumatera. Pengamatan dilakukan pada dua areal penelitian, yaitu wilayah barat (Aek Nabara) dan wilayah timur (Sialaman). Analisis vegetasi untuk mengetahui potensi habitat menggunakan metode garis transek yang dibuat sebanyak 10 petak contoh berukuran 20 m x 20 m dengan jarak antar petak contoh 50 meter. Hasil analisis vegetasi tumbuhan yang ditemukan dikelompokkan dalam sumber pakan dan sebagai pohon sarang orangutan. Pendugaan populasi dilakukan secara tidak langsung berdasarkan penemuan sarang. Hasil penelitian di wilayah barat diperoleh sebanyak 53 jenis tumbuhan dan wilayah timur 39 jenis di mana 36 jenis diidentifikasi sebagai sumber pakan orangutan. Jenis tumbuhan yang mendominasi adalah medang nangka (*Eleaocarpus obtusus*), hau dolok (*Eugenia* sp.), dan hoteng (*Quercus maingayi*) tumbuhan. Berdasarkan Indeks Kesamaan Jaccard and Sorensen menunjukkan bahwa kondisi habitat antara kedua wilayah penelitian tidak sama. Nilai dugaan kepadatan populasi berdasarkan penemuan sarang di wilayah barat sebesar 0,791 ekor/km² dan wilayah timur sebesar 0,271 ekor/km².

Kata kunci : Orangutan, habitat, populasi, Cagar Alam Dolok Sibual-buali

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orangutan merupakan satu-satunya primata jenis kera besar Asia yang

penyebarannya hanya di Indonesia, yaitu terbatas di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Di Sumatera, sebagian besar orangutan tersebar di kawasan konservasi khususnya di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara,

sebagaimana laporan Balai Konservasi Sumberdaya Alam II Medan (1999), yang menyebutkan bahwa populasi orangutan diperkirakan masih terdapat di Cagar Alam Dolok Sibual-buali (CADS) dan Dolok Sipirok di Kabupaten Tapanuli Selatan. Informasi terakhir dari petugas CDAS masih teridentifikasi sedikitnya delapan individu orangutan ada di dalam dan sekitar kawasan tersebut.

Populasi orangutan dari tahun ke tahun semakin menurun akibat pembukaan lahan untuk transmigrasi, pemukiman dan perladangan berpindah maupun perburuan untuk dikonsumsi dan diperdagangkan. Musim kemarau yang panjang dan kebakaran hutan yang berulang terjadi di Indonesia menjadi penyebab percepatan kerusakan habitat alami yang menurunkan populasi orangutan. Oleh karena itu, dalam mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan orangutan secara *in-situ*, kegiatan penelitian habitat dan populasi orangutan menjadi sangat penting sebagai langkah awal dalam merumuskan teknik konservasi orangutan, khususnya di Sumatera Utara.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi habitat dan populasi orangutan berdasarkan penemuan jumlah sarang, sebagai bahan acuan dalam pengelolaan cagar alam dan konservasi orangutan Sumatera, khususnya di Cagar Alam Dolok Sibual-buali.

II. METODOLOGI

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kawasan CADS yang dijadikan lokasi penelitian ada pada dua wilayah yaitu bagian barat (Aek Nabara) dan bagian timur (Sealaman). Berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, pada kedua daerah tersebut masih sering terlihat beberapa individu orangutan.

Kawasan CADS secara administratif pemerintahan terletak di Desa Baringin, Marancar, dan Tapus yang termasuk pada Kecamatan Sipirok, Batang Toru dan Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan.

CADS ditetapkan sebagai kawasan konservasi pada tanggal 8 April 1982 sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 215/Kpts/Um/14/1982, dengan luas keseluruhan mencapai lebih kurang 5.000 ha (BKSDA II Medan, 1999). Kondisi cagar alam ini masih berupa hutan primer dan sebagai daerah tangkapan air bagi daerah sekitar kawasan CADS.

B. Pengumpulan Data

Analisis vegetasi untuk mengetahui potensi dan kualitas habitat orangutan dilakukan dengan menggunakan metode garis berpetak. Ukuran petak contoh untuk tingkat semai dan tumbuhan bawah 2 m x 2 m, tingkat pancang 5 m x 5 m, tingkat tiang 10 m x 10 m, dan tingkat pohon 20 m x 20 m. Pada setiap lokasi penelitian (wilayah bagian barat dan timur) dibuat sebanyak 10 petak contoh dengan jarak antar petak contoh 50 meter. Berdasarkan hasil analisis vegetasi kemudian diklasifikasikan tumbuhan yang termasuk sumber pakan dan berfungsi sebagai pohon sarang. Pada setiap jenis tumbuhan pakan akan dicatat bagian tumbuhan (daun, buah, pucuk daun, dan atau ranting) yang dimakan.

Pengumpulan data populasi dilakukan secara tidak langsung dengan menghitung jumlah sarang pada jalur pengamatan (*line transect method*). Pada setiap lokasi penelitian dibuat tiga jalur pengamatan dengan panjang masing-masing jalur sejauh 1.000 meter yang jarak antar jalur rata-rata 300 m. Lebar jalur penelitian ditentukan berdasarkan nilai rata-rata jarak tegak lurus jalur terhadap obyek penelitian (sarang).

C. Analisis Data

1. Vegetasi Habitat

Untuk mengetahui kerapatan dan komposisi jenis-jenis tumbuhan pada habitat orangutan dilihat dari besaran nilai INP (Indeks Nilai Penting). Nilai INP merupakan penjumlahan dari Kerapatan Relatif, Frekuensi Relatif, dan Dominansi Relatif untuk tingkat tiang dan pohon dan penjumlahan Kerapatan Relatif dan Frekuensi Relatif untuk tingkat semai, tumbuhan bawah, dan pancang.

Keragaman jenis dan keragaman jenis maksimal dapat diketahui dengan mengguna-

kan indeks keragaman jenis Shannon dan Weaver (1949) dalam Odum (1971). Sedangkan dominansi jenis dapat diketahui dari indeks dominansi jenis. Persamaan-persamaan tersebut adalah sebagai berikut :

$$H = - \sum (n_i/N) \log (n_i/N)$$

$$H_{\max} = - \sum (n_i/N) \ln (n_i/N)$$

$$C = \sum (n_i/N)$$

Keterangan:

H = derajat keragaman jenis

H max = derajat keragaman maksimal

C = derajat dominansi jenis

n_i = nilai penting ke-i

N = total nilai penting

Untuk mengetahui kemiripan antara wilayah barat dan timur digunakan Indeks Kemiripan Komunitas Jaccard dan Sorensen dalam Sutisna dan Soeyatman (1984) sebagai berikut :

$$IS \text{ Jaccard} = \frac{c}{a + b + c}$$

$$IS \text{ Sorensen} = \frac{c}{\frac{1}{2} (A+B)}$$

Keterangan :

IS = indeks kemiripan komunitas

a = jumlah jenis yang hanya terdapat pada wilayah barat

b = jumlah jenis yang hanya terdapat pada wilayah timur

A = jumlah seluruh jenis yang terdapat pada wilayah barat

B = jumlah seluruh jenis yang terdapat pada wilayah timur

Rata-rata kedua indeks tersebut diperoleh melalui perhitungan :

$$IS \text{ rata-rata} = \frac{1}{2} (IS \text{ Jaccard} + IS \text{ (Sorensen)})$$

2. Populasi

Persamaan-persamaan yang digunakan untuk menduga kepadatan populasi berdasarkan penemuan jumlah sarang adalah sebagai berikut :

a. Lebar rata-rata jalur pengamatan ke - j (dj)

$$dj = \sum di / \sum ki$$

Keterangan :

di = jarak tegak lurus posisi sarang dengan garis transek ke-i (meter)

ki = kontak sarang ke-i

b. Dugaan kepadatan orangutan jalur ke-j (Dj)

$$Dj = N / (L \times 2 \times dj \times p \times r \times t)$$

Keterangan :

N = jumlah sarang pada jalur ke-j (buah)

L = panjang jalur ke-j (meter)

P = proporsi pembuatan sarang dalam suatu populasi orangutan

t = lamanya waktu sarang orangutan masih terlihat nyata (194,5 hari)

r = rata-rata jumlah sarang yang dibuat per hari (1,7 sarang/individu/hari)

c. Dugaan kepadatan rata-rata setiap lokasi ke -k (Dk)

$$Dk = \sum Dj / nj$$

Keterangan :

nj = jumlah jalur pada lokasi ke-k (jalur)

d. Dugaan kepadatan rata-rata orangutan di CADS (D)

$$D = \sum Dj / nj$$

Keterangan :

Nj = jumlah lokasi penelitian di CADS

e. Dugaan populasi seluruh CADS

$$P = D \times A$$

Keterangan :

A = luas total CADS (ha)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Komposisi, Keanekaragaman, dan Dominansi Jenis Vegetasi

Keanekaragaman jenis dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kemampuan suatu komunitas, baik tumbuhan maupun satwa pada suatu habitat orangutan dalam menyeimbangkan komponennya dari berbagai gangguan yang timbul. Hasil analisis data terhadap komposisi keanekaragaman dan dominansi jenis tumbuhan pada setiap tipe habitat orangutan dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Berdasarkan hasil analisis vegetasi pada wilayah barat dalam 10 plot contoh diperoleh sebanyak 53 jenis tumbuhan yang terdiri dari 36 jenis tumbuhan pada tingkat semai dan tumbuhan bawah, 29 jenis tingkat pancang, 32 jenis tingkat tiang, dan 25 jenis tingkat pohon (Lampiran 1). Jenis-jenis yang mendominasi pada tingkat semai, pancang, tiang, dan pohon berturut-turut adalah hau dolok merah (*Eugenia* sp.), medangangka (*E. obtusus*), hau dolok A (*Eugenia* sp.), dan

Tabel (Table) 1. Nilai Penting Relatif jenis-jenis dominan pada kedua lokasi pengamatan (*Relative Important Value/RIV of dominant species on the research area*)

No	Tingkatan vegetasi (<i>Vegetation level</i>)	Wilayah barat (<i>West area</i>)	Wilayah timur (<i>East area</i>)
		Jenis dominan / <i>Dominant species (%)</i>	
1	Semai/tumbuhan bawah (<i>seedling/under stories</i>)	<i>Eugenia</i> sp. (14,955) <i>Litsea</i> sp. (11,012) <i>Quercus maingayi</i> (10,012)	Sibarebe (26,038) <i>Ixonanthes petiolaris</i> (17,997) <i>Eugenia cupra</i> (13,787)
2	Pancang (<i>sapling</i>)	<i>Elaocarpus obtusus</i> (14,889) <i>Quercus</i> sp. (14,889) <i>Eugenia</i> sp. (13,104)	<i>Alstonia macrophylla</i> (20,971) <i>Q. maingayi</i> (17,476) <i>Polynema integrifolia</i> (13,980)
3	Tiang (<i>pole</i>)	<i>Eugenia</i> sp. (27,341) <i>Q. maingayi</i> (18,949) <i>Eugenia cupra</i> (18,851)	<i>Eugenia cupra</i> (30,983) Sibarebe (21,878) <i>Eugenia</i> sp. (21,622)
4	Pohon (<i>tree</i>)	<i>Q. maingayi</i> (33,707) <i>Quercus</i> sp. (23,175) <i>Q. pseudomulucca</i> (17,309)	<i>Q. maingayi</i> (37,131) <i>Eugenia</i> sp. (25,983) <i>Ficus racemosa</i> (20,049)

Tabel (Table) 2. Indek keragaman dan dominansi jenis pada kedua lokasi pengamatan (*Diversity index and species dominance on the research area*)

Tingkatan vegetasi (<i>Vegetation level</i>)	Wilayah barat (<i>West area</i>)			Wilayah timur (<i>East area</i>)		
	H	H maks	C	H	H maks	C
Semai / Tumbuhan bawah (<i>seedling / under stories</i>)	0,682	3,453	0,036	0,784	3,067	0,056
Pancang (<i>sapling</i>)	0,727	3,235	0,044	0,805	2,941	0,059
Tiang (<i>pole</i>)	0,704	3,358	0,040	0,799	2,937	0,058
Pohon (<i>tree</i>)	0,770	3,080	0,052	0,827	2,850	0,063

hoteng (*Q. maingayi*). Keanekaragaman jenis vegetasi (H) yang tertinggi di wilayah barat berdasarkan hasil perhitungan indeks Shannon-Weiner pada tingkat pohon sebesar 0,770, tingkat pancang sebesar 0,727, tingkat tiang sebesar 0,704 dan terendah pada tingkat semai sebesar 0,682. Dari hasil indeks keragaman maksimal (H') wilayah barat berdasarkan batasan Samingan (1997) ternyata pada berbagai tingkatan vegetasi mempunyai nilai H maks pada selang $2,5 \leq H \text{ maks} \leq 3,5$ sehingga termasuk dalam golongan kondisi habitat tidak terkendala.

Hasil analisis vegetasi di wilayah timur secara keseluruhan ditemukan sebanyak 39 jenis tumbuhan, yang terdiri dari 26 jenis tingkat semai dan tumbuhan bawah, 22 jenis tingkat pancang, 21 jenis tingkat tiang, dan 19 jenis tingkat pohon. Jenis-jenis yang mendominasi pada tingkat semai, tiang, pancang, dan pohon berturut-turut adalah sibarebe, randuk hambing (*A. macrophylla*), hau dolok jambu (*Choriophyllum malayanum*), dan hoteng (*Q. maingayi*).

Keanekaragaman jenis (H) vegetasi di wilayah timur berdasarkan hasil perhitungan indeks Shannon-Weiner diperoleh pada tingkat pohon sebesar 0,827, tingkat pancang sebesar 0,805, kemudian pada tingkat tiang sebesar 0,799, dan terendah pada tingkat semai sebesar 0,784. Dari hasil indeks keragaman maksimal (H'), wilayah timur juga termasuk dalam golongan habitat tidak terkendala walaupun nilainya lebih tinggi dibandingkan wilayah barat.

B. Kemiripan Komunitas

Kemiripan komunitas antara wilayah barat dan timur disajikan pada Tabel 3.

Berdasarkan klasifikasi tingkat kemiripan yang disusun oleh Sutisna dan Soeyatman (1984) maka kondisi vegetasi di wilayah barat dan timur berbeda nyata untuk setiap tingkat pertumbuhan vegetasi. Hal ini terlihat dari persentase kemiripan di bawah 50 %. Perbedaan ini kemungkinan karena wilayah barat merupakan kawasan hutan hujan tropika yang masih baik dengan ciri tidak ada

Tabel (Table) 3. Indeks kemiripan komunitas antara wilayah barat dan timur (*Indeks of community similarity between west and east area*)

Tingkat (Stage)	Indeks Kemiripan Sorensen (Sorensen Indeks of similarity)	Indeks Kemiripan Jaccard (Jaccard Indeks of similarity)	Rata-rata (Mean)
Semai (Seedling)	38,71%	24,00%	31,35%
Pancang (Sapling)	39,21%	24,39%	31,80%
Tiang (Pole)	33,33%	20,00%	26,67%
Pohon (Tree)	50,00%	33,33%	41,67%

pendominasian oleh suatu jenis tumbuhan di mana jenis tumbuhan yang paling mendominasi di wilayah barat mempunyai nilai INP rata-rata 30 % sedangkan wilayah timur ada yang mempunyai nilai INP 37 % yaitu hoteng (*Q. maingayi*) untuk tingkat pohon. Selain itu adanya stratifikasi tajuk dengan strata-strata yang lebih rendah membentuk kanopi tertutup serta banyaknya semai yang menutupi tanah.

Menurut Bruening (1996) dalam Meijaard *et. al.* (2001) kekayaan dan komposisi jenis pada suatu kawasan sangat dipengaruhi oleh lokasi tersebut yang berkaitan dengan kondisi tanah, iklim, dan atmosfer wilayah tersebut. Kondisi tanah akan mempengaruhi kedalaman perakaran, kelembaban, struktur hara, dan kualitas humus yang akan mendukung pertumbuhan beragam jenis tumbuhan.

C. Jenis-Jenis Tumbuhan Pakan

Pada lokasi penelitian sementara ini baru teridentifikasi sebanyak 36 jenis tumbuhan pakan, yang meliputi 33 jenis di wilayah barat dan 19 jenis di wilayah bagian timur. Jenis tumbuhan pakan orangutan ditemukan pada setiap tingkat pertumbuhan pohon terutama pada tingkat tiang dan pohon, tempat di mana orangutan mencari makan. Pada wilayah barat jenis tumbuhan pakan yang banyak dijumpai adalah hau dolok A (*Eugenia* sp.), gala-gala (*F. racemosa*), dan medang angka (*E. obtusus*). Sedangkan pada wilayah timur jenis tumbuhan pakan yang banyak ditemukan adalah hoteng (*Q. maingayi*).

Bagian tumbuhan yang dimakan oleh orangutan berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan penemuan bekas makan di lapangan yang teramati selama penelitian adalah bunga, pucuk daun atau

daun, buah, kulit, dan umbut. Namun demikian menurut Meijaard *et. al.* (2001), orangutan tercatat pula sebagai pemakan telur burung, vertebrata kecil seperti tupai, tokek, dan kukan serta menyukai madu. Orangutan merupakan tipe pengumpul atau pencari pakan yang oportunistik (memakan apa saja yang dapat diperolehnya). Dari hasil penelitian persentase tertinggi bagian tumbuhan yang dimakan oleh orangutan adalah buah, kemudian daun (pucuk daun), umbut dan kombinasinya. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sebagian besar pakan pokok orangutan adalah buah (Rijksen, 1978; Sugardjito, 1986; dan Sinaga, 1992). Menurut Sinaga (1992), jenis tumbuhan pakan yang dimakan buahnya saja oleh orangutan di Bohorok sebanyak 55,6 %. Meijaard *et. al.* (2001), menuliskan bahwa penyebaran suatu komunitas orangutan sangat dipengaruhi oleh keberadaan pohon pakan yang menghasilkan buah. Buah-buahan yang paling disukai oleh orangutan adalah berdaging lembek, berbiji termasuk berbiji tunggal dan buah beri, seperti buah-buahan jenis *Ficus* sp.

D. Jenis Pohon Bersarang

Menurut Rijksen (1978), orangutan merupakan satwa yang membuat sarang setiap harinya, baik untuk sarang istirahat/tidur siang maupun tidur malam. Beberapa jenis pohon yang sering digunakan sebagai pohon sarang yang teridentifikasi selama penelitian adalah medang angka (*E. obtusus*), beringin (*F. benjamina*), hoteng (*Q. maingayi*), dan durian hutan (*Durio zibethinus*). Kondisi pohon sarang secara umum memiliki penutupan tajuk yang relatif tidak terlalu rapat (sedang) dengan luasan

penutupan tajuk berkisar antara 5-30 m². Ukuran cabang tidak berpengaruh terhadap pemilihan lokasi sarang, yang terpenting cabang pohon tersebut mampu menopang berat tubuh orangutan. Tinggi sarang orangutan bervariasi dan tergantung pada tinggi tajuk pohon.

Ketinggian sarang orangutan yang ditemukan berkisar antara 6-25 m meskipun paling banyak ditemukan pada ketinggian 15-20 m dari permukaan tanah. Hasil ini agak berbeda dengan yang dikemukakan oleh Sinaga (1992) yang menyatakan bahwa kebanyakan orangutan membuat sarang pada posisi antara 20-35 m di atas tanah. Perbedaan ini dimungkinkan karena jenis dan ketinggian tumbuhan yang membentuk habitat orangutan di CADS berbeda dengan yang ada di Bohorok.

E. Populasi Orangutan

Pendugaan kepadatan orangutan dalam suatu habitat atau kawasan hutan masih cukup sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan kesulitan dalam mengestimasi jumlah individu per satuan luas contoh yang kemudian mengekstrapolasinya untuk wilayah yang lebih luas serta kesulitan mengestimasi luas habitat dan skala diferensiasi habitat yang dibutuhkan oleh sebuah komunitas orangutan. Menurut Gandilas (1978), kepadatan populasi orangutan berbeda-beda antara suatu daerah yang satu dengan yang lainnya, hal ini bergantung pada ketersediaan makanannya dan atau besar kecilnya gangguan manusia terhadap kehidupan orangutan. Oleh karena itu, menurut Meijaard *et. al.* (2001) dalam menduga populasi orangutan di suatu kawasan tertentu diperlukan teknik-teknik alternatif sehingga memperoleh angka dugaan kepadatan yang lebih akurat sesuai dengan tipe habitatnya.

Untuk mengetahui nilai kepadatan dan ukuran orangutan pada penelitian ini dilakukan secara tidak langsung (melalui penemuan jumlah sarang) karena pendugaan jumlah populasi orangutan secara langsung dengan waktu penelitian yang terbatas cukup sulit dilakukan. Menurut Meijaard *et.al.* (2001), penelitian kepadatan orangutan secara langsung harus dilakukan dalam waktu yang panjang dan dilaksanakan pada

populasi orangutan yang sudah diketahui lokasi dan penyebarannya. Selain itu menurut van Schaik, *et.al.* (1995), orangutan liar adalah satwa yang sangat sensitif dan cenderung bersembunyi bila mencium dan melihat kehadiran manusia. Keadaan ini menyebabkan kesulitan untuk menduga ukuran populasi orangutan liar secara langsung.

Meskipun keberadaan orangutan liar sulit dideteksi dan ditemukan secara langsung, namun kehadirannya mudah dipastikan dengan mencari sarang-sarang khas yang dibangun setiap hari oleh orangutan. Beberapa sarang tetap dapat dilihat dalam beberapa lama sehingga bisa menjadi dasar dalam menduga jumlah orangutan yang ada di kawasan tertentu. Berbagai metode untuk menduga kepadatan berdasarkan penemuan sarang telah banyak dikembangkan sejak tahun 60-an, seperti Rijksen (1978) dan van Schaik *et.al.* (1995).

Pada penelitian ini persamaan yang digunakan untuk menduga kepadatan populasi orangutan di CADS adalah menurut van Schaik *et.al.* (1995) yang telah memasukkan berbagai parameter yang diperkirakan mempengaruhi dalam proses analisis pendugaan populasi orangutan berdasarkan penemuan jumlah sarang. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan nilai dugaan dengan bias yang kecil atau lebih teliti. Namun demikian, beberapa parameter tersebut tidak bisa diamati dalam penelitian ini karena memerlukan waktu penelitian yang lama dan harus dilakukan secara kontinyu. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Beberapa parameter tersebut adalah :

1. Rata-rata jumlah sarang yang dibuat per hari (r)

Nilai r merupakan rata-rata jumlah sarang yang dibuat oleh orangutan pada suatu populasi di suatu kawasan tertentu untuk setiap hari per individu. Menurut hasil penelitian Rijksen (1978) di Ketambe diperoleh nilai r sebesar 1,8, sedangkan menurut Setia (1994) dalam van Schaik *et.al.* (1995) nilai r di Ketambe rata-rata sebesar 1,7 dan di Suaq Belimbing Taman

Nasional Gunung Leuser (TNGL) sebesar 1,6. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diambil nilai rata-rata r untuk menduga populasi orangutan di CADS sebesar 1,7 sarang per hari per individu.

2. Proporsi pembuat sarang dalam suatu populasi orangutan (p)

Untuk mengetahui nilai p digunakan hasil penelitian Setia (1994) dalam van Schaik *et.al.* (1995) yang menyatakan nilai p sebesar 90 % atau 0,9. Hasil penelitian di Ketambe dan di Suaq Belimbing ditemukan sebesar 90 % dari populasi orangutan membuat sarang dan sisanya 10 % adalah individu bayi yang masih dalam asuhan induknya. van Schaik *et.al.* (1995) menambahkan bahwa pada umumnya orangutan membuat sarang setiap hari kecuali individu bayi yang masih dalam gendongan induknya.

3. Umur sarang (t)

Nilai t adalah lamanya waktu sarang orangutan masih terlihat secara jelas (*visibility*). Menurut van Schaik *et.al.* (1995), faktor yang mempengaruhi lamanya umur sarang adalah tipe hutan dan struktur hutan, jenis kayu, suhu dan kelembaban. Berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa umur sarang berbeda-beda berdasarkan ketinggian tempat. Semakin tinggi suatu tempat dari permukaan laut maka

sarang akan terlihat lebih lama atau nilai t akan lebih besar. van Schaik *et.al.* (1995) menyatakan bahwa nilai t pada tipe hutan sub montana dengan ketinggian 1.100-1.200 m dari permukaan laut adalah 170 hari, sedangkan menurut Lubis *et.al.* (2001) sebesar 219 hari. Adapun nilai t yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai t rata-rata dari hasil kedua penelitian tersebut yaitu sebesar 194,5 hari.

Berdasarkan hasil penemuan jumlah sarang pada setiap lokasi penelitian (bagian barat dan timur) dengan menggunakan persamaan menurut van Schaik *et.al.* (1995), diperoleh nilai dugaan kepadatan populasi orangutan di CADS seperti disajikan pada Tabel 4.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa rata-rata kepadatan populasi orangutan di bagian barat sebesar 0,791 ekor/km² dan di bagian timur sebesar 0,271 ekor/km². Dengan demikian rata-rata total dugaan kepadatan orangutan di CADS sebesar 0,531 ekor/km². Hasil penelitian ini membuktikan bahwa bagian barat wilayah CADS memiliki kepadatan populasi yang lebih tinggi. Perbedaan kepadatan populasi yang mencolok pada dua wilayah tersebut dapat disebabkan karena adanya perbedaan jumlah dan komposisi tumbuhan pakan dan

Tabel (Table) 4. Hasil analisis nilai dugaan kepadatan dan populasi orangutan di CADS (*The analysis result of estimation of density value and orangutans population at Dolok Sibualbuali Nature Reserve*)

Lokasi (Location)	No. jalur (Strip no.)	Jml sarang per jalur (Number of nest/ strip) (sarang/nests)	Rata-rata lebar jalur penelitian (Mean of wide strip) (km)	Nilai dugaan kepadatan (Value of density estimates) (ekor/km ²)	Dugaan populasi (Estimates of population) (ekor/individu)	
					Habitat*	Total
Wilayah barat (West area)	1	9	0,01922	0,788	11,82	39,4
	2	7	0,02057	0,572	8,58	28,6
	3	13	0,02154	1,014	15,21	50,7
Rata-rata (Mean)		9,67	0,02044	0,791	11,87	39,5
Wilayah timur (East Area)	1	2	0,02050	0,164	2,46	8,2
	2	5	0,02180	0,385	5,78	19,3
	3	3	0,01900	0,265	3,98	13,2
Rata-rata (Mean)		3,3	0,02040	0,271	4,13	13,6
Total dugaan rata-rata (Total of mean estimates)		6,5	0,02042	0,531	7,96	26,5

*) Menurut Meijaard *et.al.* (2001), habitat orangutan di CADS hanya sekitar 36 % dari luas seluruh kawasan atau sekitar 15 km²

kehadiran manusia yang memasuki kawasan tersebut. Selain itu, pada wilayah timur terdapat lokasi pemanfaatan sumber panas bumi (*geothermal*) yang lebih memungkinkan banyak orang melewati dan memasuki habitat orangutan.

Berdasarkan nilai kepadatan tersebut diperoleh dugaan ukuran populasi dengan cara mengalikannya terhadap luas kawasan. Luas kawasan CADS secara keseluruhan adalah 50 km², sehingga diperoleh nilai dugaan rata-rata populasi orangutan sebesar 27 ekor. Akan tetapi, menurut Meijaard *et.al.* (2001), persentase kawasan CADS yang digunakan sebagai habitat orangutan hanya sekitar 36 % atau 15 km² sehingga diperoleh nilai dugaan populasi sebesar delapan ekor. Dari kedua nilai tersebut, diperoleh dugaan ukuran populasi orangutan di CADS dalam bentuk dugaan selang, yaitu antara 8-27 ekor. Adapun Meijaard *et.al.* (2001) memperkirakan populasi orangutan di CADS sebesar 21 ekor.

Hasil analisis nilai dugaan kepadatan orangutan di CADS ini cenderung lebih kecil bila dibandingkan dengan hasil penelitian di kawasan lain pada tipe hutan yang sama (zona sub montana). Menurut van Schaik *et.al.* (1995), kepadatan orangutan di Ketambe dan Mamas TNGL pada zona sub montana diduga sebesar 1,2 ekor/km² dan 0,7 ekor/km². Namun demikian, rata-rata kepadatan orangutan pada ketinggian di atas 1.000 m dpl di Pulau Sumatera diperkirakan sebesar 0,5 ekor/km². Sedikitnya populasi orangutan di CADS bila dibandingkan dengan di TNGL dimungkinkan karena luas habitat dan daerah jelajah orangutan di CADS lebih sempit sehingga kurang mendukung populasi orangutan. Menurut Meijaard *et.al.* (2001), kualitas hutan di daerah Sipirok telah berkurang sekitar 60 % yang disebabkan karena alih fungsi hutan menjadi areal pertanian, perkebunan, dan pemukiman penduduk yang terus bertambah.

Hasil penelitian lain seperti Sugardjito (1991) dalam Sinaga (1992) menyatakan bahwa kepadatan populasi orangutan di Sumatera Utara menurun secara bertahap dengan bertambahnya ketinggian tempat dari permukaan laut (*altitude*). Pada daerah

dataran rendah diperkirakan kurang lebih 5 ekor/km² dan menurun pada daerah pegunungan menjadi 2 ekor/km². Kemudian menurun lagi untuk ketinggian 1.000-1.500 m dpl menjadi 0,5 ekor/km² dan di atas 1.500 m dpl tidak terdapat orangutan. Ketersediaan jenis makanan utama yang termasuk relatif rendah dan bervariasi pada ketinggian tempat dapat mempengaruhi penyebaran dan daya reproduksi orangutan

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hasil analisis vegetasi pada wilayah barat CADS tercatat sebanyak 53 jenis tumbuhan. Pada tingkat semai tercatat sebanyak 36 jenis, tingkat pancang 29 jenis, tingkat tiang 32 jenis, dan tingkat pohon 25 jenis. Di wilayah timur CADS tercatat sebanyak 39 jenis tumbuhan. Pada tingkat semai 26 jenis, tingkat pancang 22 jenis, tingkat tiang 21 jenis, dan 19 jenis tingkat pohon.
2. Dari hasil indeks keragaman maksimal, wilayah barat dan timur dalam kondisi tidak terkendala berdasarkan batasan Samangan (1997) yang membagi nilai H maks pada selang $2,5 \leq H \text{ maks} \leq 3,5$ ke dalam golongan kondisi habitat tidak berkendala dan nilai $1,5 \leq H \text{ maks} \leq 2,0$ dalam golongan habitat berkendala.
3. Dari indeks kemiripan Jaccard dan Sorensen wilayah barat dan timur kondisi komunitasnya tidak sama berdasarkan klasifikasi tingkat kemiripan yang disusun oleh Sutisna dan Soeyatman (1984) yang menyatakan bahwa nilai IS_n yang ada pada kisaran nilai IS_n 50-70 % menunjukkan kondisi kedua komunitas tidak sama.
4. Jenis tumbuhan pakan yang ditemukan di wilayah barat sebanyak 33 jenis dan wilayah timur 19 jenis. Bagian tumbuhan yang dimakan adalah bunga, pucuk daun atau daun, buah, kulit, dan umbut. Jenis pohon yang biasanya digunakan sebagai pohon sarang antara lain medang nangka (*E. obtusus*), beringin (*F. benjamina*), hoteng (*Q. maingayi*), dan durian hutan (*D. zibethinus*).

5. Berdasarkan penemuan sarang diperoleh nilai dugaan kepadatan populasi orangutan di wilayah barat sebesar 0,791 ekor/km² dan wilayah timur sebesar 0,271 ekor/km².

B. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian tentang kondisi habitat serta pendugaan kepadatan populasi pada wilayah utara dan selatan.
2. Diperlukan penelitian lanjutan tentang karakteristik pohon sarang dan potensi tumbuhan pakan orangutan pada wilayah barat yang memiliki kepadatan populasi yang cukup tinggi dibanding wilayah yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Konservasi Sumber Daya Alam II Medan. 1999. Informasi kawasan konservasi Propinsi Sumatera. Departemen Kehutanan. Medan.
- Gandilas, B. M. F. 1978. Orangutan adaptation at Tanjung Putting Reserve, Central Borneo. PhD. Thesis. Universitas of California. Los Angeles.
- Lubis, A. H., S. A. Wich, E. H. M. Sterck, and R. Buij. 2001. Population estimates and seasonal movement in sumatran orangutan (*Pongo pygmaeus abelii*). Proseding Seminar Primatologi Indonesia 2000. Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Meijaard, E., H. D. Rijksen, dan S. N. Kartikasari. 2001. Diambang kepunahan ! : Kondisi orangutan liar di awal abad ke-21. The Gibbon Foundation Indonesia. Jakarta.
- Odum, E.F. 1971. Fundamental of ecology. W.H. Freeman and Co. San Francisco.
- Rijksen, H. D. 1978. A field study on sumatran orangutans (*Pongo pygmaeus abelii* Lesson, 1872) : Ecology, behavior and conservation. H. Veenman & Zonen, Wageningen.
- Samingan, T. 1997. Kondisi ideal aspek vegetasi suatu kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN) di hutan produksi. Laboratorium Ekologi Fakultas MIPA-IPB. Bogor.
- Sinaga, T. 1992. Studi habitat dan perilaku orangutan (*Pongo pygmaeus abelii*) di Bohorok Taman Nasional Gunung Leuser. Thesis Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Tidak dipublikasikan
- Sugardjito, J. 1986. Ecological consirainson the behavior of sumateran orangutan in the Gunung Leuser National Park, Indonesia. Thesis Utrecht.
- Sutisna, U. dan Soeyatman. 1984. Komposisi jenis pohon hutan bekas tebangan di Malili Sulawesi Selatan. Lembaga Penelitian Hutan. Laporan No. 430. Bogor.
- van Schaik, C. P., A. Priatna, and D. Priatna. 1995. Population estimates and habitat preferences of orangutans based on line transects of nest. Plenum Press. New York and London.

Lampiran (Appendix) 1. Jenis-jenis vegetasi di bagian barat Cagar Alam Dolok Sibual-buali (*The vegetations species at west area Dolok Sibual-buali Nature Reserve*)

No	Nama daerah (Local Name)	Nama ilmiah (Science Name)	Famili (Family)
1	Andurhio	Unidentified	-
2	Aren	<i>Arenga pinnata</i>	Palmae
3	Asam King	<i>Dracontomelon dao</i>	Anacardiaceae
4	Attansa	<i>Dehaasia</i> sp.	Lauraceae
5	Basa-basa	Unidentified	-
6	Bayur	<i>Pterospermum diversifolium</i>	Sterculiaceae
7	Beringin	<i>Ficus benjamina</i>	Moraceae
8	Cempedak	<i>Artocarpus integer</i>	Moraceae
9	Dara-dara	<i>Gynacanthra bancana</i>	Myristicaceae
10	Dongdong	<i>Ficus deltoidea</i>	Moraceae
11	Dori dori	<i>Cratogeomys arborescens</i>	Hypericaceae
12	Durian hutan	<i>Durio zibethinus</i>	Bombacaceae
13	Gala-gala	<i>Ficus racemosa</i>	Moraceae
14	Gumbot	<i>Ficus toxicaria</i>	Moraceae
15	Hanyahap	Unidentified	-
16	Hatopul	<i>Artocarpus rigidus</i>	Moraceae
17	Haudolok A	<i>Eugenia</i> sp.	Myrtaceae
18	Haudolok B	<i>Eugenia</i> sp.	Myrtaceae
19	Haudolok jambu	<i>Eugenia cuprea</i>	Myrtaceae
20	Haudolok merah	<i>Eugenia</i> sp.	Myrtaceae
21	Haudolok putih	<i>Eugenia</i> sp.	Myrtaceae
22	Hole babi	<i>Dacryodes</i> sp.	Burseraceae
23	Horsik	<i>Ilex pleiobrachiata</i>	Aquifoliaceae
24	Hoteng	<i>Quercus maingayi</i>	Fagaceae
25	Hoteng B	<i>Quercus</i> sp.	Fagaceae
26	Hoteng Bunga	<i>Quercus pseudomolucca</i>	Fagaceae
27	Kandis	<i>Garcinia parvifolia</i>	Guttiferae
28	Kopi hutan	Unidentified	-
29	Lajo-lajo	<i>Panicum repens</i>	Gramineae
30	Langsat hutan	<i>Lansium domesticum</i>	Meliaceae
31	Losa	<i>Cinnamomum porrectum</i>	Lauraceae
32	Medang hunik	<i>Michelia koordersiana</i>	Magnoliaceae
33	Medang kulim	<i>Litsea</i> sp.	Lauraceae
34	Medang pokat	<i>Litsea</i> sp.	Lauraceae
35	Medang nangka	<i>Elaeocarpus obtusus</i>	Elacocarpaceae
36	Paga-paga	<i>Ixonanthes petiolaris</i>	Linaceae
37	Pakis hutan	Unidentified	-
38	Pandan Hutan	<i>Platea latifolia</i>	Icacinaceae
39	Pinang hutan	<i>Pentace triptera Mast</i>	Tiliaceae
40	Rambutan hutan	<i>Arytera littoralis</i>	Sapindaceae
41	Rapas para	<i>Artocarpus dadah</i>	Moraceae
42	Risi-risi	Unidentified	-
43	Rotan	<i>Calamus manan</i>	Arecaceae
44	Rube	<i>Meliosma sarawakensis</i>	Sabiaceae
45	Sapo-sapo	Unidentified	-
46	Sibarebe	Unidentified	-
47	Simarbosi bosi	Unidentified	-
48	Simartolu	<i>Schima wallichii</i>	Theaceae
49	Sitarak	Unidentified	-
50	Songgak	<i>Aquilaria malaccensis</i>	Thymelaeaceae
51	Tembiski	<i>Fagraea fragrans</i>	Loganiaceae
52	Tepus	<i>Ammomum pseudopoetens</i>	Zingiberaceae
53	Teurep	<i>Artocarpus elastica</i>	Moraceae

Lampiran (Appendix) 2. Jenis-jenis vegetasi di bagian timur Cagar Alam Dolok Sibual-buali (*The vegetations species at east area Dolok Sibual-buali Nature Reserve*)

No	Nama daerah (Local name)	Nama ilmiah (Science name)	Famili (Family)
1	Asam king	<i>Dracontomelon dao</i>	Anacardiaceae
2	Bayur	<i>Pterospermum javanicum</i>	Sterculiaceae
3	Beringin	<i>Ficus benjamina</i>	Moraceae
4	Burangir Harangan	Unidentified	-
5	Dara dara	<i>Gymnacranthera bancana</i>	Myristicaceae
6	Gala gala	<i>Ficus racemosa</i>	Moraceae
7	Handolok	<i>Eugenia</i> sp.	Myrtaceae
8	Harias	Unidentified	-
9	Haudolok A	<i>Eugenia</i> sp.	Myrtaceae
10	Haudolok B	<i>Eugenia</i> sp.	Myrtaceae
11	Haudolok jambu	<i>Cheilosa malayana</i>	Euphorbiaceae
12	Haudolok merah	<i>Eugenia</i> sp.	Myrtaceae
13	Haudolok putih	<i>Eugenia</i> sp.	Myrtaceae
14	Hole babi	<i>Dacryodes</i> sp.	Burseraceae
15	Horsik	<i>Ilex pleiobrachiata</i>	Aquifoliaceae
16	Hoteng	<i>Quercus maingayi</i>	Fagaceae
17	Hoteng B	<i>Quercus</i> sp.	Fagaceae
18	Hoteng bunga	<i>Quercus</i> sp.	Fagaceae
19	Jungjungbuih	<i>Litsea</i> sp.	Lauraceae
20	Kapol	<i>Planchonella maingayi</i>	Sapotaceae
21	Kayu bosi	Unidentified	-
22	Kopi hutan	<i>Polynema integrifolia</i>	Saxifragaceae
23	Kopi-kopi	<i>Chaetocarpus castanocarpus</i>	Euphorbiaceae
24	Medang kulim	<i>Litsea</i> sp.	Lauraceae
25	Medang landit	<i>Litsea</i> sp.	Lauraceae
26	Medang nangka	<i>Elaeocarpus obtusus</i>	Elaeocarpaceae
27	Medang pokat	<i>Litsea</i> sp.	Lauraceae
28	Poga harangan	<i>Ixonanthes petiolaris</i>	Linnaceae
29	Rambutan hutan	<i>Arytera littoralis</i>	Sapindaceae
30	Randuk hambing	<i>Alstonia macrophylla</i>	Apocynaceae
31	Rengas	<i>Gluta reinghas</i>	Apocynaceae
32	Rotan	<i>Calamus manan</i>	Arecaceae
33	Sarumarnaek	<i>Vernonia arborea</i>	Compositae
34	Sibarebe	Unidentified	-
35	Simaragungagung	<i>Beilschmiedia</i> sp.	Lauraceae
36	Sirih hutan	<i>Piper sarmentosum</i>	Piperaceae
38	Suhut-suhut	Unidentified	-
39	Tembiski	<i>Fagraea fragrans</i>	Loganiaceae

Lampiran (Appendix) 3. Jenis-jenis tumbuhan pakan orangutan di Cagar Alam Dolok Sibual-buali (The food vegetation for orangutans at Dolok Sibual-buali Nature Reserve)

No	Nama daerah (Local name)	Nama ilmiah (Science name)	Famili (Family)	Bagian yang dimakan (Part as food)
1	Andur hio	Unidentified	-	D
2	Aren	<i>Arenga pinnata</i>	Palmae	B, U
3	Asam King	<i>Dracontomelon dao</i>	Anacardiaceae	B
4	Bayur	<i>Pterospermum diversifolium</i>	Sterculiaceae	B
5	Beringin hutan	<i>Ficus benjamina</i>	Moraceae	B, D, K
6	Cempedak hutan	<i>Artocarpus integer</i>	Moraceae	B
7	Dongdong	<i>Ficus deltoidea</i>	Moraceae	D
8	Durian hutan	<i>Durio zibethinus</i>	Bombacaceae	Bu, B
9	Galagala	<i>Ficus racemosa</i>	Moraceae	D, K, B
10	Gumbot	<i>Ficus toxicaria</i>	Moraceae	D, K
11	Hanyahap	Unidentified	-	B, K
12	Hatopul	<i>Santiria</i> sp.	Burseraceae	B
13	Haudolok B	<i>Eugenia</i> sp.	Myrtaceae	B
14	Haudolok jambu	<i>Eugenia cuprea</i>	Myrtaceae	B, D
15	Haudolok merah	<i>Eugenia</i> sp.	Myrtaceae	B
16	Haudolok putih	<i>Eugenia</i> sp.	Myrtaceae	B
17	Hoteng	<i>Quercus maingayi</i>	Fagaceae	B
18	Hoteng bunga	<i>Quercus pseudomolucca</i>	Fagaceae	B
19	Kandis	<i>Garcinia parvifolia</i>	Guttiferae	B
20	Lajo-lajo	Unidentified	-	B
21	Langsat hutan	<i>Lansium domesticum</i>	Meliaceae	B, D
22	Medang hunik	<i>Litsa odorifera</i>	Lauraceae	B
23	Medang kulim	<i>Litsea</i> sp.	Lauraceae	B
24	Medang nangka	<i>Elaeocarpus obtusus</i>	Elacocarpaceae	B
25	Paga paga	<i>Ixonanthes petiolaris</i>	Linnaceae	B
26	Pandan hutan	<i>Platea latifolia</i>	Icacinaceae	U
27	Rambutan hutan	<i>Arytera littoralis</i>	Sapindaceae	B
28	Rapas para	<i>Artocarpus dadah</i>	Moraceae	D
29	Rotan	<i>Calamus manan</i>	Arecaceae	U, D
30	Rube	<i>Meliosma sarawakensis</i>	Sabiaceae	D
31	Simarbosi bosi	Unidentified	-	D
32	Sirih hutan	<i>Piper sarmentosum</i>	Piperaceae	B
33	Suhat-suhat	Unidentified	-	U
34	Tembiski	<i>Fagraea fragrans</i>	Loganiaceae	B, K
35	Tepus	<i>Ammonum pseudopoetens</i>	Zingiberaceae	D, Bu
36	Teurep	<i>Artocarpus elastica</i>	Moraceae	B

Keterangan (Remarks) : B = buah (fruit); D = daun (leaves); K = Kulit batang/ranting (straw);
Bu = bunga (flower); U = umbut (umbut)