KRITERIA DAN INDIKATOR PENETAPAN ZONASI TAMAN NASIONAL BUKIT TIGAPULUH (Criteria and Indicator of Appointed Bukit Tigapuluh National Park Zones)

Oleh/By:

Rozza Tri Kwatrina dan/and Abdullah Syarief Mukhtar

ABSTRACT

One of constraints faced by Bukit Tigapuluh National Park (BTNP) is less optimal of its zonal system. This research was conducted to reformulate criteria and indicator of BTNP zones, arrangement which was relied on its physical parameter, economic social and biotic. Descriptive method were used and data were collected by doing survey. The results showed that indices of plant diversity was in a range from 2.17 up to 3.71. There were 17 aves, 11 mammal and 6 species of primate met on zones. The activities of society were collecting the non timber forest product and also extensive agriculture. The indicator proposal for each zone were: sanctuary zone counted 13 indicator, wilderness zone counted 5 indicator, intensive use zone counted 5 indicator, traditional use zone counted 10 indicator, rehabilitate zone counted 5 indicator and buffer zone counted 13 indicator.

Key words: Bukit Tigapuluh National Park, zonation, criteria, indicator

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rumusan kriteria dan indikator yang tepat dalam penetapan zonasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), berdasarkan parameter fisik, biotik, dan sosial ekonomi, sehingga bisa menjadi dasar bagi pengelolaan TNBT selanjutnya. Data yang dikumpulkan meliputi data kondisi fisik, biotik, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi vegetasi diperoleh melalui analisis vegetasi pada setiap zona, sedangkan pengamatan satwaliar dilakukan dengan metode perjumpaan pada kelas aves, mamalia, dan primata. Pengumpulan data sosial ekonomi dilakukan dengan penyebaran kuesioner pada responden sebanyak 66 responden yang ada di zona penyangga dan tradisional TNBT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis tumbuhan pada zona-zona yang diamati mempunyai indeks keanekaragaman jenis tumbuhan secara keseluruhan berkisar antara 2,17 sampai dengan 3,71. Terdapat 17 jenis aves, 11 jenis mamalia, dan enam jenis primata yang dijumpai di zona-zona tersebut. Kegiatan perekonomian masyarakat terutama berupa usaha pertanian ekstensif dan pemungutan hasil hutan. Empat kriteria zona TNBT telah sesuai dengan kriteria yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yaitu zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan intensif, dan daerah penyangga. Usulan indikator untuk masing-masing zona adalah zona inti sebanyak 13 indikator, zona rimba lima indikator, zona pemanfaatan intensif lima indikator, zona pemanfaatan tradisional 10 indikator, zona rehabilitasi lima indikator, dan daerah penyangga sebanyak 13 indikator.

Kata kunci: Taman Nasional Bukit Tigapuluh, zonasi, kriteria, indikator

I. PENDAHULUAN

Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) merupakan salah satu taman nasional yang penting di Sumatera yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan melalui Keputusan No. 6074/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 dengan luas 144.223 ha. Taman nasional ini memiliki banyak potensi di antaranya, (1) merupakan kawasan yang unik karena merupakan kelompok perbukitan yang dikelilingi oleh

dataran rendah (Samsuudin dan Pramono, 1996); (2) termasuk dalam tipe hutan hujan tropis dataran rendah yang sudah langka; (3) memiliki keanekaragaman jenis flora dan fauna yang sangat tinggi; (4) merupakan habitat tanaman obat, sekitar 292 spesies dapat dijadikan bahan dasar industri farmasi; (5) masih memiliki kawasan hutan primer yang cukup luas dan merupakan laboratorium alam yang menarik; (6) memiliki panorama alam yang indah dan budaya masyarakat tradisional

(suku Talang Mamak, Melayu Tua, dan Anak Dalam) yang merupakan aset wisata budaya; serta (7) sebagai habitat flora dan fauna yang terancam punah.

Namun demikian, TNBT juga menghadapi berbagai kendala pengelolaan dan ancaman terhadap keanekaragaman hayatinya. Salah satu kendala tersebut adalah sistem zonasi yang merupakan inti pengelolaan taman nasional belum berfungsi secara optimal. Sementara berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan taman nasional yaitu mencakup kepentingan pengelolaan, pemanfaatan sumberdayanya, dan pembangunan fisik untuk sarana pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya taman nasional (Sudrajat dan Sriyanto, 1988), maka sistem zonasi taman nasional hanya akan dapat berfungsi secara optimal bila penetapannya didasarkan pada kriteria dan indikator yang tepat untuk setiap zona.

Karakteristik setiap zona berbeda-beda sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Ada pengelolaan zona yang lebih ditekankan pada aspek pelestarian dan ada pula yang lebih ditekankan pada aspek pemanfaatan. Dengan demikian perbedaan tersebut perlu dijabarkan ke dalam kriteria dan indikator yang spesifik untuk masing-masing zona. Zonasi taman nasional di Indonesia termasuk TNBT, ditetapkan berdasarkan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Namun demikian kriteria-kriteria tersebut belum dijabarkan dalam indikator-indikator yang mencirikan setiap kriteria. Selain itu, beberapa kriteria zonasi seperti zona pemanfaatan tradisional dan zona rehabilitasi TNBT, belum ditemukan penjabarannya dalam PP No. 68 Tahun 1998 tersebut. Oleh sebab itu dilakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mendapatkan rumusan kriteria dan indikator dalam penetapan zonasi TNBT, yang didasarkan pada parameter fisik, biotik, dan sosial ekonomi sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengelolaan selanjutnya.

II. METODOLOGI

A. Lokasi dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di TNBT dari tahun 2003 sampai dengan 2005. Secara administratif pemerintahan, TNBT terletak di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau; serta Kabupaten Bungo Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi. Secara geografis TNBT terletak pada $0^{\circ}40'-1^{\circ}25'$ LS dan $102^{\circ}10'-102^{\circ}50'$ BT. Penelitian dilakukan pada daerah penyangga dan lima zona yang terdapat di TNBT yaitu zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan intensif, zona pemanfaatan tradisional, dan zona rehabilitasi (Lampiran 1).

B. Bahan dan Alat

Bahan dan peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta kelas letereng skala 1:100.000 dari Balai Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), peta topografi skala 1:400.000 dari Warsi, peta geologi skala 1:400.000 dari Warsi, peta penutupan lahan skala 1:400.000 dari Badan Planologi (Baplan), peta zonasi TNBT skala 1:400.000 dan 1:250.000 dari Balai TNBT, alkohol 70 %, *Global Positioning System* (GPS), meteran 50 meter, binokuler, kompas, botol plastik, tali rafia, sasak herbarium, peralatan komputer, dan alat tulis menulis.

C. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder, yang mencakup kondisi fisik wilayah, biotik (vegetasi dan satwaliar), serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebelum dilakukan pengumpulan data di lapangan, dilakukan analisis awal terhadap semua data dan informasi sekunder serta peta. Selanjutnya berdasarkan analisis tersebut dilakukan pengecekan lapangan (*ground checking*) terhadap lokasi pengamatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian selama tiga tahun disajikan pada Tabel 1.

Tabel (Table) 1. Tata waktu penelitian berdasarkan zona (*Time table of research based on BTNP zonation*)

Zona yang diamati (<i>Research zone</i>)	Tahun (<i>Year</i>)		
	2003	2004	2005
Daerah penyangga (<i>Buffer zone</i>)	*		
Zona pemanfaatan intensif (<i>Intensive use zone</i>)	*		
Zona pemanfaatan tradisional (<i>Traditional use zone</i>)		*	
Zona inti (<i>Sanctuary zone</i>)		*	
Zona rimba (<i>Wilderness zone</i>)			*
Zona rehabilitasi (<i>Rehabilitation zone</i>)			*

Keterangan (*Remark*): * = Kegiatan penelitian (*Research activities*)

1. Aspek Fisik Wilayah

Kondisi fisik wilayah diperoleh dengan melakukan pengamatan lapangan, dengan cara mencatat kondisi fisik yang diamati di lapangan seperti bentang alam, ada tidaknya gunung atau bukit. Selain itu karakter fisik wilayah juga diperoleh dari peta geologi dan hasil penelitian yang pernah dilakukan di TNBT. Data dan informasi tersebut diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan dari Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh (BTNT), Badan Perencanaan Daerah Kabupaten (Bappeda), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Badan Planologi (Baplan), Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan kegiatan studi di wilayah TNBT seperti Warung Informasi (Warsi), Program Konservasi Harimau Sumatera (PKHS), dan Yayasan Alam Sumatera (YASA).

2. Aspek Biotik

Menurut Kartawinata *et al.* (1976), dalam penelitian flora suatu ekosistem taman nasional, hanya dibedakan tiga tingkat tumbuhan yaitu pohon, belta, dan semai. Pohon adalah tumbuhan yang mempunyai keliling batang lebih besar dari 31,4 cm atau diameter lebih besar dari 10 cm. Belta adalah tumbuhan yang mempunyai keliling batang $\geq 6,3$ cm tetapi $\leq 31,4$ cm atau diameter ≥ 2 cm tetapi ≤ 10 cm. Semai adalah tumbuhan yang mempunyai keliling batang $\leq 6,3$ cm.

Kondisi vegetasi diperoleh melalui analisis vegetasi pada setiap zona. Pada daerah penelitian dibuat jalur coba. Pembuatan jalur coba memotong garis pantai/kontur, dengan lebar jalur 20 m dan dibagi dalam satuan 20 m x 20 m sebagai petak dasar. Panjang jalur pengamatan adalah 2.000 m atau disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Semua pohon diamati pada petak besar berukuran 20 m x 20 m. Di dalam petak besar dibuat petak-petak berukuran 20 m x 5 m untuk pengamatan tingkat belta, sedangkan di dalam petak 20 m x 5 m dibuat sub petak dengan ukuran 1 m x 1 m atau 2 m x 2 m untuk pengamatan tingkat semai dan terna. Petak besar ini diletakkan secara sistematis dengan interval 200 m sepanjang jalur coba yaitu menurut *line plot sampling*.

Pengamatan satwaliar dilakukan dengan metode perjumpaan yaitu dengan mengamati dan mencatat jenis satwaliar yang dijumpai di sepanjang jalur pengamatan vegetasi. Metode ini digunakan untuk mencatat jenis satwaliar yang tergolong pada klas aves, mamalia, dan primata yang dijumpai pada jalur coba vegetasi. Pengamatan satwaliar bisa dilakukan melalui cara langsung maupun tidak langsung. Cara langsung apabila satwa tersebut dapat diamati secara okuler. Pengamatan tidak langsung dilakukan apabila kehadiran satwa diketahui melalui suara (50 m kiri-kanan dari sumbu jalur coba), jejak, sarang, bekas makan, kotoran, goresan, dan indikasi lainnya.

3. Aspek Sosial Ekonomi

Pengumpulan data sosial ekonomi dilakukan pada zona pemanfaatan tradisional dan daerah penyangga TNBT, dengan memberikan daftar pertanyaan (kuesioner) pada 40 responden di daerah penyangga dan 26 responden zona pemanfaatan tradisional. Dasar pemilihan responden adalah masyarakat yang telah lama tinggal di lokasi pengamatan dan memiliki aktivitas hidup yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam di desa tempat tinggalnya. Metode yang digunakan sesuai dengan Pedoman Survei Sosial Ekonomi Kehutanan Indonesia, yang dapat digunakan dalam mengkaji masalah-masalah masyarakat tradisional yang tinggal dan hidup di dalam dan sekitar hutan alam maupun hutan tanaman (Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan dan Perkebunan, 2000).

D. Analisis Data

Data vegetasi dianalisis dengan menggunakan beberapa rumus seperti Kerapatan, Frekuensi, Indeks Nilai Penting, dan Indeks Keragaman Jenis. Hasil pengamatan dari tiap zona ditabulasi dan dijadikan bahan untuk menetapkan indikator zonasi. Sementara data satwaliar ditabulasi dan dikelompokkan sesuai dengan kelasnya, dicatat satwaliar yang penting pada setiap zona untuk menetapkan indikator satwa. Data sosial ekonomi ditabulasi untuk zona pemanfaatan tradisional dan daerah penyangga, untuk mengetahui karakteristik responden dan pemanfaatan sumberdaya alam, selanjutnya dijadikan dasar untuk menetapkan indikator yang berkaitan dengan masyarakat. Data fisik wilayah dianalisis dari data primer dan sekunder, dicatat ciri-ciri fisik yang spesifik untuk setiap zona, dan dijadikan dasar untuk menetapkan indikator fisik wilayah.

Dasar penetapan kriteria adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian

Alam. Sementara dasar penetapan indikator adalah modifikasi dari kriteria penetapan zona kawasan konservasi Gunung Tampomas yang juga diacu dari beberapa kriteria yang ada seperti Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Keputusan Menteri Pertanian No. 837 Tahun 1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung, Keputusan Menteri Pertanian No. 681 Tahun 1981 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata (Suitella, 2002). Prosedur penetapan kriteria dan indikator zonasi dapat digambarkan pada Gambar 1 (Mukhtar, 2002).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Fisik

Kawasan TNBT terletak pada ketinggian 60 m - 843 m dpl, dengan topografi berbukit. Secara garis besar kondisi topografinya dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Pegunungan dengan lereng sangat curam (lereng > 75 %).
2. Pegunungan dengan lereng yang curam-sangat curam (lereng 25-75 %).
3. Dataran antar pegunungan dan perbukitan kecil (lereng > 16 %).

Wilayah yang berlereng curam (> 40 %) mendominasi seluruh ekosistem di TNBT. Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan daerah penyangga merupakan daerah perbukitan dengan lipatan antiklinal terkikis yang masih tersisa di antara perbukitan Bukit Barisan di bagian barat dan dataran rendah rawa gambut di bagian timur (Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh, 2005). Daerah pegunungan Bukit Tigapuluh umumnya tersusun dari bahan batuan metamorf dan sedimen berumur pre-tercier. Batuan metamorf ini terdiri dari batuan sebak pasir dan batu pasir kearsitan (Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam, 1997).

Secara umum kondisi kesuburan tanah pada ekosistem Bukit Tigapuluh tergolong

Gambar (Figure) 1. Bagan alur prosedur penetapan kriteria dan indikator zonasi TNBT (Flow chart of criteria and indicator of BTNP zones arrangement procedure)

rendah dikarenakan secara umum jenis tanah yang ada di daerah itu adalah jenis Podsolik Merah Kuning dengan tekstur liat dan napal serta pasir (Balai Penelitian DAS Indragiri-Rokan dan Balai Taman Nasional Bukit Tiga-puluh, 2002). Kedalaman tanah cukup dangkal yaitu bervariasi dari 40 cm sampai 150 cm. Berdasarkan klasifikasi Schmidt-Ferguson (1951), kawasan TNBT termasuk tipe iklim A. Berdasarkan data iklim tahun 1988-2003 dari Stasiun Meteorologi Japura, Indragiri Hulu, rata-rata curah hujan tahunan sebesar 2.343,29 mm/tahun. Suhu udara rata-rata bulanan relatif stabil, sedangkan kelembaban udara rata-rata berkisar 84,1 % (bulan Agustus) sampai dengan 87,1 % (bulan Januari) (Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh, 2005).

Kawasan TNBT termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Utama yaitu Sungai Indragiri di Provinsi Riau dan Sungai Batanghari di Provinsi Jambi. Selain itu terdapat enam sub DAS yaitu Sungai Batang Gangsal, Cinaku, Reteh, Keritang, Pengabuan, dan Batang Sumai. Di dalam kawasan terdapat beberapa sungai dan air terjun, yaitu Sungai Gangsal, Menggatal, Akar, dan Mumal.

Berdasarkan aspek hidrologisnya, ekosistem Bukit Tigapuluh memiliki banyak mata air yang membentuk anak sungai yang memiliki pola dendritik. Pada umumnya keadaan hidrologi daerah ini dikendalikan oleh perbedaan topografi yang relatif menyolok antara perbukitan dan daratan. Sungai-sungai dari kawasan ini bermuara pada Sungai Indragiri (wilayah Riau) dan Sungai Batanghari

(wilayah Jambi). Sungai-sungai tersebut membentuk beberapa sub DAS dengan suatu sungai utama (Balai Penelitian DAS Indragiri-Rokan dan Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh, 2002).

B. Kondisi Biotik (Vegetasi dan Satwaliar)

Kawasan TNBT merupakan salah satu perwakilan ekosistem hutan hujan dataran rendah yang terpisah dengan pegunungan Bukit Barisan. Kawasan ini memiliki iklim basah, tanah kering, dan ketinggian 60-843 m dpl. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Whitmore dan Samsoedin (1991) dalam Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam (1997), diketahui bahwa hutan primer di pegunungan TNBT memiliki kekayaan jenis flora yang amat tinggi. Jenis-jenis dari suku Dipterocarpaceae banyak terdapat di kawasan ini. Jenis-jenis flora yang ditemukan tumbuh secara lokal di antaranya adalah jelutong (*Dyera costulata*), kempas (*Koompassia excelsa*), getah merah (*Palaquium* spp.), pulai (*Alstonia scholaris*), rumbai (*Shorea* spp.), cendawan muka rimau (*Rafflesia hasseltii*), *Swintonia floribunda* var. *penargiana*, dan palempaleman seperti *Johannestejsmania altiforans* dan *Licuala* sp.

Berdasarkan hasil pengamatan terdapat beberapa jenis tumbuhan yang dijumpai pada zona yang diamati, seperti meranti (*Shorea* spp.), puar (*Globba uliginosa*), medang (*Litsea* spp.), mahang (*Macaranga* spp.), tapus (*Elaterium spermum tapos*), kayu arang (*Diospyros banthamensis*), dan balau (*Dysoxylum excelsum*), dengan indeks keanekaragaman jenis tumbuhan secara keseluruhan berkisar antara 2,17 sampai dengan 3,71. Pada zona inti indeks keanekaragaman jenis tumbuhan masih tinggi yaitu berkisar antara 3,25 sampai 3,71. Indeks keanekaragaman jenis tumbuhan pada zona rimba, zona pemanfaatan intensif, dan zona pemanfaatan tradisional berkisar antara

2,17 sampai 3,33. Sementara pada desa pengamatan di daerah penyangga, indeks keanekaragaman jenis berkisar antara 2,73 sampai 3,19. Indeks ini menjadi salah satu indikator biotik dalam penetapan zona seperti zona inti dan rimba, di mana nilai indeks keanekaragaman jenisnya tinggi yaitu rata-rata ada di atas 3,0. Kondisi hutan demikian menyediakan habitat yang lebih baik bagi kelangsungan hidup satwa-satwa penting. Hasil pengamatan vegetasi disajikan pada Lampiran 2, 3, 4, 5, dan Lampiran 6.

Seperti halnya flora, TNBT juga memiliki kekayaan fauna yang tinggi. Di kawasan ini antara lain terdapat 42 jenis mamalia, enam jenis primata, 193 jenis aves, 97 jenis ikan, dan 134 jenis serangga. Jenis-jenis satwa tersebut antara lain gajah (*Elephas maximus sumatranus*), harimau (*Panthera tigris sumatrensis*), rusa sambar (*Cervus unicolor*), ungko tangan putih (*Hylobathes* sp.), ungko tangan hitam (*Hylobathes agilis*), dan lutung (*Presbytis cristata*). Lima jenis mamalia di TNBT tergolong jenis yang terancam punah, yaitu harimau (*P. tigris sumatrensis*), gajah (*E. maximus sumatranus*), macan dahan (*Neofelis nebulosa*), tapir (*Tapirus indicus*), dan berang-berang (*Aonyx cinerea*) (Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh, 2005).

Hasil pengamatan menunjukkan beberapa jenis satwa yang dijumpai pada zona yang diamati seperti, harimau sumatera (*P. tigris sumatrensis*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), tapir (*T. indicus*), siamang (*Symphalangus syndactylus*), simpai (*Presbytis melalophos*), ungko tangan hitam (*Hylobates agilis*), rusa (*Cervus* sp.), kancil (*Tragulus javanicus*), babi hutan (*Sus scrofa*), rangkong (*Rhyticeros corrugata*), elang hitam (*Ictinaetus malayensis*), murai batu (*Copsychus malabaricus*), dan kuaw (*Argusianus argus*). Beberapa jenis di antaranya merupakan satwa kunci atau satwa penting seperti harimau sumatera (*P. tigris sumatrensis*), beruang madu (*H. malayanus*), dan tapir (*T. indicus*). Dari

semua satwaliar tersebut 12 jenis di antaranya merupakan jenis yang dilindungi dan dua jenis satwa endemik Sumatera. Hasil pengamatan satwa disajikan pada Lampiran 7 dan Lampiran 8.

Penelitian Noprianto *et al.* (2002) yang dilakukan di zona inti, zona pemanfaatan intensif, dan daerah penyangga menunjukkan bahwa jenis tumbuhan dominan adalah *Hopea mengarawan*, *Campnosperma* sp., *Litsea* sp., *Antidesma* cf. *phanerophlebium*, *Macaranga tanarius*, *Ochanostachys amentacea*, dan *Shorea* sp. Sementara jenis-jenis satwa terutama dari klas mamalia yang teramati di antaranya macan dahan (*N. nebulosa*), ungko (*Hylobathes* sp.), dan harimau sumatera (*P. tigris sumatrensis*).

C. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Penduduk di dalam TNBT terdiri dari suku Melayu, Talang Mamak, dan Anak Dalam. Kegiatan perekonomian masyarakat bertumpu pada usaha pertanian dan hasil hutan. Kegiatan usaha pertanian berupa bertani ladang (ladang berpindah) dan berkebun karet secara tradisional (ekstensif), sedangkan kegiatan mencari hasil hutan antara lain dapat berupa kayu, rotan, damar, madu, jernang, dan buah-buahan.

Untuk di luar kawasan TNBT, terdapat penduduk yang tinggal di beberapa desa di sekitar taman nasional, antara lain desa Lubuk Kambing, desa Tuo Sumai, desa Pemayungan, desa Semambu, desa Muara Sekato, desa Siberida, desa Sungai Akar, desa Kampung Baru, desa Puntianai, desa Siambul, desa Rantau Langsat, dan desa Lubuk Mandrasah. Jumlah penduduk masing-masing desa berkisar antara 488-1.305 jiwa dengan kisaran jumlah kepala keluarga (KK) antara 125-255 KK. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dengan pendidikan rata-rata sekolah dasar.

Hasil penelitian mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di daerah penyangga di desa Lubuk Mandrasah, Provinsi Jambi menunjukkan bahwa ting-

kat pendidikan masyarakat masih rendah di mana rata-rata tamat sekolah dasar atau tidak tamat sekolah lanjutan pertama. Pekerjaan utama adalah sebagai petani dengan pekerjaan sampingan sebagai pedagang, supir, pegawai, wiraswasta, dan berladang. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam hutan cukup tinggi, yaitu sekitar 80 %. Masyarakat masih melakukan perladangan berpindah, yang menyebabkan munculnya lahan-lahan bekas perladangan. Kepemilikan dan pemanfaatan lahan juga cukup tinggi, yaitu 75 % masyarakat memiliki lahan berupa hutan, ladang, kebun, dan sawah. Rata-rata memiliki hutan seluas 2,33 ha, sehingga jika dijumlahkan dari 40 responden, terdapat sekitar 88,5 ha hutan yang dimiliki oleh masyarakat. Selain itu masyarakat memiliki interaksi yang cukup kuat dengan kawasan taman nasional yang terlihat dari tingginya intensitas memasuki kawasan taman nasional. Sekitar 60 % responden menyatakan pernah memasuki kawasan hutan TNBT. Dari jumlah tersebut, 50 % dengan intensitas sering dan 50 % dengan intensitas jarang.

Penelitian yang dilakukan oleh Noprianto *et al.* (2002) pada daerah penyangga di Provinsi Riau juga menunjukkan kondisi yang hampir serupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sekitar TNBT termasuk penduduk desa Siambul, desa Rantau Langsat, dan desa Talang Lakat sebagian besar adalah petani ladang berpindah. Dari kuesioner yang disebar diketahui bahwa rata-rata per kepala keluarga mempunyai dua sampai lima hektar lahan (63,6 %). Mereka membabat pohon di sekitar daerah penyangga untuk keperluan tersebut. Hasil dari pembukaan lahan biasanya mereka memanfaatkan untuk keperluan sehari-hari, seperti kayu bakar dan kayu pertukangan lainnya. Sebagian penduduk juga memanfaatkan hasil hutan berupa kayu-kayu komersil untuk mereka jual. Jenis kayu yang biasa mereka ambil antara lain dari jenis meranti, kulim, kompas, mersawa, dan kurangi. Usaha sampingan lainnya yang biasa dilakukan penduduk yaitu berburu satwaliar. Satwaliar yang biasa diburu yaitu rusa, ki-

jang, kancil, babi hutan, ikan, labi-labi, dan beberapa jenis burung di antaranya murai batu.

Penduduk sekitar TNBT selain dikenal sebagai petani juga dikenal sebagai pengumpul terutama hasil hutan bukan kayu seperti rotan, jernang, kayu gaharu, damar, petai, jengkol, dan madu lebah. Hasil hutan tersebut biasanya mereka konsumsi sendiri dan sebagian lagi mereka jual.

Kondisi ini sedikit berbeda dengan kondisi di zona pemanfaatan tradisional. Walaupun memiliki tingkat pendidikan yang juga rendah, namun pemanfaatan potensi sumberdaya alamnya tidak tinggi, dan biasanya dilakukan secara tradisional. Hanya sebagian kecil yang memanfaatkan jenis-jenis kayu (30,5 %), bahkan sebagian mereka (50 %) mengaku tidak pernah memanfaatkan kayu di wilayah mereka. Sebanyak 84,6 % responden mengaku memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) di wilayahnya dan hanya 15,4 % yang tidak memanfaatkan. Bahkan untuk hasil hutan bukan kayu jenis jernang (*Daemonorops draco*), masyarakat telah mulai membudidayakan sehingga tidak tergantung pada hasil hutan saja. Kepemilikan dan pemanfaatan lahan berupa hutan tidak sebanyak di daerah penyangga. Sebanyak 76,9 % responden memiliki lahan berupa ladang, 11,5 % berupa kebun, dan 3,8 % berupa hutan dan sawah.

Hasil penelitian Nopriano *et al.* (2002) terhadap pemanfaatan sumberdaya alam hutan oleh masyarakat lokal di dalam kawasan TNBT menunjukkan bahwa responden memanfaatkan rotan manau sebanyak 57,1 %, jernang sebanyak 42,9 %, gaharu sebanyak 10,5 %, petai 85,7 %, dan durian sebanyak 57,8 %.

D. Kriteria dan Indikator Penetapan Zonasi serta Implikasi Pengelolaannya

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh mengenai kondisi fisik, biotik, sosial ekonomi, budaya maka disusun usulan kriteria dan indikator pada masing-masing zona di TNBT.

1. Daerah Penyangga

Dalam PP No. 68 Tahun 1998, kriteria daerah penyangga adalah sebagai berikut:

- a. Secara geografis berbatasan dengan kawasan suaka alam dan atau kawasan pelestarian alam;
- b. Secara ekologis masih mempunyai pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar kawasan suaka alam dan atau kawasan pelestarian alam;
- c. Mampu menangkal segala macam gangguan, baik dari dalam maupun dari luar kawasan suaka alam dan atau kawasan pelestarian alam.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka dapat disusun indikator untuk masing-masing kriteria daerah penyangga sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.

Kriteria pertama dan kedua lebih ditekankan pada aspek fisik biotik. Indikator-indikator yang disusun merupakan kondisi wilayah yang lebih sesuai untuk daerah penyangga seperti kondisi fisik wilayah sedapat mungkin bukan merupakan kawasan yang rawan secara ekologis. Dengan demikian daerah-daerah dengan topografi curam atau sangat curam, tidak disarankan menjadi daerah penyangga. Selain itu daerah penyangga sebaiknya memiliki potensi biotik yang cukup tinggi khususnya hasil hutan nir kayu, sehingga dapat menunjang kehidupan masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap hasil hutan berupa kayu.

Kriteria ketiga lebih ditekankan pada kondisi yang diinginkan. Kata *mampu* dalam kriteria ketiga dapat diartikan sebagai suatu kemampuan secara menyeluruh meliputi kondisi fisik ekologis wilayah dan masyarakat di daerah penyangga. Beberapa indikator yang dapat mengindikasikan kondisi yang diinginkan pada kriteria ketiga tersebut adalah:

- a. Persepsi tentang pengelolaan daerah penyangga. Masyarakat sebagai subyek dan obyek dalam pengelolaan daerah penyangga perlu memiliki persepsi yang benar mengenai pengelolaan di daerahnya. Jika tidak demikian, maka

Tabel (Table) 2. Usulan kriteria dan indikator daerah penyangga TNBT (*Criteria and indicator proposed for BTNP buffer zone*)

Kriteria menurut PP No. 68 Th 1998 (<i>Criteria based on PP No. 68 Th 1998</i>)	Usulan indikator (<i>Proposed indicator</i>)	Hasil pada lokasi pengamatan (<i>Result on research location</i>)
(2) Secara geografis berbatasan dengan kawasan suaka alam dan atau kawasan pelestarian alam.	(1) Lokasi Desa Interaksi dan atau Desa Interaksi Utama	o Desa Interaksi Utama
	(2) Topografi datar dan atau landai	o Datar dan landai
	(3) Kelerengan 0-8 % dan atau 8-15 %	o 0-15 %
	(4) Tanah liat, lempung, pasir	o Liat, lempung
	(5) Vegetasi umum bukan hutan primer	o Hutan sekunder, ladang, dan pertanian
(2) Secara ekologis masih mempunyai pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar kawasan suaka alam dan atau kawasan pelestarian alam.	(6) Potensi biotik sedang	o Flora = Sedang-tinggi ($H' = 2,73-3,19$)
		o Fauna = rendah-sedang ($H' = 1,11-2,40$). Terdapat jenis fauna perpaduan dari hutan primer dan sekunder seperti ayam hutan, rangkong, kancil, rusa, beruk, simpai, dan siamang
	(7) Spesies-spesies penting tidak harus ada	Flora = meranti Fauna = kuaw, rangkong, kancil, siamang, simpai
(3) Mampu menangkal segala macam gangguan, baik dari dalam maupun dari luar kawasan suaka alam dan atau kawasan pelestarian alam.	(8) Potensi hasil hutan non kayu (HHNK) sedang-tinggi	Buah-buahan, rotan, getah, dan tanaman obat
	(9) Persepsi tentang pengelolaan daerah penyangga sedang-tinggi	Sedang (36,67 %-48,33 %)
	(10) Pengetahuan zonasi dan tata batas sedang-tinggi	Rendah (5 % -37,5 %)
	(11) Pemanfaatan sumberdaya alam sedang-tinggi	Tinggi (80 %), berupa pemanfaatan sumberdaya alam dan lahan.
	(12) Interaksi dan ancaman rendah	Sedang-tinggi (60 %)
	(13) Kepentingan pelestarian sumberdaya alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Lebih banyak untuk pemanfaatan sumberdaya alam tapi belum memberikan manfaat yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan. Kegiatan pelestarian sumberdaya alam seperti penataan batas, penyuluhan, dan penghijauan masih sangat sedikit diupayakan.

Keterangan (*Remark*): ■■■■ = Usulan proposal (*Proposed*)

masyarakat akan sulit menangkal gangguan dan ancaman di wilayahnya maupun melakukan pengelolaan secara efektif.

- b. Pengetahuan tentang zonasi dan tata batas. Masyarakat umumnya tidak tahu atau mungkin tidak mau tahu dengan batas kawasan taman nasional. Pengetahuan yang memadai tentang batas kawasan akan lebih efektif da-

lam mengamankan kawasan taman nasional.

- c. Pemanfaatan sumberdaya alam. Sebagai daerah yang berbatasan dengan kawasan taman nasional, sebaiknya pemanfaatan sumberdaya alam dapat dikendalikan dan tidak berpengaruh negatif bagi fungsi ekologis dalam kawasan taman nasional.
- d. Interaksi dan ancaman. Interaksi

masyarakat di daerah penyangga sebaiknya tidak mengancam kelestarian taman nasional.

- e. Kepentingan. Kepentingan pengelolaan daerah penyangga adalah untuk pelestarian sumberdaya alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian apapun bentuk pengelolaan di daerah penyangga akan mengacu kepada kedua kepentingan tersebut.

Untuk memantapkan zonasi daerah penyangga berdasarkan kriteria dan indikator tersebut, beberapa alternatif dapat diambil berkaitan dengan masyarakat sebagai subyek utama sehingga dapat mengurangi intensitas gangguan, di antaranya:

- a. Memperjelas tata batas TNBT.
- b. Meningkatkan sosialisasi mengenai batas-batas TNBT kepada masyarakat.
- c. Membentuk rintangan (*barrier*) di perbatasan daerah penyangga dengan kawasan TNBT. Dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Penyangga TNBT Tahun 2001-2011 disebutkan perlunya zona pembatas selebar 500 m dari batas daerah penyangga dan ditanami dengan jenis pinang dan buah-buahan.
- d. Melakukan pengayaan lahan pertanian masyarakat dengan jenis-jenis HHBK potensial sehingga dengan demikian masyarakat tidak memasuki kawasan TNBT untuk memperoleh HHBK yang diinginkan.

Pengelolaan yang berbasis masyarakat ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meminimalkan ancaman dan gangguan terhadap taman nasional. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 56 Bab V Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 bahwa daerah penyangga mempunyai fungsi untuk menjaga Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam dari segala bentuk tekanan dan gangguan yang berasal dari luar dan atau dalam kawasan yang dapat mengakibatkan

perubahan keutuhan dan atau perubahan fungsi kawasan.

2. Zona Inti

Kriteria zona inti telah diatur dalam PP No. 68 Tahun 1998. Dalam peraturan tersebut kriteria zona inti adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- b. Memiliki formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya;
- c. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
- d. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis;
- e. Mempunyai ciri khas potensinya dan dapat merupakan contoh yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi;
- f. Mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah.

Berdasarkan kriteria tersebut maka disusun indikator untuk masing-masing kriteria zona inti sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.

Mengacu pada kriteria zona inti dalam PP No. 68 Tahun 1998, maka potensi dan keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan fisik pada zona inti di TNBT ternyata masih tinggi yang terlihat dari salah satu indikatornya yaitu tingginya indeks keanekaragaman jenis tumbuhan yang berkisar antara 3,25-3,71, terdapat berbagai jenis satwa, dan bentuk fisik wilayah yang unik berupa kelompok perbukitan. Sebagian besar kawasan memiliki topografi yang curam dengan kelerengan ≥ 25 %. Kondisi tersebut cukup rawan secara ekologis sehingga perlu ditetapkan sebagai salah satu indikator zona inti. Selain itu bentang alam TNBT juga khas yang merupakan hutan hujan dataran rendah, sehingga memerlukan upaya konservasi.

Tabel (Table) 3. Usulan kriteria dan indikator zona inti TNBT (*Criteria and indicator proposal for BTNP sanctuary zone*)

Kriteria menurut PP No. 68 Th 1998 (<i>Criteria based on PP No. 68 Th 1998</i>)	Usulan indikator (<i>Proposed indicator</i>)	Hasil pada lokasi pengamatan (<i>Result on research location</i>)
(1) Mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya	(1) Keanekaragaman jenis tumbuhan dan atau satwa tinggi	o Tinggi (H'tumbuhan = 3,25-3,71)
(2) Mmewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya	(2) Tipe ekosistem khas	o Bagian dari hutan hujan tropika dataran rendah
(3) Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan atau belum diganggu manusia	(3) Tipe vegetasi hutan primer (4) Pemanfaatan sumber-daya alam tidak ada (5) Dibatasi oleh zona rimba	o Hutan primer & hutan sekunder o Beberapa kawasan berbatasan dengan zona pemanfaatan
(4) Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami	(6) Luas optimal (7) Bentuk cenderung melingkar (8) Kelerengan $\geq 25\%$	o Bentuk cenderung tidak radial/melingkar o Kelerengan $\geq 25\%$
(5) Mempunyai ciri khas potensinya dan dapat merupakan contoh yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi	(9) Potensi tumbuhan tinggi (10) Potensi satwa tinggi (11) Potensi fisik wilayah unik	o Beruang madu, harimau sumatera o Bagian dari kelompok perbukitan
(6) Mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah	(12) Spesies penting ada (13) Tingkat kelangkaan nyaris punah, genting (<i>endangered</i>), dan atau jarang, terbatas (<i>restricted</i>), dan atau penurunan pesat, rawan (<i>depleted/vulnerable</i>), dan atau terancam punah, terkikis (<i>indeterminate</i>)	o Beruang madu, harimau sumatra o Terancam punah (<i>indeterminate</i>)

Keterangan (*Remark*): = Usulan proposal (*Proposed*)

Salah satu kriteria zona inti yang penting adalah keaslian kondisi alamnya. Indikator yang semestinya mewakili untuk kriteria ini adalah hutan primer, namun demikian telah terjadi perubahan penutupan lahan yang cukup signifikan dalam kurun waktu tiga tahun (2000 sampai dengan 2003) di TNBT, di mana sebagian hutan primer telah berubah menjadi hutan sekunder. Dengan kondisi tersebut, penetapan zona inti berdasarkan indikator hutan primer saja tidak akan mewakili. Untuk itu perlu penambahan indikator hutan sekunder selain hutan primer sehingga zona inti yang ditetapkan memiliki luasan yang cukup bagi kelangsungan biota penting di dalamnya.

Kriteria selanjutnya menyatakan bahwa zona inti mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah. Berdasarkan kriteria tersebut, indikator zona inti yang dapat mengindikasikan kondisi tersebut adalah terdapatnya jenis langka dan tingkat kelangkaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TNBT merupakan bagian dari habitat beberapa jenis satwa penting seperti harimau sumatera dan beruang madu. Status kelangkaan satwa ini bahkan ada pada tingkat terancam punah atau *indeterminate*.

Mengingat tingginya kepentingan terhadap perlindungan beberapa jenis satwa

penting seperti harimau sumatera, beruang madu, dan tapir maka dalam pengelolaannya perlu dievaluasi batas-batas zona inti saat ini, terutama pada kawasan yang menjadi ruang jelajah (*home range*) satwa, sehingga dapat memberikan ruang yang cukup bagi satwa untuk hidup dan berkembang biak.

3. Zona Rimba

Kriteria zona rimba telah diatur dalam PP No. 68 Tahun 1998. Dalam peraturan tersebut kriteria zona rimba adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan yang ditetapkan mampu mendukung upaya perkembangbiakan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasi;
- b. Kawasan yang memiliki keanekaragaman jenis yang mampu menyangga pelestarian zona inti dan pemanfaatan;
- c. Kawasan yang merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka disusun indikator untuk masing-masing kriteria zona rimba sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.

Zona rimba berfungsi sebagai penyangga zona inti. Dengan demikian indikator yang mencirikan zona rimba semestinya merupakan suatu kawasan yang memiliki potensi alam masih relatif baik, seperti penutupan vegetasi yang masih rapat, keanekaragaman tumbuhan yang masih tinggi dan terdapatnya sumber-sumber air. Indikator-indikator tersebut penting karena zona rimba juga merupakan bagian dari habitat satwa migran tertentu sehingga memerlukan kawasan yang memiliki sumber-sumber pakan, tempat berlindung, dan berkembang biak. Sebagian kawasan zona rimba merupakan hutan sekunder dengan kondisi lahan landai, agak curam, dan curam, serta menjadi bagian dari daerah aliran sungai. Kondisi ini mendukung bagi kehidupan satwa-satwa penting yang perlu dikonservasi seperti harimau sumatera dan tapir.

Sebagai kawasan penyangga dan peralihan dari zona inti ke zona pemanfaatan maka zona rimba semestinya memiliki indikator potensi wisata alam yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata alam terbatas.

4. Zona Pemanfaatan Intensif

Zona pemanfaatan dalam PP No. 68 Tahun 1998 mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik;
- b. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;
- c. Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Kriteria tersebut di atas mengandung pengertian yang sama dengan zona pemanfaatan intensif sebagaimana yang terdapat dalam Petunjuk Pengusulan Rencana Zonasi Taman Nasional yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Kawasan Pelestarian Alam, No. 706/VI/BKPA-2/1998 tanggal 21 Juli 1998, yaitu zona yang ditunjukan untuk pemanfaatan pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistem taman nasional untuk kepentingan pariwisata alam.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka disusun indikator untuk masing-masing kriteria zona pemanfaatan intensif sebagaimana disajikan dalam Tabel 5. Zona pemanfaatan intensif merupakan kawasan yang diperuntukkan khusus bagi kegiatan pemanfaatan secara intensif. Zona pemanfaatan intensif di TNBT merupakan zona untuk pengembangan wisata alam secara intensif. Berdasarkan kriteria dalam PP No. 68 tahun 1998, maka indikator yang mengindikasikan kawasan tersebut adalah tingginya potensi biotik dan wisata, lokasi yang strategis, aksesibilitas yang mudah dan bukan bagian dari ruang jelajah satwa penting.

Tabel (Table) 4. Usulan kriteria dan indikator zona rimba TNBT (*Criteria and indicator proposed for btnp wilderness zone*)

Kriteria menurut PP No. 68 Th 1998 (<i>Criteria based on PP No. 68 Th 1998</i>)	Usulan indikator (<i>Proposed indicator</i>)	Hasil pada lokasi pengamatan (<i>Result on research location</i>)
(1) Kawasan yang ditetapkan mampu mendukung upaya perkembangan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasi	(1) Kondisi vegetasi rapat (2) Terdapat sumber-sumber air	o Vegetasi rapat o Bagian dari DAS
(2) Kawasan yang memiliki keanekaragaman jenis yang mampu menyangga pelestarian zona inti dan pemanfaatan	(3) Keanekaragaman jenis tumbuhan sedang-tinggi (4) Mempunyai potensi wisata alam	o H' sedang-tinggi, yaitu 2,72-3,32 o Memiliki panorama alam
(3) Kawasan yang merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu	(5) Bagian habitat dan atau ruang jelajah (<i>home range</i>) satwa langka	o Habitat harimau sumatera dan tapir
Keterangan (Remark): ■■■■ = Usulan proposal (<i>Proposed</i>)		

Tabel (Table) 5. Usulan kriteria dan indikator zona pemanfaatan intensif TNBT (*Criteria and indicator proposed for BTNP intensive use zone*)

Kriteria menurut PP No. 68 Th 1998 (<i>Criteria based on PP No. 68 Th 1998</i>)	Usulan indikator (<i>Proposed indicator</i>)	Hasil pada lokasi pengamatan (<i>Result on research location</i>)
(1) Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik	(1) Potensi biotik sedang-tinggi (2) Potensi wisata tinggi	o Sedang-tinggi ($H' = 2,17-3,08$) didominasi oleh jenis <i>S. leprosula</i> , <i>Dyospyros bantamensis</i> , dan <i>Litsea</i> sp. o Terdapat beruang madu, harimau sumatera, kuaw, rangkong, ungko tangan hitam, owa, dan siamang o Terdapat air terjun, kolam air dan wisata Bukit Lancang o Bagian dari ruang jelajah harimau sumatera dan tapir
(2) Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam	(3) Bukan bagian dari ruang jelajah satwa penting	
(3) Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam	(4) Lokasi strategis (5) Aksesibilitas mudah	o Berbatasan dengan daerah penyangga o Dilewati jalur lintas sumatera
Keterangan (Remark): ■■■■ = Usulan proposal (<i>Proposed</i>)		

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan potensi wisata alam TNBT cukup banyak, dan sebagian besar belum dikelola dengan baik. Sebagian kawasan tersebut ada yang dapat dijadikan kawasan pariwisata alam dan rekreasi serta kawasan wisata alam terbatas tergantung pada potensi biofisik dan fungsi kawasan-nya. Beberapa lokasi perlu ditinjau kembali karena terdapat kawasan yang menjadi bagian dari ruang jelajah harimau sumatera. Peninjauan ini bertujuan agar

kegiatan wisata alam tidak mengganggu kelangsungan hidup jenis satwa.

5. Zona Rehabilitasi

Kriteria zona rehabilitasi belum diatur dalam PP No. 68 Tahun 1998. Pada prinsipnya zona ini ditujukan untuk memulihkan kondisi kawasan yang telah terdegradasi atau rusak. Berdasarkan hasil penelitian maka diusulkan kriteria zona rehabilitasi sebagai berikut:

- a. Kawasan yang ditetapkan mengalami perubahan atau penurunan kualitas fisik dan atau biotik;
- b. Kawasan mengalami gangguan alami dan atau aktivitas manusia.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka disusun indikator untuk masing-masing kriteria zona rehabilitasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.

Indikator yang mengindikasikan kondisi seperti yang tersebut pada kriteria yang diusulkan adalah penutupan lahan tidak rapat, terdapat jenis-jenis bukan asli kawasan (*exotic*), penurunan potensi aliran sungai, dan degradasi tanah. Kondisi lahan dapat berupa lahan bekas longsor, kebakaran, bekas pemanfaatan seperti tebangan dari pemegang konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), jalur transportasi, lahan pertanian/ladang, tambang. Untuk menetapkan zona rehabilitasi tidak semua indikator harus ditemui di lapangan. Apabila salah satu indikator tersebut ditemukan dan diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif yang lebih buruk, maka suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai zona rehabilitasi. Tindakan pemulihan dan revegetasi yang dilakukan pada zona rehabilitasi dapat saja berbeda-beda untuk setiap lokasi, tergantung pada tujuan pemulihan kawasannya. Zona rehabilitasi dapat ditujukan sebagai zona inti, rimba, atau zona pemanfaatan.

Kawasan yang termasuk zona rehabilitasi dapat berubah setiap periode waktu tertentu, tergantung pada perubahan penutupan lahannya. Dengan demikian zona rehabilitasi bersifat temporer sehingga dapat saja tidak ditetapkan secara khusus sebagaimana zona-zona lainnya. Pihak taman nasional dapat menggunakan penafsiran citra landsat secara berkala, misalnya tiga tahun sekali, untuk mengetahui perubahan penutupan lahan dan menentukan kawasan yang perlu direhabilitasi.

6. Zona Pemanfaatan Tradisional

Dalam Petunjuk Pengusulan Rencana Zonasi Taman Nasional yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Kawasan Pelestarian

Alam, No. 706/VI/BKPA-2/1998 tanggal 21 Juli 1998, zona pemanfaatan tradisional ditujukan untuk mempertahankan hubungan tradisional dan adanya ketergantungan tradisional terhadap potensi sumberdaya alam taman nasional. Sementara PP No. 68 Tahun 1998 tidak secara khusus mengatur mengenai zona pemanfaatan tradisional. Berdasarkan data potensi, maka usulan kriteria pemanfaatan tradisional untuk TNBT adalah sebagai berikut:

- a. Secara geografis berada dalam wilayah taman nasional;
- b. Merupakan kawasan berpenduduk yang telah ditempati oleh masyarakat sebelum ditetapkannya wilayah taman nasional;
- c. Memiliki potensi sumberdaya alam yang mendukung kehidupan masyarakat lokal;
- d. Secara fisik ekologis tidak berpengaruh negatif terhadap potensi sumberdaya alam.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka disusun indikator untuk masing-masing kriteria zona pemanfaatan tradisional sebagaimana disajikan dalam Tabel 7.

Zona pemanfaatan tradisional dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kawasan penyangga. Zona ini ditujukan untuk mengurangi dampak pemanfaatan sumberdaya alam oleh manusia terhadap taman nasional. Zona pemanfaatan tradisional secara spesifik ada di dalam kawasan taman nasional, apabila kawasan penyangga ini ada di luar taman nasional maka akan berfungsi sebagai daerah penyangga. Oleh sebab itu kriteria yang pertama mengenai letak, akan membedakan antara zona pemanfaatan tradisional dengan daerah penyangga. Untuk TNBT adanya zona pemanfaatan tradisional juga tidak dapat dilepaskan dari keberadaan suku-suku asli dan pendatang yang telah lama mendiami kawasan sebelum dibentuknya taman nasional seperti suku asli Talang Mamak, Anak Dalam, dan Melayu Tua; serta suku pendatang seperti Batak, Jawa, dan Minang.

Tabel (Table) 6. Usulan kriteria dan indikator zona rehabilitasi TNBT (*Criteria and indicator proposed for BTNP rehabilitation zone*)

Usulan kriteria (<i>Criteria proposal</i>)	Usulan indikator (<i>Proposed indicator</i>)	Hasil pada lokasi pengamatan (<i>Result on research location</i>)
(1) Kawasan yang ditetapkan mengalami perubahan atau penurunan kualitas fisik dan atau biotik;	(1) Penutupan lahan tidak rapat (2) Terdapat jenis-jenis bukan asli kawasan (<i>exotic</i>) (3) Penurunan potensi aliran sungai (4) Degradasi tanah	o Vegetasi ada yang rapat dan ada yang tidak rapat, berupa semak o Terdapat jenis tanaman bukan asli kawasan TNBT
(2) Kawasan mengalami gangguan alami dan atau aktivitas manusia	(5) Lahan bekas longsor, kebakaran, bekas pemanfaatan seperti tebangkan HPH, jalur transportasi, lahan pertanian/ladang, tambang, dan lain-lain	o Bekas jalur transportasi HPH, areal bekas pertambangan batu granit, areal bekas tebangkan HPH, areal bekas perladangan masyarakat yang penutupan vegetasinya kurang

Keterangan (*Remark*): ■ = Usulan proposal (*Proposed*)Tabel (Table) 7. Usulan kriteria dan indikator zona pemanfaatan tradisional TNBT (*Criteria and indicator proposed for BTNP traditional use zone*)

Usulan kriteria (<i>Criteria proposal</i>)	Usulan indikator (<i>Proposed indicator</i>)	Hasil pada lokasi pengamatan (<i>Result on research location</i>)
(1) Secara geografis berada dalam wilayah taman nasional		
(2) Merupakan kawasan berpenduduk yang telah ditempati oleh masyarakat sebelum ditetapkannya wilayah taman nasional	(1) Suku asli dan atau pendatang	o Suku Talang Mamak, Anak Dalam
(3) Memiliki potensi sumberdaya alam yang mendukung kehidupan masyarakat lokal	(2) Potensi biotik (HHBK), kayu dan satwa sedang-tinggi (3) Topografi datar-landai (4) Kelerengan 0-8 % dan atau 8-15 % (5) Tanah lempung, pasir, liat (6) Vegetasi umum bukan hutan primer	o Buah-buahan, madu, petai, jernang, kayu sialang, murai, rangkong, simpai, beruk, babi, rusa o Tanah lempung, pasir, liat, batuan o Hutan lindung dan hutan produksi terbatas (hutan primer dan sekunder)
(4) Secara fisik ekologis tidak berpengaruh negatif terhadap potensi sumberdaya alam	(7) Pemanfaatan sumberdaya alam dan lahan rendah-sedang (8) Pengetahuan tata batas sedang-tinggi (9) Interaksi dan ancaman rendah (10) Kepentingan untuk mengakomodir keberadaan suku asli dan masyarakat lokal	o Sedang-tinggi, berupa kepemilikan hutan, ladang, kebun, dan sawah o Rendah; 12 %-46,3 % o Sedang

Keterangan (*Remark*): ■ = Usulan proposal (*Proposed*)

Kriteria selanjutnya adalah ketersediaan sumberdaya alam yang akan mendukung kehidupan masyarakat. Indikator yang mendukung kriteria tersebut adalah potensi biotik (HHBK), kayu, dan satwa

yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Potensi HHBK lebih diutamakan dibanding potensi kayu dengan tujuan untuk mencegah terjadinya

pemanfaatan kayu secara berlebihan oleh masyarakat. Untuk TNBT, jernang (*D. draco*) merupakan tanaman HHBK yang telah dimanfaatkan dan dibudidayakan oleh masyarakat.

Penetapan indikator-indikator seperti topografi yang datar dan atau landai, kelerengan 0-8 %, dan atau 8-15 %, sifat fisik tanah (lempung, pasir, dan liat) serta vegetasi umum selain hutan primer, bertujuan agar zona pemanfaatan tradisional bukan merupakan kawasan yang rawan secara ekologis melainkan dapat berfungsi sebagai kawasan yang mendukung kehidupan masyarakat. Sementara itu indikator-indikator pemanfaatan, pengetahuan, interaksi, dan kepentingan, ditetapkan untuk mengindikasikan kondisi masyarakat yang diinginkan dalam upaya mencegah timbulnya pengaruh negatif secara fisik dan ekologis terhadap potensi sumberdaya alam. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan dan interaksi terhadap sumberdaya alam sedang, dan sebagian besar masih dilakukan secara tradisional, seperti menangkap ikan dengan memancing dan melakukan seleksi dalam penebangan pohon.

Pengelolaan zona pemanfaatan tradisional di TNBT sangat strategis dan perlu mendapat perhatian karena keberadaan suku-suku asli di kawasan tersebut. Sebagian besar mereka mendiami kawasan sempadan sungai, untuk itu perlu pengawasan terhadap pemanfaatan lahan yang cenderung meningkat dan pengawasan terhadap kelestarian kawasan sempadan sungai. Berdasarkan penafsiran citra landsat tahun 2003, diketahui bahwa penutupan lahan pada kawasan zona pemanfaatan tradisional sebagian besar berupa semak. Kondisi ini perlu mendapat perhatian mengingat kecenderungan perubahan lahan tersebut. Untuk itu perlu sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat lokal mengenai batas kewasannya dan penggunaan lahan yang lebih baik. Di samping itu untuk mengurangi tekanan terhadap pemanfaatan

sumberdaya alam dalam kawasan taman nasional, perlu peningkatan keragaman dan kuantitas jenis-jenis HHBK seperti madu, tanaman obat, rotan, dan lain-lain.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kajian terhadap kriteria dan indikator Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, maka disimpulkan:

1. Empat kriteria zona TNBT telah sesuai dengan kriteria yang dimaksudkan dalam PP No. 68 Tahun 1998 yaitu zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan intensif, dan daerah penyangga.
2. Dua kriteria zona TNBT yaitu zona pemanfaatan tradisional dan zona rehabilitasi tidak terdapat penjabarannya dalam PP No. 68 Tahun 1998.
3. Usulan kriteria untuk zona rehabilitasi adalah:
 - a. Kawasan yang ditetapkan mengalami perubahan atau penurunan kualitas fisik dan atau biotik.
 - b. Kawasan mengalami gangguan alami dan atau aktivitas manusia.
4. Usulan kriteria zona pemanfaatan tradisional adalah:
 - a. Kawasan yang secara geografis terletak dalam wilayah taman nasional.
 - b. Merupakan kawasan berpenduduk yang telah ditempati oleh masyarakat sebelum ditetapkannya wilayah taman nasional.
 - c. Memiliki potensi sumberdaya alam yang mendukung kehidupan masyarakat lokal.
 - d. Secara fisik ekologis tidak berpengaruh negatif terhadap potensi sumberdaya alam.
5. Usulan indikator untuk masing-masing zona adalah: zona inti seba-

nyak 13 indikator, zona rimba sebanyak lima indikator, zona pemanfaatan intensif sebanyak lima indikator, zona pemanfaatan tradisional sebanyak 10 indikator, zona rehabilitasi sebanyak lima indikator, dan daerah penyangga sebanyak 13 indikator.

B. Saran

Dalam penerapannya, penggunaan kriteria dan indikator zonasi dapat juga didukung oleh hasil-hasil penelitian mengenai pola dan interaksi masyarakat sekitar terhadap pemanfaatan ruang sepanjang tahun, dan mengenai penggunaan lahan yang sesuai dengan kondisi biofisik seperti geologi, jenis tanah dan kelerengan pada wilayah penyangga, dan pemanfaatan TNBT.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Penelitian DAS Indragiri-Rokan dan Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh. 2002. Laporan akhir inventarisasi dan identifikasi fisik dan sosial ekonomi budaya masyarakat sekitar Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Pekanbaru.
- Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh. 2005. Rencana strategi dan aksi pengelolaan sumberdaya alam terpadu di Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan sekitarnya. Ekspose Strategi dan Aksi Pengelolaan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, 2-3 Februari 2005.
- Kartawinata, K., S. Soenarko, IGM. Tantra dan T. Samingan. 1976. Pedoman inventarisasi flora dan ekosistem. Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Pelstarian Alam. Bogor.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6074/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 tentang Taman Nasional Bukit Tigapuluh.
- Mukhtar, A.S. 2002. Usulan Kegiatan Penelitian (UKP) Model pengelolaan Taman Nasional. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Jakarta.
- Noprianto, R., R.T. Kwatrina, Sanudin, A. Hasanudin, dan A.E. Siahaan. 2002. Kajian nilai ekonomi keanekaragaman hayati Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Laporan Hasil Penelitian. Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Sumatera. Pematang Siantar. Tidak diterbitkan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998 tanggal 19 agustus 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan dan Perkebunan. 2000. Pedoman survei sosial ekonomi kehutanan Indonesia. Penerbit PPSEKI. Bogor.
- Samsoedin, I. dan I.B. Pramono. 1996. Studi kemungkinan perluasan areal Taman Nasional Bukit Tigapuluh di Provinsi Jambi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam. Bogor.
- Schmidt, F.H. and J.H.A. Ferguson. 1951. Rainfall types based on wet and dry peroid ratios for Indonesia with Western New Guinea. Verhand. No. 42. Kementrian Perhubungan Djawatan Meterorologi dan Geofisika. Jakarta.
- Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam. 1997. Rencana pengelolaan Taman Nasional Bukit Tigapuluh tahun 1997-2021. Pekanbaru.
- Sudrajat, A. dan A. Sriyanto. 1988. Konsepsi pengelolaan kawasan taman nasional. Seminar Nasional Konservasi Sumberdaya Alam dan Pengembangan Wisata Alam. Yogyakarta.
- Suitella, R.G. 2002. Zonasi kawasan konservasi Gunung Tampomas di Sumedang Jawa Barat. Tesis Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Tidak diterbitkan.

Lampiran (Appendix) 1. Peta zonasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Zonation map of Bukit Tigapuluh National Park)

Lampiran (Appendix) 2. Keanekaragaman jenis tumbuhan pada lokasi pengamatan di daerah penyangga
(Diversity of plants at buffer zone of the study area)

Klasifikasi (Classification)	Tingkat pertumbuhan (Vegetation stage)	Indeks (Index)		
		NO	H'	Si
Jalur coba (transect) I	Semai (Seedling)	98	2,73	0,08
	Belta (Sapling)	116	3,17	0,04
	Pohon (Tree)	94	3,19	0,06
Jalur coba (transect) II	Semai (Seedling)	110	2,78	0,07
	Belta (Sapling)	94	2,75	0,08
	Pohon (Tree)	90	2,92	0,06
Jalur coba (transect) III	Semai (Seedling)	95	2,84	0,06
	Belta (Sapling)	91	2,77	0,07
	Pohon (Tree)	82	2,80	0,07

Keterangan (Remarks): NO= jumlah individu pada suatu habitat (number of individu on habitat); H'= indeks keanekaragaman Shannon (1949) (index of Shannon diversity); Si=indeks keanekaragaman Simpson (1949) (index of Simpson diversity)

Lampiran (Appendix) 3. Keanekaragaman jenis tumbuhan pada lokasi pengamatan di zona inti (Diversity of plants at sanctuary zone of the research area)

Klasifikasi (Classification)	Tingkat pertumbuhan (Vegetation stage)	Indeks (Index)		
		NO	H'	Si
Jalur coba (transect) I	Semai (Seedling)	106	2,77	0,08
	Belta (Sapling)	140	3,25	0,04
	Pohon (Tree)	95	3,32	0,04
Jalur coba (transect) II	Semai (Seedling)	156	2,96	0,06
	Belta (Sapling)	95	2,72	0,08
	Pohon (Tree)	86	3,12	0,05

Keterangan (Remarks): NO= jumlah individu pada suatu habitat (number of individu on habitat); H'= indeks keanekaragaman Shannon (1949) (index of Shannon diversity); Si=indeks keanekaragaman Simpson (1949) (index of Simpson diversity)

Lampiran (Appendix) 4. Keanekaragaman jenis tumbuhan pada lokasi pengamatan di zona rimba (Diversity of plants at wilderness zone of the research area)

Klasifikasi (Classification)	Tingkat pertumbuhan (Vegetation stage)	Indeks (Index)		
		NO	H'	Si
Jalur coba (transect) I	Semai (Seedling)	148	3,36	0,04
	Belta (Sapling)	146	3,36	0,38
	Pohon (Tree)	108	3,71	0,05
Jalur coba (transect) II	Semai (Seedling)	134	3,30	0,04
	Belta (Sapling)	97	3,25	0,05
	Pohon (Tree)	94	3,59	0,03

Keterangan (Remarks): NO= jumlah individu pada suatu habitat (number of individu on habitat); H'= indeks keanekaragaman Shannon (1949) (index of Shannon diversity); Si=indeks keanekaragaman Simpson (1949) (index of Simpson diversity)

Lampiran (Appendix) 5. Keanekaragaman jenis tumbuhan pada lokasi pengamatan di zona pemanfaatan intensif (*Diversity of plants at intensive use zone of the research area*)

Klasifikasi (Classification)	Tingkat pertumbuhan (Vegetation stage)	Indeks (Index)		
		NO	H'	Si
Jalur coba (transect) I	Semai (Seedling)	73	2,68	0,12
	Belta (Sapling)	836	2,84	0,07
	Pohon (Tree)	101	3,33	0,04
Jalur coba (transect) II	Semai (Seedling)	57	2,46	0,09
	Belta (Sapling)	83	2,79	0,08
	Pohon (Tree)	101	3,24	0,05

Keterangan (Remarks): NO= jumlah individu pada suatu habitat (*number of individu on habitat*); H'= indeks keanekaragaman Shannon (1949) (*index of Shannon diversity*); Si=indeks keanekaragaman Simpson (1949) (*index of Simpson diversity*)

Lampiran (Appendix) 6. Keanekaragaman jenis tumbuhan pada lokasi pengamatan di zona pemanfaatan tradisional (*Diversity of plants at traditional use zone of the research area*)

Klasifikasi (Classification)	Tingkat pertumbuhan (Vegetation stage)	Indeks (Index)		
		NO	H'	Si
Jalur coba (transect) I	Semai (Seedling)	146	2,27	0,14
	Belta (Sapling)	269	3,08	0,06
	Pohon (Tree)	106	2,85	0,07
Jalur coba (transect) II	Semai (Seedling)	67	2,65	0,09
	Belta (Sapling)	162	3,01	0,06
	Pohon (Tree)	134	2,96	0,07
Jalur coba (transect) III	Semai (Seedling)	67	2,17	0,16
	Belta (Sapling)	208	2,81	0,08
	Pohon (Tree)	140	2,81	0,08

Keterangan (Remarks): NO= jumlah individu pada suatu habitat (*number of individu on habitat*); H'= indeks keanekaragaman Shannon (1949) (*index of Shannon diversity*); Si=indeks keanekaragaman Simpson (1949) (*index of Simpson diversity*)

Lampiran (Appendix) 7. Jenis aves yang dijumpai pada lima lokasi pengamatan (*Aves species found on the five research locations*)

No.	Nama lokal (Local name)	Nama ilmiah (Scientific name)	Lokasi pengamatan (Research location)				
			Daerah penyangga (Buffer zone)	Zona inti (Sanctuary zone)	Zona rimba (Wilderness zone)	Zona pemanfaatan intensif (Intensive use zone)	Zona pemanfaatan tradisional (Traditional use zone)
1.	Ayam hutan	<i>Gallus gallus</i>	*	-	*	-	-
2.	Burung daun	<i>Chloropsis venusta</i>	*	*	*	*	-
3.	Gagak	<i>Corvus enca</i>	*	*	-	-	-
4.	Kuaw ♦#	<i>Argusianus argus</i>	*	*	*	*	-
5.	Kucica	<i>Copsychus saularis</i>	*	*	*	*	*
6.	Murai batu	<i>Copyichus malabaricus</i>	*	*	*	*	*
7.	Pelatuk ♦#	<i>Trichastoma tickelli</i>	*	*	*	*	-
8.	Punai	<i>Treton olax</i>	*	-	-	-	-
9.	Perenjaj	<i>Prinia familiaris</i>	*	*	*	*	*
10.	Perenjaj gunung	<i>Prinia polychroa</i>	-	-	-	*	-
11.	Rangkong #	<i>Rhyticeros corrugata</i>	*	*	*	*	*
12.	Sriti	<i>Collocalia</i> sp.	*	*	-	*	-
13.	Sembubut	<i>Centropus</i> sp.	*	-	-	-	-
14.	Tekukur	<i>Streptopelia chinensis</i>	*	*	*	-	*
15.	Burung madu #	<i>Nectariniidae</i>	-	-	-	*	-
16.	Elang hitam #	<i>Ictinaetus malayensis</i>	-	-	-	*	-
17.	Burung mua	<i>Pycnonotus plumosus</i>	-	-	-	-	*

Keterangan (Remarks): * = ditemukan (*found*), - = tidak ditemukan (*not found*), ♦ = jenis endemik Sumatera (*endemic species of Sumatra*), # = jenis dilindungi (*protected species*)

Lampiran (Appendix) 8. Jenis mamalia yang dijumpai pada lima lokasi pengamatan (Mamalian species found on the five research locations)

No.	Nama lokal (Local name)	Nama ilmiah (Scientific name)	Lokasi pengamatan (Research location)				
			Daerah penyangga (Buffer zone)	Zona inti (Sanctuary zone)	Zona rimba (Wilderness zone)	Zona pemanfaatan intensif (Intensive Use zone)	Zona pemanfaatan tradisional (Traditional Use zone)
1.	Bajing	<i>Callosiurus prevostii</i>	*	*	*	-	-
2.	Kancil #	<i>Tragulus javanicus</i>	*	*	*	-	-
3.	Landak #	<i>Hystrix brachyura</i>	*	-	-	-	-
4.	Rusa #	<i>Cervus timorensis</i>	*	*	*	*	*
5.	Babi hutan	<i>Sus scrofa</i>	-	*	*	*	*
6.	Beruang madu #	<i>Helarctos malayanus</i>	-	*	-	*	*
7.	Kijang	<i>Cervus sp</i>	-	-	-	*	-
8.	Tupai tanah	<i>Tupaia agilis</i>	-	-	-	*	-
9.	Tapir # +	<i>Tapirus indicus</i>	-	-	-	*	-
10.	Kelawar	<i>Balionycteris maculata</i>	-	-	-	*	-
11.	Harimau sumatra # +	<i>Panthera tigris sumatrae</i>	-	-	-	*	-
12.	Beruk	<i>Macaca nemestrina</i>	*	*	*	-	*
13.	Monyet ekor panjang	<i>Macaca fascicularis</i>	*	*	*	-	-
14.	Siamang #	<i>Symphalangus syndactylus</i>	*	*	*	*	-
15.	Simpai	<i>Presbytis melalophos</i>	*	*	*	-	*
16.	Ungko tangan hitam #	<i>Hylobates agilis</i>	-	*	*	*	-

Keterangan (Remarks): * = ditemukan (found), - = tidak ditemukan (not found), # = jenis dilindungi (protected species), + = terancam punah (indeterminate)