Website : <http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPKS>

Jurnal Penelitian Kehutanan Sumatрана

Jurnal Penelitian Kehutanan Sumatрана.

Pemantauan Tingkat Bahaya Kebakaran Hutan Dan Lahan Dengan Indeks Kekeringan Keetch-Byram Drought Index Selama Periode El-Niño Di Provinsi Sumatera Selatan

(Fire Hazard Monitoring Of Forest And Land Fire With Keetch-Byram Drought Index Method During El-Niño Period In South Sumatra Province)

Reziko Agdialta^{1*}, Dodo Gunawan^{2*}, Amsari Mudzakir Setiawan^{3*}, Shelin Melinda^{4*}

¹Stasiun Klimatologi Palembang
Jl. Residen H. Amaluddin, Sako, Palembang, Sumatera Selatan, 30164

²Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG
Jl. Angkasa 1 No.2, Jakarta

³Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Perhubungan I No. 5, Pondok Betung, Pondok Aren, Pd. Betung, Tangerang Selatan,
Kota Tangerang Selatan, Banten 15221

⁴Stasiun Pemantauan Atmosfer Global Puncak Vihara Klademak Sorong
Jl. Sungai Remu KM. 8 Malanu Sorong

*Email: rezikoagdialta@gmail.com

Article History:

Received 20 Agust 2019; Received in revised form 26 November 2019;
Accepted 28 December 2020; Available online since 31 December 2020

ABSTRAK

Aktivitas manusia bukan merupakan satu-satunya penyebab utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan, akan tetapi terdapat faktor pendukung lain yaitu kondisi cuaca dan iklim ekstrem seperti El-Niño. Salah satu indeks yang digunakan untuk mengetahui potensi kebakaran hutan dan lahan adalah indeks KBDI (Keetch-Byram Drought Index). Indeks kekeringan tersebut dapat mengetahui potensi kebakaran suatu wilayah dengan menggunakan skala sifat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi kebakaran hutan dan lahan setiap bulan di wilayah Sumatera Selatan dengan menggunakan nilai KBDI selama periode kejadian El Niño pada tahun 2006 – 2015. Adapun data yang digunakan yaitu data curah hujan harian, data suhu maksimum harian yang diperoleh dari beberapa pos pengamatan di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan dan data titik panas dari Satelit Terra-Agua dengan sensor modis selama periode 2006-2015. Analisis dilakukan dengan mencari nilai KBDI harian dengan menggunakan data yang diperoleh dari beberapa titik pengamatan di wilayah Sumatera Selatan. Data tersebut kemudian dibuat rata-rata bulanannya. Langkah selanjutnya, dipetakan untuk melihat kondisi setiap bulan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dipengaruhi oleh faktor cuaca dan iklim. Dari hasil pengolahan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan paling tinggi selama tahun 2006, 2009 dan 2015 terjadi pada bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober. Puncaknya terjadi pada bulan September dan Oktober dan pada bulan tersebut rata-rata KBDI berada pada tingkat ekstrem serta memiliki banyak titik panas.

Kata Kunci: Kebakaran hutan, KBDI, titik panas

ABSTRACT

Human activity is not the only major cause of forest and land fires, however, there are supporting factors, namely extreme weather and climate conditions such as El Niño. One of index used to determine the potential for forest and land fires is the KBDI index (Keetch- Byram Drought Index). The drought index can determine the fire potential of an area by using a scale of nature. his study aims to determine the potential for forest and land fires every month in the South Sumatra region by using KBDI values during the El Niño event period in 2006 - 2015. The data used are daily rainfall data, daily maximum temperature data obtained from several observation posts in the Regency/City of South Sumatra and

hotspot data from the Terra-Agua Satellite with fashionable sensors during the period 2006 - 2015. between The analysis was carried out by finding daily KBDI values using data obtained from several observation points in the South Sumatra region. The data is then made into a monthly average. The next step, mapped to see the conditions in every month for the potential forest and land fire affected by weather and climate factors. The result of the processing showed that the highest average potential for forest and land fires were in 2006, 2009 and 2015 occurred in July, August, September, and October. The peak occurred in September and October, and in that month the average KBDI was at extreme levels and had many hotspots.

Keyword: Forest fire, KBDI, hotspot

I. PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia hampir terjadi setiap tahun dan berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Balai Besar TNGL (2003), menunjukkan bahwa kebakaran hutan yang terjadi tiap tahun sejak tahun 1998 hingga 2002 telah tercatat sekitar 3 ribu sampai 515 ribu hektar. Berdasarkan data yang diperoleh dari SIPONGI (Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2015 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, jumlah luas area yang terbakar adalah seluas 646.298,80 hektar (SIPONGI, 2020).

Fenomena El Nino, dengan nilai anomali suhu permukaan laut yang positif di tengah sampai ke timur garis khatulistiwa di Samudera Pasifik, memberikan dampak kuat terhadap faktor meteorologi dan proses ekologis di seluruh dunia (Huang *et al.*, 2020). Istilah *El Niño* berasal pada abad ke-19 yang dicetuskan oleh nelayan di Ekuador dan Peru. Nama *El Niño*, berasal dari bahasa Spanyol untuk "anak laki-laki kecil", mengacu pada anak Kristus, karena fenomena ini biasanya terjadi pada waktu Natal di Samudra Pasifik, di mana pada saat itu arus hangat terjadi di sekitar pantai Peru, sedangkan *La Niña*, berarti "gadis kecil" (Chen *et al.*, 2019). Menurut Herawati dan Santoso (2011), variabilitas iklim yang terkait dengan fenomena seperti *El Niño* Southern Oscillation (ENSO) dapat menyebabkan penurunan jumlah curah hujan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Menurut Irwandi *et al.* (2017) fenomena *El Niño* biasanya ditandai dengan menurunnya curah hujan dan meningkatnya

suhu muka laut atau SST (Sea Surface Temperature) dari nilai rata-ratanya. Hal ini disebabkan karena melemahnya angin pasat dalam skala luas dan meningkatnya suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Tengah dan Timur dekat Ekuator. Menurut Khahim *et al.* (2020) antara bulan Juni hingga Oktober pada tahun 2015, lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan mengalami peningkatan kekeringan yang disebabkan oleh kejadian *El Niño* yang telah membakar sebagian besar lahan gambut, akibatnya tumbuhan dan tutupan lahan terdegradasi. Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan tertinggi di Pulau Sumatera. Berdasarkan data Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), luas hutan dan lahan yang telah terbakar di Sumatera Selatan seluas 359.100 hektar (Nugroho, 2015).

Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan merupakan bencana alam yang perlu ditanggulangi karena dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut tidak hanya berdampak secara nasional, akan tetapi juga menimbulkan dampak global. Untuk mengetahui bahaya kebakaran secara dini di Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan titik panas. Melihat dampak negatif yang dihasilkan oleh kebakaran hutan dan lahan belakangan ini yang semakin meluas, maka diperlukan suatu usaha peringatan dini melalui penentuan peringkat bahaya kebakaran tersebut, salah satunya dengan menggunakan metode KBDI (Tarigan, 2015). Metode KBDI digunakan untuk mengetahui kondisi kekeringan bulanan pada periode *El Niño* yang ditunjukkan oleh indeks

kekeringan KBDI yang berdasarkan pada skala numerik. Skala numerik tersebut menunjukkan kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dideskripsikan ke dalam nilai indeks yang berkisar antara 0-2000 (Affan, 2002). Skala numerik tersebut antara lain 0-999 (rendah), 1000-1499 (sedang), 1500-1749 (tinggi), 1750-2000 (esktrem). Jika KBDI menunjukkan nilai 0, hal ini mengindikasikan bahwa tumbuhan dapat tumbuh dengan baik. Sementara itu, apabila KBDI menunjukkan nilai 2000, hal ini menunjukkan bahwa kelembaban tanah sangat rendah sehingga lahan gambut tersebut dapat dengan mudah terbakar. Selanjutnya, nilai-nilai indeks yang sudah didapatkan dianalisis hubungan antara nilai KBDI bulanan dengan jumlah titik panas di Sumatera Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan rata-rata kekeringan KBDI bulanan pada periode *El Niño* dan mengetahui hubungan antara indeks kekeringan KBDI bulanan

terhadap jumlah titik panas (*hotspots*) di Provinsi Sumatera Selatan. Pola hubungan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat maupun pemerintah daerah tentang bulan-bulan yang menjadi rawan kebakaran hutan dan lahan sehingga dapat menjadi acuan informasi dini dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

II. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan yang terletak diantara 1°-4° Lintang Selatan dan 102°-106° Bujur Timur dan terdiri dari beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Timur, Kota Pagar Alam, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten OKU Selatan (Gambar 1).

Gambar 1. Lokasi penelitian
Figure 1. Research location

B. Bahan dan Alat Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa data unsur cuaca yang diperoleh dari stasiun pengamat cuaca BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika), yaitu Stasiun Klimatologi Palembang dan data dari beberapa pos pengamatan di Provinsi Sumatera Selatan, antara lain Pos Hujan Kayu Agung di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pos Hujan Muara Dua di Kabupaten OKU Selatan, Pos Hujan Muara Dua di Kabupaten OKU Selatan, Pos Hujan Raksa Jiwa di Kabupaten OKU Timur, Pos Hujan Gunung Dempo di Kota

Pagar Alam, Pos Hujan Muara Enim di Kabupaten Muara Enim, Pos Hujan Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin, Pos Hujan Srikaton di Kabupaten Musi Rawas, dan Pos Hujan Srikaton di Kabupaten Banyuasin. Data tersebut berupa data curah hujan harian dan suhu maksimum harian pada tahun-tahun *El Niño* selama periode tahun 2006 hingga 2015, serta data titik panas (*hotspots*) pada tahun 2015 dari satelit Aqua-Terra yang diperoleh melalui situs <https://earthdata.nasa.gov/earth-observation-data/near-real-time/firms/active-fire-data>. Permintaan data dilakukan

melalui situs tersebut, kemudian data yang diminta akan dikirimkan via email. Penelitian ini menggunakan laptop untuk proses pengolahan data. Aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain aplikasi pengolahan data yaitu RStudio dan juga menggunakan aplikasi spasial GIS untuk memetakan kondisi kekeringan dengan menggunakan metode KBDI pada tahun *El Niño* selama periode tahun 2006-2015.

C. Tahapan Pelaksanaan atau Rancangan Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan proses pengumpulan data. Data dalam penelitian ini berupa data curah hujan dan suhu maksimum dari beberapa lokasi yaitu Stasiun Klimatologi Palembang, Pos Hujan Kayu Agung di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pos Hujan Muara Dua di Kabupaten OKU Selatan, Pos Hujan Raksa Jiwa di Kabupaten OKU Timur, Pos Hujan Gunung Dempo di Kota Pagar Alam, Pos Hujan Muara Enim di Kabupaten Muara Enim, Pos Hujan Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin, Pos Hujan Srikaton di Kabupaten Musi Rawas, dan Pos Hujan Srikaton di Kabupaten Banyuasin. Data tersebut diperoleh dari Stasiun Klimatologi Palembang. Untuk data suhu udara maksimum hanya tersedia di wilayah Kota Palembang, oleh karena itu untuk mendapatkan data suhu di beberapa wilayah yang lain dihitung dengan menggunakan estimasi dari persamaan Mock (1973).

Dalam menghitung nilai tingkat bahaya kebakaran digunakan metode KBDI dengan tiga variable utama yaitu rata-rata curah hujan tahunan, suhu maksimum dan curah hujan harian. Adapun persamaan yang digunakan untuk menghitung *Keetch-Byram Drought*

Index (KBDI) (Keetch dan Byram, 1968) sebagai berikut:

$$KBDI_i = KBDI_{(i-1)} - (10 \times CHB + DF_i)$$

Nilai *CHB* merupakan curah hujan bersih yang merupakan jumlah curah hujan perhari dikurangi 5 milimeter (mm) dan nilai *DF* merupakan faktor kekeringan. Untuk perhitungan KBDI di wilayah Indonesia, faktor kekeringan (*DF*) telah dimodifikasi oleh Deeming (1995) dengan formula sebagai berikut :

$$DF = \frac{(2000 - YKBDI) * (0.9676 * \exp(0.0875 * Tmaks + 1.552) - 8.229) * 0.001}{(1 + 10.88 * \exp(-0.00175 * AnnRain))}$$

DF adalah faktor kekeringan, sedangkan *Tmaks* adalah suhu udara maksimum harian (°C), *YKBDI* adalah indeks kekeringan *Keetch-Byram* kemarin (hari sebelumnya) dan *AnnRain* adalah rata-rata curah hujan tahunan (mm). Dari perhitungan KBDI tersebut, menghasilkan angka indeks yang menentukan tingkat kekeringan pada suatu wilayah yang dapat dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kebakaran, dan diekspresikan dengan rentang nilai antara 0 sampai 2000 (Tabel 1).

Untuk menghitung suhu maksimum harian di wilayah Pos Hujan yang tidak memiliki pengamatan suhu udara, dilakukan perhitungan dengan menggunakan pendugaan dari stasiun terdekat dengan memperhatikan faktor ketinggian tempat. Adapun persamaan sebagai berikut (Mock, 1973) :

$$\Delta t = 0,006 \times (Z1 - Z2)$$

Dimana Δt merupakan perbedaan suhu antara stasiun pengukuran dengan yang dianalisis (°C), *Z1* adalah elevasi stasiun pengukuran suhu (m), dan *Z2* adalah elevasi stasiun yang dianalisis (m). Untuk menghitung

Tabel 1. *Klasifikasi Skala Nilai KBDI*
Table 1. *KBDI Scale Value Classification*

Skala Numerik	Skala Sifat
0 -999	Rendah
1000 – 1499	Sedang
1500 – 1749	Tinggi
1750 – 2000	Ekstrem

Sumber : Keetch dan Byram (1968)

Source : Keetch dan Byram (1968)

suhu maksimum harian persamaan diatas, dapat disesuaikan menjadi sebagai berikut:

$$T_h = T_{ho} - ((0,6/100)*h)$$

Dimana T_h adalah suhu udara Pos Hujan ($^{\circ}\text{C}$), T_{ho} adalah suhu udara stasiun acuan, dan h adalah selisih ketinggian Pos Hujan dpl (meter). Setelah mendapatkan nilai KBDI maka dibuat grafik nilai rata-rata bulanan KBDI, curah hujan serta jumlah *hotspots* dan selanjutnya dibandingkan dengan nilai KBDI dengan curah hujan dan sebaran *hotspots*. Kemudian *output* dari hasil pengolahan tersebut selanjutnya dibuat dalam bentuk spasial berupa peta kekeringan bulanan dengan metode KBDI menggunakan aplikasi GIS dengan teknik interpolasi IDW (*Inverse Distance Weighted*) setelah diinterpolasi peta kekeringan tersebut, kemudian ditambahkan data titik panas dengan menggunakan teknik *overlay* untuk memvalidasi tingkat kekeringan di wilayah Sumatera Selatan terhadap jumlah titik panasnya.

D. Analisis Data

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan spasial. Analisis spasial digunakan untuk memetakan tingkat bahaya kebakaran hutan dan

lahan menggunakan indeks KBDI yang kemudian dilakukan analisis deskriptif antara hasil rata-rata nilai KBDI bulanan dan jumlah titik panas di Provinsi Sumatera Selatan pada saat El Niño yaitu tahun 2006, 2009 dan 2015.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Berikut adalah hasil rata-rata nilai KBDI bulanan dan jumlah titik panas di Provinsi Sumatera Selatan pada saat *El Niño* yaitu tahun 2006, 2009 dan 2015.

1. Pola Spasial KBDI Bulan Januari

Nilai KBDI pada bulan Januari (Gambar 2), memperlihatkan bahwa hampir di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan rata-ratanya berada pada tingkat yang rendah. Sementara itu, sebagian wilayah lain rata-ratanya berada pada tingkat sedang. Kemudian, jika dilihat dari sebaran titik panas, jumlah titik panas pada bulan Januari tahun 2015 cenderung lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2009 yaitu sejumlah 14 titik. 6 titik panas terdeteksi berada di kabupaten yang memiliki nilai rata-rata KBDI rendah yaitu Kabupaten OKI, Kabupaten Lahat, Kabupaten Prabumulih, dan Banyuasin dan 8 titik panas lainnya terindikasi di kabupaten yang memiliki

Gambar 2. Pola spasial nilai KBDI dan sebaran titik panas bulan Januari
Figure 2. Spatial patterns of KBDI value and hotspots distribution in January

nilai rata-rata KBDI sedang yaitu di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, dan Kota Lubuk Linggau.

2. Pola Spasial KBDI Bulan Februari

Nilai KBDI pada bulan Februari (Gambar 3), memperlihatkan bahwa nilai KBDI di wilayah Provinsi Sumatera Selatan rata-rata berada pada tingkat rendah dan sedang. Hanya pada beberapa kabupaten saja pada tahun 2015

yang berada pada tingkat tinggi. Pada bulan Februari tahun 2015, titik panas cenderung lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2009 yaitu sejumlah 40 titik. 6 titik panas terdeteksi di kabupaten yang memiliki nilai KBDI tingkat rendah dan 34 titik panas terindikasi di kabupaten yang memiliki nilai KBDI sedang.

Gambar 3. Pola spasial nilai KBDI dan sebaran titik panas bulan Februari
Figure 3. Spatial patterns of KBDI value and hotspots distribution in Februari

3. Pola Spasial KBDI Bulan Maret

Nilai KBDI pada bulan Maret (Gambar 4), memperlihatkan bahwa di wilayah Provinsi Sumatera Selatan rata-rata berada pada tingkat rendah dan sedang. Hanya pada beberapa kabupaten pada tahun 2015 yang berada pada tingkat tinggi. Selain itu, nilai KBDI terlihat cukup ekstrem pada tahun 2015

di Kabupaten Musi Banyuasin. Pada bulan Maret tahun 2015, titik panas cenderung lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2009 yaitu sejumlah 41 titik. 5 titik panas terdeteksi di kabupaten yang memiliki nilai KBDI rendah dan 29 titik panas terindikasi di kabupaten yang memiliki nilai KBDI sedang dan 7 titik panas terdeteksi pada tingkat tinggi.

Gambar 4. Pola spasial nilai KBDI dan sebaran titik panas bulan Maret
Figure 4. Spatial patterns of KBDI value and hotspots distribution in March

4. Pola Spasial KBDI Bulan April

Nilai KBDI pada bulan April (Gambar 5), memperlihatkan bahwa pada tahun 2006 dan 2009 hampir seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Selatan rata-rata berada pada tingkat rendah. Hanya saja tahun 2015 terjadi perubahan nilai KBDI yang cukup ekstrem

yaitu di Kabupaten Musi Banyuasin. Pada bulan April tahun 2009 jumlah titik panas terindikasi lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2015. Jumlah titik panasnya adalah sejumlah 80 titik dan berada pada nilai KBDI rendah. Sedangkan pada tahun 2015 terdeteksi 2 titik panas pada wilayah dengan nilai KBDI ekstrem.

a. 2006. b. 2009 c. 2015

Gambar 5. Pola spasial nilai KBDI dan sebaran titik panas bulan April
 Figure 5. Spatial patterns of KBDI value and hotspots distribution in April

5. Pola Spasial KBDI Bulan Mei

Nilai KBDI pada bulan Mei (Gambar 6), memperlihatkan bahwa hampir seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Selatan rata-rata berada pada tingkat rendah dan sedang. Hanya pada beberapa kabupaten pada tahun 2015, nilai KBDI berada pada tingkat tinggi yaitu terjadi di Kabupaten Muara Enim. Pada

tahun 2009, titik panas cenderung lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2015 yaitu sejumlah 126 titik. 10 titik panas terdeteksi di kabupaten yang memiliki nilai KBDI rendah panas terdeteksi di kabupaten yang memiliki nilai KBDI rendah dan 116 titik panas terindikasi di kabupaten yang memiliki nilai KBDI sedang.

a. 2006 b. 2009 c. 2015

Gambar 6. Pola spasial nilai KBDI dan sebaran titik panas bulan Mei
 Figure 6. Spatial patterns of KBDI value and hotspots distribution in May

6. Pola Spasial KBDI Bulan Juni

Nilai KBDI pada bulan Juni (Gambar 7), memperlihatkan bahwa hampir seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Selatan rata-rata berada pada tingkat rendah dan sedang. Pada tahun 2006, Kota Pagar Alam memiliki nilai KBDI dalam kategori sedang. Pada tahun 2009 dan 2019 terdeteksi nilai KBDI

berada pada tingkat ekstrem di Kota Muara Enim. dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2009 yaitu sejumlah 230 titik panas. 15 titik panas terdeteksi di kabupaten yang memiliki nilai KBDI rendah, 98 titik panas terindikasi di kabupaten dengan nilai KBDI sedang, 114 titik di wilayah dengan nilai KBDI tinggi, dan terdapat 3 titik di wilayah dengan nilai KBDI tingkat ekstrem.

Gambar 7. Pola spasial nilai KBDI dan sebaran titik panas bulan Juni
Figure 7. Spatial patterns of KBDI value and hotspots distribution in June

7. Pola Spasial KBDI Bulan Juli

Nilai KBDI pada bulan Juli (Gambar 8), memperlihatkan bahwa hampir seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Selatan rata-rata berada pada tingkat tinggi. Pada tahun 2015, jumlah wilayah yang mengalami nilai KBDI dengan kategori ekstrem meningkat yaitu

terjadi di Kota Muara Enim, Kabupaten Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sebagian wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Pada bulan Juli tahun 2015, jumlah titik panas lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2009 yaitu sejumlah 701 titik panas. 27 titik panas terdeteksi di kabupaten yang

Gambar 8. Pola spasial nilai KBDI dan sebaran titik panas bulan Juli
Figure 8. Spatial patterns of KBDI value and hotspots distribution in July

memiliki nilai KBDI sedang, 414 titik panas terindikasi di kabupaten dengan nilai KBDI tinggi, dan 260 titik panas di wilayah dengan nilai KBDI tingkat ekstrem.

8. Pola Spasial KBDI Bulan Agustus

Nilai KBDI pada bulan Agustus (Gambar 9), memperlihatkan bahwa hampir seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Selatan rata-rata berada pada tingkat tinggi dan ekstrem. Pada tahun 2009, Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuk Linggau, dan Kota Pagar Alam hanya

memiliki nilai KBDI berada pada tingkat sedang, sedangkan wilayah lainnya masuk dalam kategori tinggi dan ekstrem. Pada bulan Agustus tahun 2015, titik panas lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2009 yaitu sejumlah 1.937 titik panas, 1.039 titik panas terdeteksi di kabupaten yang memiliki nilai KBDI tinggi dan 898 titik panas terindikasi di kabupaten yang memiliki nilai KBDI tingkat ekstrem.

Gambar 9. Pola spasial nilai KBDI dan sebaran titik panas bulan Agustus
Figure 9. Spatial patterns of KBDI value and hotspots distribution in August

9. Pola Spasial KBDI Bulan September

Nilai KBDI pada bulan September (Gambar 10), memperlihatkan pada tahun 2015 seluruh wilayah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai KBDI pada tingkat ekstrem, sedangkan pada tahun 2006

terdapat beberapa wilayah yang masih berada pada tingkat sedang hingga tinggi. Pada bulan Agustus tahun 2015, jumlah titik panas lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2009 yaitu sejumlah 11.359 titik panas yang semuanya berada pada wilayah yang memiliki KBDI dengan tingkat ekstrem.

Gambar 10. Pola spasial nilai KBDI dan sebaran titik panas bulan September
Figure 10. Spatial patterns of KBDI value and hotspots distribution in September

10. Pola Spasial KBDI Bulan Oktober

Nilai KBDI pada bulan Oktober (Gambar 11), memperlihatkan bahwa pada tahun 2006 dan 2015 seluruh wilayah Sumatera Selatan memiliki rata-rata nilai KBDI tingkat ekstrem, sedangkan pada tahun 2009 rata-rata nilai KBDI berada pada tingkat sedang.

Bulan September menunjukkan jumlah titik panas cenderung berkurang jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Titik api terbanyak terdeteksi pada bulan Oktober tahun 2006 dan 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu sejumlah 2.574 dan 11.977 titik panas yang semuanya berada pada wilayah dengan nilai KBDI ekstrem.

Gambar 11. Pola spasial nilai KBDI dan sebaran titik panas bulan Oktober
Figure 11. Spatial patterns of KBDI value and hotspots distribution in October

11. Pola Spasial KBDI Bulan November

Nilai KBDI pada bulan November (Gambar 12), memperlihatkan bahwa nilai KBDI berada pada tingkat sedang hingga tinggi. Hanya terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki nilai KBDI tingkat ekstrem di tahun 2006 yaitu di Kabupaten OKU Selatan, Kota Palembang, dan sebagian wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Demikian juga nilai KBDI ekstrem tahun 2015 terjadi di Kabupaten

Lahat, sebagian wilayah Kota Prabumulih dan sebagian wilayah Kota Muara Enim. Jika dilihat dari sebaran titik panas, jumlah titik panas pada bulan November relatif lebih sedikit atau berkurang jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Jumlah titik panas pada tahun 2015 lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2009 yaitu sejumlah 1.225 titik panas, 49 titik panas berada pada wilayah dengan nilai KBDI tingkat sedang, 1172 titik

Gambar 12. Pola spasial nilai KBDI dan sebaran titik panas bulan November
Figure 12. Spatial patterns of KBDI value and hotspots distribution in November

panas berada pada wilayah dengan nilai KBDI tinggi dan 4 titik panas berada di wilayah dengan nilai KBDI tingkat ekstrem.

12. Pola Spasial KBDI Bulan Desember

Nilai KBDI pada bulan Desember (Gambar 13), menunjukkan seluruh wilayah Sumatera Selatan memiliki nilai KBDI tingkat rendah, hal ini disebabkan karena jumlah curah

hujan di seluruh wilayah meningkat sehingga dapat menurunkan tingkat nilai KBDI di semua wilayah di Provinsi Sumatera Selatan. Demikian juga jumlah titik panas pada bulan Desember tampak menurun.

Pada (Tabel 2) yang merupakan jumlah titik panas yang diperoleh dari satelit Aqua-Terra pada periode tahun dengan kejadian

Gambar 13. Pola spasial nilai KBDI dan sebaran titik panas bulan Desember
Figure 13. Spatial patterns of KBDI value and hotspots distribution in December

Tabel 2. Jumlah titik panas pada tahun 2006, 2009 dan 2015 pada kondisi KBDI tertentu di Sumatera Selatan

Table 2. Number of hotspots in 2006, 2009 and 2015 in certain KBDI condition in South Sumatera

Bulan		Rendah			Sedang			Tinggi			Ekstrem			Jumlah
		2006	2009	2015	2006	2009	2015	2006	2009	2015	2006	2009	2015	
Januari	Jumlah Titik Api	2	7	6	0	0	8	0	0	0	0	0	0	23
Februari		9	6	6	1	1	34	0	0	0	0	0	0	57
Maret		1	48	5	4	4	29	0	0	7	0	0	0	98
April		21	80	14	0	0	13	0	0	0	0	0	2	130
Mei		12	10	1	18	116	21	0	0	0	0	0	0	178
Juni		0	0	15	57	6	98	0	168	114	0	0	3	461
Juli		0	0	0	0	236	27	318	329	414	0	42	260	1626
Agustus		0	0	0	0	156	0	978	1146	1039	1214	85	989	5607
September		0	0	0	0	29	0	112	811	0	5431	2549	11359	20291
Oktober		0	13	0	0	186	0	0	99	0	2574	6	11977	14855
November		0	5	0	28	0	49	417	4	1172	4	2	4	1685
Desember		121	15	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187

Sumber : Data satelit Aqua-Terra Tahun 2006, 2009 dan 2015

Source : Aqua-Terra satellite data in 2006, 2009 and 2015

El Niño yakni pada tahun 2006, 2009, dan 2015 dapat ditarik kesimpulan bahwa titik panas cenderung lebih banyak terdeteksi pada saat nilai KBDI berada pada kondisi tinggi hingga ekstrim. Peningkatan jumlah titik panas yang diikuti oleh peningkatan kriteria KBDI ini juga, cenderung terjadi pada bulan Juni hingga Oktober yang dimana pada bulan tersebut juga terjadi aktivitas monsun yang mempengaruhi curah hujan di wilayah Sumatera Selatan. Nilai KBDI ekstrim dengan jumlah titik panas terbanyak cenderung terjadi pada bulan September hingga Oktober yang merupakan puncak musim kemarau di wilayah Sumatera Selatan.

B. PEMBAHASAN

Hasil analisis rata-rata nilai KBDI di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2006, 2009 dan 2015 menunjukkan adanya variasi setiap bulannya. Pada bulan Januari-Juni rata-rata nilai KBDI berada pada tingkat rendah (0-999) hingga tinggi (1500-1749). Nilai KBDI tingkat ekstrem terjadi pada bulan Juli hingga Oktober. Meningkatnya nilai KBDI pada bulan Juli-Oktober disebabkan oleh curah hujan dan jumlah hari hujan yang rendah, sehingga tingkat bahaya kekeringan cenderung tinggi. Selain itu, berkurangnya jumlah curah hujan juga dipengaruhi oleh fenomena *El Niño* dengan intensitas kuat terutama pada tahun 2015. Menurut Li *et al.*, (2020), kejadian *El Niño* yang terjadi pada periode (2015/2016) merupakan kejadian *El Niño* dengan intensitas sangat kuat yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Indikator untuk menyatakan hal tersebut adalah nilai anomali suhu permukaan laut di wilayah Nino.34 yang bernilai $> 2^{\circ}$ Celcius. Menurut Akbar (2008), salah satu yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan cukup tinggi pada tahun 1997–1998 yaitu adanya gejala fenomena *El Niño* yang mempengaruhi arus laut di Samudera Pasifik yang telah berdampak pada kekeringan panjang di wilayah Asia Tenggara. Selain kondisi iklim ekstrem yang dipengaruhi oleh *El Niño*, perubahan penggunaan lahan

juga menjadi faktor pendukung terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Budiningsih, 2017).

Secara umum jumlah titik panas selalu meningkat seiring dengan meningkatnya nilai KBDI di wilayah Sumatera Selatan bagian Timur yaitu wilayah Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Umumnya wilayah tersebut merupakan kawasan hutan produksi yang didominasi lahan rawa gambut dengan jenis vegetasi Meranti, Jelutung, Terentang, Pulai, Ramin, Kempas dan lainnya yang pada kondisi kering mudah terpicu oleh penyulutan sehingga terjadi kebakaran hutan dan lahan (Budiningsih, 2017). Kemunculan titik panas cukup banyak terjadi di wilayah yang memiliki nilai KBDI ekstrem.

Menurut Abadi *et al.* (2013) nilai indeks KBDI dan titik panas (*hotspots*) dapat menjadi salah satu indikator terjadinya peningkatan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kebakaran umumnya terjadi pada saat curah hujan yang cukup rendah. Secara umum berdasarkan hasil nilai KBDI berbanding lurus dengan jumlah titik panas (*hotspots*), semakin tinggi nilai KBDI maka semakin tinggi pula jumlah titik panas. Hal tersebut ditunjukkan pada bulan Juli–Oktober, dimana pada bulan tersebut terjadi nilai KBDI cukup tinggi dan memiliki jumlah titik panas paling banyak. Puncak musim kebakaran hutan dan lahan terjadi pada bulan Oktober dengan nilai KBDI ekstrem dan dengan jumlah titik panas sangat banyak, sehingga pada bulan tersebut perlu diwaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, ada beberapa bulan dengan nilai KBDI yang rendah, akan tetapi jumlah titik apinya terpantau cukup banyak. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah faktor yang disebabkan oleh aktifitas manusia dalam hal ini pembukaan lahan baru. Oleh karena itu, KBDI sejatinya hanya menggambarkan kondisi kekeringan yang disebabkan oleh faktor cuaca dan iklim.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Nilai KBDI yang menunjukkan tingkat kekeringan memiliki hubungan terhadap peningkatan jumlah titik panas di Provinsi Sumatera Selatan, semakin tinggi nilai KBDI di suatu wilayah maka jumlah titik panasnya cenderung semakin meningkat. Titik panas banyak terdeteksi pada wilayah dengan nilai KBDI tinggi hingga ekstrem. Dalam periode *El Niño* tahun 2006, 2009 dan 2015, bulan yang memiliki tingkat kekeringan tinggi dan ekstrem adalah bulan Juli sampai Oktober dan diikuti jumlah titik panas 1.000–2.300 titik. Berdasarkan tiga periode *El Niño* tersebut, tahun 2015 merupakan tahun yang memiliki nilai KBDI dan titik panas tertinggi jika dibandingkan tahun 2006 dan 2009 hal ini akibat terjadinya tahun *El Niño* dengan intensitas kuat.

B. Saran

Dalam penelitian ini, terlihat bahwa bulan yang rentan mengalami kejadian kebakaran hutan dan lahan adalah pada bulan Juli hingga bulan Oktober. Oleh karena itu, tingkat siaga 1 dan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan perlu dilakukan pada bulan Juli sampai Oktober. Selain itu, perlu juga dilakukan penelitian lanjutan untuk memvalidasi titik panas, seberapa akurat menggambarkan titik api di wilayah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, P., Rahmawanty, & Affudin, Y. (2013). Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan Indeks Kekeringan dan Titik Panas di Kabupaten Samosir, *Jurnal Bidang Kehutanan* vol 2, No. 2.
- Affan, J. M. (2002). Penilaian Tingkat Bahaya Kebakaran Hutan Berdasarkan Indeks Vegetasi, NVDI dan Indeks Kekeringan, KBDI (Studi Kasus Taman Nasional Berbak, Jambi). *Skripsi*, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Akbar, A. (2008). Pengendalian kebakaran hutan berbasis masyarakat sebagai upaya mengatasi risiko dalam REDD. *Tekno Hutan Tanaman*, I (1), 11–22.
- Budiningsih, K., (2017). Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 14 (2), pp.165-186.
- Chen, N., Thual, S., & Hu, S. (2019). *El Niño and the Southern Oscillation: Observation. Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences*.
- Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Balai Besar TNGL. (2003). Laporan Akhir Kajian Penilaian Karbon di Bukit Lawang dalam Rangka Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Balai Besar TNGL. Bogor: PT. Boraspati Wahana.
- Deeming, J.E. (1995). *Pengembangan Sistem Penilaian Bahaya Kebakaran Di Provinsi Kalimantan Timur Indonesia*. (IFFM-Dephutbun/GTZ).
- Herawati, H., & Santoso, H. (2011). Tropical forest susceptibility to and risk of fire under changing climate: A review of fire nature, policy and institutions in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 13(4), 227–233.
- Huang, B., L'Heureux, M., Hu, Z., Yin, X., & Zhang, H. (2020) How Significant Was the 1877/1878 *El Niño*?. *Journal of Climate*, Vol. 33, No. 11, 4853 - 4869.
- Irwandi, H., Nasution, I.M., Kurniawan, E. dan Megalinda, Y. (2017). Pengaruh El-Nino Terhadap Variabilitas Curah Hujan di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Fisika dan Teknologi*, Vol. 1, No. 2.
- Keetch, J.J., & Byram, G.M. (1968). A drought index for forest fire control. *U.S.D.A Forest Service Research Paper SE-38*.
- Khahim, M.Y.N., Bama, A.A., Yustian, I., Poerwono, P., Tsuji, T., & Matsuoka, T. (2020). Peatland subsidence and vegetation cover degradation as impacts of the 2015 *El Niño* event revealed by Sentinel-1A SAR data. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, Vol. 84, 101953.
- Li, J., Huang, J.-G., Tardif, J. C., Liang, H., Jiang, S., Zhu, H., & Zhou, P. (2020). Spatially heterogeneous responses of tree radial growth to recent *El Niño* southern-oscillation variability across East Asia subtropical forests. *Agricultural and Forest Meteorology*, 287, 107939.
- Mock, F.J. (1973). Land Capability Appraisal Indonesia Water Availability Appraisal. *FAC*. 1
- Nugroho, S.P. (2015). 800 Ribu Hektar Karhutla di Sumatera Hingga Oktober 2015. Juli 19,

2016 <http://bnpb.go.id/berita/2693/800-ribu-hektar-karhutla-di-sumatera-hingga-oktober-2015>.

Sipongi.menlhk.go.id, *Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2020*, Maret 31, 2020 http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran

Tarigan, H. (2015). Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran Hutan di Propinsi Sumatera Utara Berdasarkan Data Satelit TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission). *Tesis Magister Sains*, Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara