IMPLIKASI BIOLOGI REPRODUKSI TERHADAP KONSERVASI GENETIK JENIS *Santalum album*

Oleh

Liliana Baskorowati

Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km.15, Purwobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta 55582
Telp. (0274) 895954, 896080, Fax. (0274) 896080

ABSTRACT

Santalum album is one of the extinct species which need to be conserved. Therefore, the information of reproductive biology of this species, especially the pollination system can produce important clues in order to conserve it. Preliminary study of pollination system of *S. album* was conducted at ex-situ conservation plot at Watusipat, Gunung Kidul, Yogyakarta. The observations showed that *S. album* flowers categorised as protandrous, which structured acropetally; this structure may lead self-pollination within a spike. However, result from artificial pollination showed that *S. album* was a predominantly out crossing species. Very low level of seeds setted from self-pollinated flowers indicated that pollinator was needed for reproduction process. Observation revealed that European honey bee (*Apis mellifera*) was one of potential pollinating agents.

Key words: *Santalum album*, artificial pollination, pollination system, pollination agent

ABSTRAK

Santalum album (cendana) merupakan salah satu jenis yang hampir punah, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk melestarikannya. Informasi tentang biologi reproduksi khususnya sistem penyerbukan akan sangat mendukung upaya konservasi jenis tersebut. Penelitian pendahuluan tentang sistem perkawinan dan penyerbukan *S. album* dilakukan pada plot penelitian konservasi ex-situ *S. album* di Watusipat, Gunung Kidul, Yogyakarta. Bunga *S. album* termasuk dalam tipe bunga yang protandri, dengan sistem pembungaan yang *acropetal* sehingga secara struktur bunga memungkinkan untuk terjadi perkawinan sendiri. Meskipun demikian, hasil penyerbukan terkendali memperlihatkan bahwa *S. album* mempunyai sistem perkawinan yang *outcrossing*. Biji yang terbentuk pada perlakuan kawin sendiri sangat rendah; hal ini mengindikasikan bahwa serangga penyerbuk sangat diperlukan dalam proses reproduksi. Hasil observasi memperlihatkan bahwa lebah madu (European honey bee-*Apis mellifera*) merupakan serangga yang paling berpotensi menjadi agen penyerbuk pada *S. album*.

Kata kunci: *Santalum album*, penyerbukan terkendali, sistem penyerbukan, agen penyerbuk.

PENDAHULUAN

Pendekatan konservasi seyogyanya berdasarkan studi detail tentang sistem reproduksi jenis yang akan dikonservasi. Sebagai contoh, dalam kegiatan konservasi *ex-situ*, karakteristik reproduksi seperti penyebaran biji, kapasitas perkecambahan, kemampuan hidup tingkat semai dan tanaman di lapangan, umur mulai berbunga, siklus reproduksi dan jumlah atau intensitas pembungaan yang berdampak pada jumlah biji yang dihasilkan merupakan informasi yang harus diketahui suatu jenis/spesies untuk beradaptasi pada lingkungan yang baru. Disamping itu, studi tentang sistem penyerbukan, mekanisme penyerbukan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyerbukan akan menyediakan petunjuk penting berkenaan dengan kendala-kendala reproduksi yang pada umumnya dijumpai pada jenis-jenis tanaman tertentu. Pada spesies dengan tipe penyerbukan yang *outcrossing*, ukuran populasi dan kerapatan tegakan umumnya berasosiasi dengan kemampuan mengundang pollinator dan aktivitas pollinator (Moza dan Bhatnagar 2007). Hal ini dikarenakan populasi yang kecil, pada umumnya kurang menarik pollinator untuk mendatangi bunga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkurangnya ukuran populasi akan berakibat turunya produksi benih dikarenakan rendahnya transfer polen (Florence, 1964).

Santalum album (cendana) merupakan spesies yang masuk dalam family Santalaceae yang tumbuh secara alami di bagian timur Indonesia, namun saat ini jenis ini sudah masuk ke dalam kategori tanaman langka yang dilindungi (CITES). Minyak *S. album* merupakan produk yang sangat tinggi nilainya yang dihasilkan dari kayu gubal jenis ini. Informasi tentang pembungaan cendana di populasi alam di Jawa menyebutkan bahwa jenis ini umumnya berbunga mulai bulan Juni sampai dengan bulan Oktober (Prasetyaningtyas 2005). Namun demikian beberapa pustaka menyebutkan bahwa musim pembungaan dan pembuahan jenis ini sangat tergantung dengan kondisi tempat tumbuhnya (Srimathi 1983; Srimathi and Nagaveni 1995). Umumnya pada populasi alam, jenis ini mempunyai kemampuan pembuahan yang sangat rendah yang akan berdampak pada proses regenerasi (Bagachi dan Kulkarni 1987; Brand 1994; Fox *dkk.* 1995; Suma dan Balasundaran 2003). Menurut Bhaskar (1992) dan Jyothi *dkk.* (1991), *S. album* umumnya merupakan spesies yang berkawin silang serta mempunyai sifat ketidakcocokan untuk berkawin sendiri (*self incompatible*), meskipun struktur bunganya memungkinkan untuk terjadi kawin sendiri.

Sebagai upaya untuk menentukan strategi konservasi yang tepat pada *S. album* khususnya pada plot konservasi *ex-situ* *S. album*, maka penelitian tentang biologi reproduksi jenis ini perlu dilakukan. Makalah ini memuat penelitian pendahuluan yang dilakukan pada tahun 2009 di areal konservasi *ex-situ* *S. album*, Watusipat, Gunung Kidul, Yogyakarta.

METODOLOGI PENELITIAN

Pengamatan pembungan dan pembuahan cendana serta sistem penyerbukan dilakukan pada tanaman cendana umur 6 tahun dalam plot konservasi *ex-situ* cendana di Watusipat, Gunungkidul, Yogyakarta. Plot ini dibangun pada tahun 2003, terdiri dari 14 provenan yang berasal dari Pulau Alor, Timor, Pulau Sumba dan Pulau Jawa. Pengamatan dilakukan mulai bulan Maret sampai dengan Desember 2009. Pengamatan pembungan dan pembuahan dilakukan pada setiap bulan sekali untuk mengetahui waktu puncak pembungan dan pembuahan.

Pengamatan perkembangan bunga menjadi buah dilakukan dengan memberikan label pada minimal 20 individu bunga pada tahap perkembangan bunga yang sama yaitu ketika kuncup. Pengamatan perkembangan bunga dilakukan seminggu dua kali selama 2 bulan berturut-turut. Semua pohon yang berada dalam plot penelitian diamati pembungan berdasarkan skor yang dikembangkan oleh Sedgley *dkk.* (1991). Pengamatan pembungan dilakukan dengan menghitung jumlah *inflorescences* pada masing-masing individu. Jumlah *inflorescences* ini digunakan untuk menentukan skor. Skor tersebut adalah **1** = tidak berbunga (jumlah *inflorescences* = 0), **2** = bunga sedikit (jumlah *inflorescences* < 25), **3** = bunga sedang (jumlah *inflorescences* 25-50) dan **4** = bunga melimpah (jumlah *inflorescences* > 50).

Pemberian skor pembungan tersebut ditujukan untuk memudahkan memilih pohon yang akan digunakan untuk perlakuan penyerbukan. Dikarenakan perlakuan penyerbukan membutuhkan jumlah bunga yang banyak, maka hanya pohon dengan skor 4 (bunga melimpah) saja yang dipilih untuk dijadikan sebagai sampel. Dari hasil penskoran tersebut ternyata hanya terdapat 2 provenan yang mempunyai pohon dengan bunga yang melimpah. Penyerbukan terkendali dilakukan pada saat puncak pembungan dengan menggunakan 4 pohon dari 2 provenan. Perlakuan penyerbukan dilakukan pada masing-masing pohon yang ditunjuk sebagai pohon sampel, sehingga setiap pohon mempunyai 3 perlakuan. Adapun perlakuan tersebut adalah: (i) penyerbukan silang terkendali, (ii) penyerbukan sendiri (dengan

menutup bunga menggunakan kantong pollinasi) (iii) penyerbukan terbuka/alam. Adapun metode penyerbukan terkendali mengacu pada metode yang dikembangkan oleh Baskorowati (2006).

Observasi agen penyerbuk dilakukan pada puncak pembungaan pada beberapa pohon yang mempunyai bunga yang melimpah. Pengamatan dilakukan pada pagi hari, masing-masing selama 5 menit selama tiga hari berturut-turut. Jumlah serangga yang mendatangi dan melakukan kontak dengan bunga dicatat dan dihitung, sedangkan contoh serangga dikoleksi dengan cara menangkap menggunakan jaring untuk proses identifikasi lebih lanjut.

Data agen penyerbuk yang mengunjungi bunga selama lima menit pengamatan dikonversi ke dalam logaritma, yang kemudian dianalisis menggunakan REML analisis (GenStat 8), dengan jenis serangga sebagai efek tetap dan sampel pohon sebagai efek random. Model analisis varian yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y_{ij} = \mu + \rho_i + \epsilon_{ij}$$

Y_{ij} = Rata-rata jumlah serangga pada ulangan ke i ,

μ = Rerata umum

ρ_i = Pengaruh dari ulangan ke i

ϵ_{ij} = Pengaruh sisa (residual)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Struktur bunga

Struktur bunga cendana adalah hermaprodit, yaitu mempunyai *style* dengan *stigma* sebagai organ betina dan polen sebagai organ jantan dalam satu bunga. Bunga-bunga tersusun dalam satu tandan (*inflorescence*), dengan jumlah bunga yang bervariasi dalam satu tandan. Perkembangan bunga dari kuncup sampai ke bunga masak tidak sinkron dalam satu tandan, dengan kecenderungan mengikuti perkembangan bunga yang *acropetal*; dimana bunga mengalami kemasakan dari bawah menuju ke atas (Gambar 1).

Gambar 1. Struktur pembungaan *S. album* yang memperlihatkan perkembangan individu bunga *acropetal*

Struktur bunga yang semacam ini memungkinkan peluang yang besar terjadinya kawin sendiri (*autogamy*) yang akan menurunkan viabilitas biji karena adanya depresi inbreeding. Lebih lanjut, bunga cendana hanya mempunyai 4 *anther* sebagai sumber polen; jumlah ini sangat sedikit mengingat kebutuhan polen untuk penyerbukan sangat besar. Stigma pada umumnya masak terlebih dahulu dibandingkan dengan waktu pecahnya kantong polen /*anther*, sehingga bunga cendana termasuk dalam kategori *protandry*. Tipe kemasakan bunga yang *protandry* sebetulnya merupakan salah satu mekanisme bunga untuk mencegah terjadinya kawin sendiri, karena pada umumnya akan terjadi overlap antara kemasakan stigma dan polen dalam satu *inflorescence* yang menghambat terjadinya *autogamy*.

B. Pembungaan dan Pembuahan

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa musim berbunga dan berbuah cendana di plot konservasi *ex-situ* Watusipat, Gunungkidul, Yogyakarta pada tahun 2009 terjadi dua kali dalam setahun, dimana terjadi ketidakserempakan waktu berbunga antar individu pohon dalam satu populasi. Puncak pembungaan terjadi pada akhir bulan Mei dan akhir bulan Desember, sedangkan puncak pembuahan dicatat terjadi pada bulan Maret dan Agustus 2009. Variasi intensitas pembungaan terlihat pada populasi ini (Gambar 2), dengan intensitas pembungaan 38,3% pada bulan Juni, sedangkan pada bulan Desember intensitas pembungaan menurun yaitu hanya 12% pohon berbunga. Rendahnya intensitas dan ketidakserempakan pembungaan antar individu pada populasi ini akan berdampak pada rendahnya keberhasilan bunga menjadi buah. Seperti yang disajikan pada Gambar 2, terlihat bahwa meskipun pada bulan Juni puncak pembungaan mencapai 38,3 %, keberhasilan

menjadi buah hanya 11,2% (lihat Gambar 2, pada puncak pembuahan bulan September 2009).

Gambar 2. Waktu dan tingkat berbunga dan berbuah *Santalum album* di plot konservasi ex-situ Watusipat, Gunungkidul, Yogyakarta (n=280 pohon)

Musim pembungaan pada plot penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan di populasi alam cendana di hutan pendidikan Wanagama, Gunungkidul, Yogyakarta dimana puncak pembungaan pada populasi tersebut terjadi pada bulan Juli, dengan jumlah pohon yang berbunga 18,15% (Prasetyaningstyas 2005). Variasi waktu pembungaan dan pembuahan umum terjadi pada beberapa spesies, tergantung pada lokasi dan kondisi lingkungan setempat. Lebih lanjut disebutkan bahwa waktu, frekuensi maupun intensitas pembungan dalam satu spesies bervariasi, yang dipengaruhi oleh faktor genetik maupun faktor biotik dan abiotik (Smith-Ramirez dan Armesto 1994; Eldridge *dkk.* 1993; Friedel *dkk.* 1993; Keatley dan Hudson 1998). Keatley dan Hudson (1998) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembungaan adalah agroklimat (suhu, persipitasi), kondisi geografi (*latitude, longitude dan altitude*), kompetisi pollinator, penyebaran polen dan biji, maupun struktur pembungaan.

Di beberapa tempat, cendana berbunga pada waktu yang berbeda-beda, sebagai contoh, di India jenis ini berbunga dua kali setahun, pembungaan pertama terjadi pada bulan Mei dan berbuah pada bulan September, sedangkan pembungaan kedua terjadi pada bulan November dan berbuah pada bulan Februari (Srimanthi dan Nagaveni 1995). Di China, cendana umumnya berbunga pada bulan Maret dan Mei setiap tahunnya (Ma *dkk.* 2006).

C. Sistem Penyerbukan

Hasil penelitian sistem penyerbukan melalui penyerbukan terkendali secara lengkap disajikan pada Tabel 1. Pada Gambar 3, terlihat bahwa penyerbukan sendiri tanpa emaskulasi (*automatic self-pollination*) menghasilkan pembentukan biji yang sangat rendah yaitu 0,65% (provenan Timor) dan 1,5 % (provenan Sumba). Sementara itu, biji terbanyak dihasilkan dari penyerbukan silang dengan emaskulasi (*cross-pollination*) 7.75%, diikuti hasil dari penyerbukan terbuka (*open-pollination*) 7.32%.

Tabel 1. Percobaan penyerbukan dan keberhasilan reproduksi *S.album*

Kode pohon	Tipe penyerbukan	Jumlah bunga awal (n=1)	Jumlah biji (n=1)	Keberhasilan reproduksi (%) (n=1)
P3-1 (Sumba)	Silang	105	10	9.52
	Sendiri	95	2	2.11
	Terbuka	100	8	8.00
P3-2 (Sumba)	Silang	100	7	7.00
	Sendiri	150	0	0.00
	Terbuka	100	5	5.00
P16-1 (P Timor)	Silang	125	8	6.40
	Sendiri	100	0	0.00
	Terbuka	150	11	7.33
P16-2 (P Timor)	Silang	50	4	8.00
	Sendiri	75	1	1.33
	Terbuka	100	9	9.00

Gambar 3. Rerata keberhasilan reproduksi dilihat dari 3 tipe penyerbukan *S. album* di plot konservasi *ex-situ*, Watusipat, Gunungkidul, Yogyakarta

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa rerata keberhasilan reproduksi penyerbukan silang terkendali dan penyerbukan terbuka/alam tidak jauh berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk proses reproduksi jenis ini sangat tergantung dengan bantuan serangga/agen penyerbukan lain. Di lain pihak, jika dilihat dari hasil penyerbukan sendiri (*self-pollinasi*)

yang hanya membentuk biji sekitar 1%, dapat diindikasikan bahwa dalam sistem reproduksinya, jenis cendana mempunyai level ketidakcocokan berkawin sendiri (*self-incompatibility*) yang sangat tinggi. Hal ini sangat menguntungkan dalam proses reproduksinya, karena dapat diasumsikan bahwa biji-biji yang terbentuk dalam populasi tersebut sebagian besar adalah hasil penyerbukan silang. Lebih lanjut, tingginya keberhasilan reproduksi pada penyerbukan silang maupun penyerbukan alam dibandingkan dengan penyerbukan sendiri menunjukkan bahwa cendana mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk kawin silang. Hal ini juga menandakan bahwa kesuksesan reproduksi jenis ini sangat tergantung pada bantuan manusia ataupun agen penyerbuk.

Secara umum, cendana dalam populasi ini memiliki tingkat keberhasilan reproduksi yang sangat rendah yaitu dibawah 10%. Penelitian terdahulu oleh Rugkhla *dkk.* (1997) pada *S. album* dan *S. spicatum* memperlihatkan hanya 0-30% bunga yang mampu berhasil berkembang menjadi biji; kondisi ini dikarenakan kurangnya penyerbukan, kurangnya jumlah embrio dan kegagalan perkembangan buluh serbuk sari (*pollen tubes*) dalam perkembangan di endosperma. Ma *dkk.* (2006) dalam penelitian *S. album* di China mengemukakan bahwa pembentukan biji dari penyerbukan alam kurang dari 2%. Mempertimbangkan rendahnya tingkat keberhasilan reproduksi jenis ini, maka upaya penyerbukan terkendali maupun strategi pengembangan serangga-serangga penyerbuk dalam populasi ini sangat diperlukan guna menunjang keberhasilan reproduksi.

D. Agen penyerbuk

REML analisis digunakan untuk menganalisis variasi jenis serangga yang mengunjungi bunga, dimana efek tetapnya adalah jenis serangga dan efek randomnya adalah sampel pohon. Hasil observasi memperlihatkan bahwa plot konservasi *ex-situ* cendana di Watusipat, Gunungkidul, Yogyakarta didatangi oleh berbagai macam serangga. Banyaknya jenis dan jumlah serangga yang mengunjungi bunga cendana pada populasi ini mengindikasikan tidak adanya hambatan terjadinya perpindahan polen antar individu pohon yang satu dengan yang lain, sehingga dapat diasumsikan bahwa kemungkinan terjadinya penyerbukan silang sangat tinggi.

Gambar 4. Rerata jumlah serangga yang mengunjungi bunga cendana di plot *konservasi ex-situ*, Watusipat, Gunungkidul, Yogyakarta pada musim bunga 2009

Hasil REML analisis menunjukkan bahwa jenis serangga yang mendatangi bunga cendana berbeda sangat nyata (Wald stat = 60,48; d.f. = 10; Chi pr = <0.001). Variasi jenis serangga tersebut dapat dilihat pada Gambar 4, yang menunjukkan bahwa ada 11 jenis serangga yang mendatangi bunga cendana di plot konservasi *ex-situ*, Watusipat, Gunungkidul, dan serangga terbanyak yang mendatangi bunga selama musim berbunga 2009 adalah lebah madu.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya di India oleh Verendra dan Padmanabha (1996), yang menyebutkan bahwa populasi alam cendana di India didatangi oleh 15 jenis serangga yang berbeda, dengan lebah madu dan semut merupakan serangga pengunjung yang secara regular selalu mendatangi bunga. Studi lainnya menemukan bahwa agen penyerbuk jenis ini bervariasi mulai dari semut, lebah, kupu-kupu, kumbang maupun lalat (Veerendra dan Sujatha 1989; Bhaskar 1992; CAB International 2000).

Gambar 3. Lebah madu (*Apis mellifera*) sebagai agen penyerbuk yang paling dominan mendatangi bunga *S. album* di plot konservasi *ex-situ*, Watusipat, Gunungkidul, Yogyakarta

Serangga mendatangi bunga cendana pada umumnya dikarenakan mencari nektar maupun polen sebagai sumber makanan. Seperti dikemukakan oleh Sedgley dan Griffin (1989), nektar dan polen adalah unsur bunga yang paling bertanggung jawab untuk menarik serangga mengunjungi bunga. Nektar menyediakan energi yang dibutuhkan oleh pengunjung bunga (Kearns dan Inouye 1993), meskipun jumlah nektar bervariasi antar spesies maupun dalam spesies yang sama tergantung pada waktu pengamatan maupun umur pohon (Pacini *dkk.* 2003). Dalam penelitian ini jenis serangga yang sebagian besar berukuran kecil ini sangat dipengaruhi oleh ukuran bunga yang umumnya berasosiasi dengan jumlah nektar yang dihasilkan. Dikarenakan ukuran bunga cendana yang sangat kecil ($\pm 3-4$ mm) maka nektar yang dihasilkan oleh bunga ini juga sangat sedikit, di samping itu polen sebagai daya tarik terhadap serangga dalam bunga cendana jumlahnya sangat sedikit. Hal-hal tersebut diindikasikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi variasi jenis serangga yang tertarik untuk mendatangi bunga dalam suatu populasi. Faegri dan van der Pijl (1979) mengklasifikasikan tipe penyerbukan berdasarkan morfologi bunga. Pohon dengan bunga yang besar, lonjong melingkar, dikategorikan sebagai bunga yang diserbuki dengan bantuan burung; sebaliknya bunga dengan ukuran yang kecil, dikategorikan sebagai bunga yang diserbuki atas bantuan serangga dikarenakan nektar maupun polen bunga-bunga tersebut hanya bisa diakses oleh serangga.

Secara umum, ciri-ciri serangga penyerbuk suatu spesies perlu diketahui dalam rangka mengetahui hubungan antara struktur, morfologi bunga dengan kemampuan reproduksi suatu jenis (Sedgley dan Griffin 1989; Primack dan Inouye 1995; Pandit dan Choudry 2001). Di samping itu, informasi tentang kapasitas suatu hewan atau serangga untuk menyerbuki bunga suatu spesies diperlukan untuk pengelolaan suatu kebun baik untuk tujuan komersial maupun tujuan konservasi (Eldridge *dkk.* 1993; Tibbitts *dkk.* 1997; Moza dan Bhatnagar 2007).

KESIMPULAN

Rendahnya produksi biji pada plot konservasi ex-situ cendana di Watusipat, Gunungkidul mengindikasikan terdapatnya ketidakcocokan berkawin sendiri (*self-incompatibility*). Pembungaan dalam populasi ini tidak terjadi secara serempak dengan tidak lebih dari setengah populasi yang berbunga yang terjadi secara simultan. Ketidakserempakan

pembungaan akan mengurangi jumlah serangga yang mendatangi bunga dalam populasi tersebut, yang akhirnya akan berdampak pada berkurangnya perpindahan polen antar pohon. Lebih lanjut, struktur bunga cendana memungkinkan untuk terjadinya kawin sendiri dikarenakan waktu bunga mekar antara bunga yang satu dengan yang lain dalam satu *inflorescence* tidak serempak, yang tidak memungkinkan kemasakan organ reproduksi dalam waktu yang sama. Dalam rangka meningkatkan keberhasilan reproduksi (meningkatkan jumlah biji yang terbentuk) maka upaya pengelolaan kebun konservasi dengan cara pembangunan sarang-sarang lebah sangat dianjurkan, mengingat sistem penyerbukan cendana yang *outcrossing* (silang) dan bahwa lebah madu dalam plot konservasi ini merupakan agen penyerbuk yang utama.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini sepenuhnya terlaksana atas biaya dari Australian Centre for International Agricultural Research, Canberra, Australia melalui beasiswa John All Wright Returnee Award Program 2009. Dukungan teknis disediakan oleh B2PBPTH Yogyakarta. Tidak lupa terimakasih diucapkan kepada Alin Maryanti, Sukidjan dan Benedictus Subagyo untuk bantuan selama di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagachi SK, HD Kulkarni, 1987. A note on seedling abnormality frequency in the half-sib progenies of *Santalum album*. *Indian Forest*, **113**: 650-651.
- Baskorowati L, 2006. Controlled Pollination Methods for *Melaleuca alternifolia* (Maiden and Betce) Chell. ACIAR Technical Report 63. ACIAR, Canberra.
- Bhaskar V, 1992. Pollination biology and fertilization in *Santalum album* L (Santalaceae). *Flora* **187**: 73 – 74
- Brand JE, 1994. Genotypic variation in *Santalum album* L. *Sandalwood Research Newsletter* **2**: 2 – 4.
- CAB International, 2000. *Santalum album* (sandalwood) Santalaceae. Forest Compendium Global Module. Wallingford UK. CAB Intenational, diunduh dari http://www.hear.org/pier/wra/pacific/santalum_album_htmlwra.htm pada tanggal 12 Desember 2010

CITES, diunduh dari <http://www.cites.org> pada tanggal 12 Desember 2010

- Doran CJ, JW Turnbull (eds.), 1997. Australian trees and shrubs: species for land rehabilitation and farm planting in the tropics. *ACIAR monograph* No. 24, 384 p.
- Eldridge K, J Davidson, C Harwood, and G van Wyk, 1993. *Eucalypt Domestication and Breeding*. Oxford University Press, Oxford, 322 p.
- Faegri K and L van der Pijl, 1979. *The Principles of Pollination Ecology*. Third edition, Pergamon Press, Oxford, 244 p.
- Fox JED, JE Brand, DR Barret, E Markhum, 1995. Genetic variation in *Santalum album* in Timor. In: *Sandalwood Seed Nursery and Plantation Technology*, eds Gjerum L, Fox JED, Erhart L, pp. 93 - 110. Food and Agriculture Organization (FAO), Suva.
- Florence RG, 1964. A comparative study of flowering and seed production in six blackbutt (*Eucalyptus pilularis* Sm.) forest stands. *Australian Forestry* 28: 28 -33.
- Friedel MH, DJ Nelson, AD Sparrow, JE Kinloch, and JR Maconochie, 1993. What induces central Australian arid zone trees and shrubs to flower and fruit? *Australian Journal of Botany* 41: 307 – 319.
- Jyothi PV, JB Alturi, RC Subba, 1991. Pollination ecology of *Santalum album* (Santalaceae). *Tropical Ecology* 32: 92 – 104.
- Kearns CA, and DW Inouye, 1993. *Techniques for Pollination Biologist*. University Press of Colorado, Colorado.
- Keatley MR and L Hudson, 1998. The influence of fruit and bud volumes on eucalypt flowering-an explanatory analysis, *Australian Journal of Botany* 46: 281 – 304.
- Ma G, E Bunn, J Zhang, G Wu, 2006. Evidence of Dichogamy in *Santalum album* L. *Journal of Integrative Plant Biology* 48 (3): 300 – 306.
- Moza MK and AK Bhatnagar., 2007. Plant reproductive biology studies crucial for conservation. *Current Science*, 92:9.
- Pacini E, M Nepi, and JL Vespisrini, 2003. Nectar biodiversity: a short review. *Plant Systematics and Evolution* 283: 7 – 21.
- Pandit S, and BC Choudhury, 2001. Factors affecting pollinator visitation and reproductive success in *Sonneratia caseolaris* and *Aegiceras corniculatum* in a mangrove forest in India. *Journal of Tropical Ecology* 17: 431 – 447.
- Prasetyaningtyas M, 2005. Studi fenologi pembungaan dan penyerbukan *Santalum album* Linn. Master Thesis Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.Unpublished.

- Primack RB, and DW Inouye, 1993. Factors effecting pollination visitation rates: A biogeographic comparison. *Current Science* **65**: 257 – 262.
- Rugkhla A, JA McComb, MGK Jones, 1997. Intra- and inter-specific pollination of *Santalum spicatum* and *S. album*. *Australian Journal of Botany*, **45**: 1083-1095.
- Sedgley M, and AR Griffin, 1989. *Sexual Reproduction of Tree Crops*. Academic Press, London.
- Sedgley M, WC Yong, V Newman, J Harbard, RM Smith, KK Ga,n and A Tadjudin, 1991. Phenology of *Acacia mangium* and *Acacia auriculiformis* in Australia and Malaysia, ACIAR Workshop on Hybridization and Vegetative Propagation of Tropical Acacias, July 1 – 4 Canberra.
- Smith-Ramirez C, and JJ Armesto, 1994. Flowering and fruiting in the temperate rainforest of Chiloé, Chile- ecologies and climatic constraints. *Journal of Ecology* **82**: 353 – 365.
- Srimanthi RA, 1983. *Breeding of sandal*. A tropical hardwood tree. Current status and future prospects. ISTS Symposium on Advance in tree spesies. Forest Research Institure, Dehra Dun India.
- Srimanthi RA, and HC Nagaveni, 1995. Sandal seed viability, germination and storage. Recent advances in research and management of Sandal (*Santalum album*) in India. Edited by RA Srimanthi, HD Kulkani and KR Venkatesan. Associated Publishing Co, New Delhi, pp. 77 - 87.
- Suma TB, M Balasundaran, 2003. Isozyme variation in five provenances of *Santalum album* in India. *Australian Journal of Botany*, **51**: 243 – 249.
- Tibbits WN, DB Boomsma, and S Jarvis, 1997. Distribution, biology, genetics and improvement programs for *Eucalyptus globulus* and *E. nitens* around the world. In: *Proceeding of the 24th Southern Forest Tree Improvement Conference*, June 9 – 12, eds T. White, D. Huber and G. Powell. Southern Tree Improvement Committee, Orlando, Florida, pp. 1 – 15.
- Veerendra HCS, and HSA Padmanaba, 1996. The breeding system in sandal (*Santalum álbun* L.). *Silvae Genetica*, **45**: 188 – 190.
- Veerendra HCS, dan M Sujatha, 1989. Pollination studies in *Santalum álbun* L. *Current Science*, **58**: 629 – 630.