**PEMBUNGAAN DAN PEMBUAHAN *Melaleuca cajuputi* subsp. *cajuputi* Powell DI
KEBUN BENIH SEMAI PALIYAN, GUNUNGKIDUL, YOGYAKARTA**

*Flowering and Fruiting Study of Melaleuca cajuputi subsp. cajuputi Powell at Paliyan
Seedling Seed Orchard, Gunungkidul, Yogyakarta*

L. Baskorowati¹, R. Umiyati², N. Kartikawati¹, A. Rimbawanto¹ dan M. Susanto¹

¹Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta

Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 15, Purwobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta 55582

Telp. (0274) 895954, 896080, Fax. (0274) 896080

²Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada

Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, Yogyakarta 55281

ABSTRACT

Observation on flowering and fruiting phenology were undertaken at M. cajuputi subsp. cajuputi seedling seed orchard in Paliyan, Gunungkidul from February to October 2002. Seed viability was tested out at Forest Biotechnology and Tree Improvement Research Institute, Yogyakarta. The objectives of this study are: (1) to identify the flowering time, (2) to determine the time of buds development and (3) to observe the reproductive success and the number of germination seeds per capsule of open pollinated seeds. The study showed that peak flowering of M. cajuputi subsp. cajuputi at Paliyan seedling seed orchard occurred in March; several trees at this population also flowered during February to June. The time for buds initiation to capsules maturity took on average 277 days. Three months after fertilisation, the capsules were ready to harvest. Mean number of reproductive success of open pollinated seeds is 3.6%. The mean number of seed viability varied between provenance range from 6 to 32 seeds/capsule.

Key Words : Flowering, Fruiting, *M. cajuputi* subsp. *cajuputi*, Open pollination

ABSTRAK

Informasi yang menyeluruh mengenai pembungaan dan pembuahan *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* sangat diperlukan dalam rangka untuk menunjang kegiatan-kegiatan pemuliaan pohon tingkat lanjut, khususnya kontrol polinasi. Studi pembungaan dan pembuahan *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Oktober 2002 di kebun benih semai Paliyan, Gunungkidul. Sedangkan kegiatan pengujian viabilitas biji dilakukan pada bulan Maret 2003 di laboratorium benih Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan, Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui waktu berbunga pohon-pohon *M. cajuputi* subsp. *cajuputi*, (2) mengetahui waktu dan tahap-tahap perkembangan organ generatif *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* serta (3) mengetahui nilai keberhasilan reproduksi dan jumlah biji yang mampu berkecambah

per kapsul dari hasil perkawinan alam *M. cajuputi* subsp. *cajuputi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa puncak perbungaan pada tegakan kebun benih semai di Paliyan terjadi pada bulan Maret, meskipun demikian, ditemukan pohon-pohon yang berbunga selama bulan Februari sampai dengan Juni. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk perkembangan mulai dari inisiasi kuncup bunga sampai dengan masakny kapsul adalah 277 hari. Kapsul sudah masak dan siap dipanen tiga bulan setelah pembuahan. Nilai rata-rata keberhasilan reproduksi *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* menunjukkan 3,6%. Rerata jumlah biji yang mampu berkecambah bervariasi antar provenan, dengan kisaran mulai dari 6 sampai 32 biji per kapsul.

Kata Kunci : Pembungaan, Pembuahan, *M. cajuputi* subsp. *cajuputi*, Penyerbukan alami

I. PENDAHULUAN

Melaleuca cajuputi subsp. *cajuputi* merupakan salah satu dari berbagai jenis spesies *Melaleuca* yang menghasilkan minyak yang dikenal dengan nama minyak kayu putih. *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* menjadi sangat berharga karena minyak yang dihasilkan mengandung 1,8 cineol (15-60%) yang banyak digunakan untuk industri farmasi (Brophy dan Doran, 1996). Sebaran alam *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* di Indonesia terkonsentrasi di daerah Pulau Maluku, Pulau Buru dan Pulau Seram dan juga ditemukan di daerah utara dan daerah barat Australia, serta bagian selatan Papua New Guinea (Gunn *et al.*, 1996).

Di Indonesia, produksi minyak kayu putih dari hutan alam dihasilkan oleh penduduk sekitar hutan, khususnya di Kepulauan Maluku. Dalam skala industri, minyak kayu putih dihasilkan di hutan tanaman di Jawa yang dikelola oleh Perum Perhutani dan Dinas Kehutanan Propinsi DI Yogyakarta. Produktivitas tanaman kayu putih ini tergolong rendah (rendemen minyak dibawah 1%) karena mutu genetik tanamannya rendah.

Usaha meningkatkan mutu genetik tanaman kayu putih melalui pemuliaan sudah dilakukan oleh Departemen Kehutanan bekerjasama dengan CSIRO sejak tahun 1998 yang dimulai dengan kegiatan eksplorasi, pembuatan kebun benih semai, kebun benih klon dan mengembangkan pohon induk yang baik dengan perkawinan buatan (Rimbawanto, 2000).

Untuk menunjang kegiatan pemuliaan, khususnya pekerjaan perkawinan buatan antar pohon induk, informasi mengenai perkembangan organ reproduktif suatu jenis sangat diperlukan (Sedgley dan Griffin, 1989; Owens *et al.*, 1991). Sebagai contoh, informasi perkembangan kuncup menjadi calon bunga, waktu perbungaan dan waktu menjadi buah sangat menentukan keberhasilan sebuah kegiatan perkawinan antar pohon. Lebih lanjut informasi tentang periode perbungaan dan waktu perbungaan sangat penting untuk memperkirakan keberhasilan reproduksi. Seperti yang diungkapkan oleh House (1997) bahwa keberhasilan reproduksi dapat diprediksi dengan mengetahui proses pembungaan seperti musim, waktu, periode, dan juga

intensitas dari pembungaan dan pembuahan suatu spesies.

Waktu, frekuensi dan intensitas pembungaan bervariasi menurut jenis (Smith-Ramirez dan Armesto, 1994). Adanya variasi pembungaan umumnya disebabkan oleh perbedaan genetik antar induk (Eldgridge *et al.*, 1993; Friedel *et al.*, 1993) dan juga disebabkan oleh faktor-faktor biotik dan abiotik.

Waktu, periode dan intensitas pembungaan pada genus *Melaleuca* sangat bervariasi antar spesies dan antar tempat tumbuh (L. Craven, komunikasi pribadi, 14 Maret 2006). Sebagai contoh, Pembungaan pada *M. alternifolia* di daerah Australia (NSW) hanya terjadi sekali dalam setahun pada bulan Oktober sampai November dengan puncak perbungaan bulan November (Baskorowati, 2008). Sedangkan Quinn dan Barlow (1989) menyatakan bahwa *M. alternifolia* di daerah sebaran alaminya berbunga pada bulan Oktober sampai November dan kadang-kadang berlanjut sampai dengan bulan Februari.

Untuk *M. cajuputi*, seperti dilaporkan oleh Rimbawanto (2000) bahwa pembungaan khususnya di daerah Jawa dapat terjadi hampir sepanjang tahun. Sedangkan Leksono (1996) menyatakan bahwa pembungaan *M. cajuputi* di sebaran alaminya dimulai sejak bulan Juli. Perbedaan waktu pembungaan *M. cajuputi* ditulis juga oleh Schmidt dan Thuy (2004) di Vietnam Utara yang terjadi pada bulan Juni sampai Oktober.

Mengingat pentingnya mengetahui waktu, periode pembungaan dan tahap-tahap perkembangan organ reproduktif pada *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* untuk menunjang kegiatan pemuliaan

pohon, maka studi ini dilakukan. Lebih lanjut, studi ini bertujuan untuk: (1) mengetahui waktu berbunga dan berbuah *M. cajuputi* subsp. *cajuputi*, (2) mengetahui tahap-tahap perkembangan organ reproduktif *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* dan (3) mengetahui nilai keberhasilan reproduksi dan jumlah biji yang mampu berkecambah per kapsul dari hasil perkawinan alam *M. cajuputi* subsp. *cajuputi*.

II. BAHAN DAN METODE

A. Bahan Penelitian

Penelitian dilakukan pada 5 provenan di kebun benih semai *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* yang berumur 3 tahun 11 bulan, berlokasi di Paliyan, Gunung Kidul, Yogyakarta (8° LS dan 110° 29' 59" BT) pada bulan Februari sampai Juli 2002. Kelima provenan yang diteliti adalah: provenan Pulau Buru (Prov A), Pulau Seram (Prov B), Pulau Ambon (Prov C), Wangi Northern Australia (Prov D), dan Beagle Bay Western Australia (Prov E). Informasi tentang ketinggian tempat tumbuh, tekstur tanah dan letak geografis provenan-pronenan yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Informasi provenans yang digunakan pada studi pembungaan dan pembuahan *M. Cajuputi* di kebun benih Paliyan, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta

Provenan	Lokasi	Ketinggian	Tekstur tanah	pH	Letak geografis
Buru (A)	Masarete, Pulau Buru, Maluku Indonesia	20 m dpl	Clay loam clay	5.5-6.5	03°22'38" LS dan 127°08'12" BT
Seram (B)	Pelita Jaya, Pulau Seram, Propinsi Maluku Indonesia	100 m dpl	Sandy clay loam clay loam	5.5-6.5	03°03'00" LS dan 128°08'00" BT
Ambon (C)	Suli, Pulau Ambon, Propinsi Maluku Indonesia	60 m dpl	Clay loam	5.5-6.5	03°37'02" LS dan 128°18'40" BT
Northern Territory Australia (D)	Wangi	30 m dpl	Sandy cly loam	5.5-6.5	13°09' " LS dan 130°35' " BT
Western Australia (E)	Beagle Bay	10 m dpl	Sandy cly loam	5.5-6.5	16°58'33" LS dan 122°40'04" BT

B. Metode Penelitian

b.1. Pengamatan

1. Pengamatan waktu berbunga dan berbuah serta intensitas perbungaan *M. cajuputi* subsp. *cajuputi*. Pengamatan dilakukan dengan mengamati jumlah bunga yang belum mekar, bunga mekar, buah muda dan buah tua pada masing-masing sampel pohon. Jumlah ulangan masing-masing provenan (sampel pohon) bervariasi tergantung pada tersedianya pohon yang berbunga. Jumlah ulangan provenan A = 5 pohon, provenan B = 4 pohon, provenan C, D = 1 pohon dan provenan E = 2 pohon. Masing-masing sampel pohon diberi skor berdasarkan metode yang dikembangkan oleh Sedgley dan Griffin (1989). Skor tersebut terdiri dari 4 tingkat dengan nilai: 0 = tidak ada, 1 = sedikit, 2 = sedang, dan 3 = banyak.
2. Pengamatan perkembangan organ generatif terutama terhadap munculnya tanda-tanda perbungaan, sampai dengan menjadi bunga dan perkembangan menjadi buah. Peng-

amatan dilakukan setiap hari untuk mengetahui jangka waktu dan lamanya masing-masing tahap perkembangan bunga maupun buah. Observasi terhadap panjang waktu berlangsungnya tahap perkembangan organ generatif dimulai sejak tahap inisiasi bunga, yaitu dimana tunas reproduktif tampak secara makroskopis sampai buah dan biji masak.

3. Pengamatan terhadap keberhasilan reproduksi hasil penyerbukan alam. Untuk tujuan ini pengamatan dilakukan terhadap pohon seperti yang disebutkan pada bahan penelitian dengan mengambil contoh bunga pada sampel pohon secara acak. Pada masing-masing sampel, kemudian dilakukan penghitungan sebagai berikut: a. jumlah bunga teoritis (F1), b. jumlah bunga realistis (Fr), c. jumlah bunga realistis yang berhasil diproduksi, d. jumlah biji yang mampu berkecambah (S) dan e. jumlah ovul (O).

Keberhasilan reproduksi kemudian dihitung menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Weins *et al.*, (1987): $RS = (Fr/F1) \times (S/O) \times 100\%$

Pengamatan terhadap perkecambahan biji *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* dilakukan di laboratorium benih B2PBPTH pada bulan Maret 2003. Kapsul yang berasal dari penyerbukan alam diunduh dari pohon-pohon yang berasal dari 5 provenan di kebun benih semai Paliyan. Masing-masing kapsul kemudian dikeluarkan bijinya, dan biji ditabur dalam petridis yang sudah dialasi *Whatman paper* dan diberi aquades. Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah biji kecambah dari hari pertama sampai dengan ke sepuluh.

b.2. Analisis data

Hasil pengamatan dianalisa dengan menggunakan analisis varian metode rancangan acak tidak lengkap dengan model matematis: $Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \Sigma_{ij}$ (Gomez dan Gomez, 1995).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengamatan waktu berbunga serta intensitas perbungaan *M. cajuputi* subsp. *cajuputi*.

Hasil penelitian mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2002 menunjukkan bahwa pohon-pohon *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* di kebun benih semai Paliyan Gunungkidul mempunyai waktu berbunga pada bulan Februari - Mei dengan puncak perbungaan pada bulan Maret. Perbungaan berkurang mulai Juni dan tidak akan dijumpai bunga pada bulan Juli, meskipun ada beberapa pohon yang berbunga hampir sepanjang waktu penelitian (lihat Gambar 1). Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa intensitas berbunga antar provenan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata (lihat Tabel 2).

Meskipun secara statistik intensitas pembungaan antar provenan pada bulan-bulan pengamatan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata, tetapi dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa pohon-pohon dari provenan A (Pulau Buru) mempunyai kemampuan berbunga yang lebih baik dibandingkan dengan pohon-pohon

Gambar 1. Intensitas pembungaan *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* pada bulan Februari sampai Juli tahun 2002 di kebun benih semai Paliyan Gunungkidul. Tanda pagar menunjukkan nilai SEM (*standard error of means*)

Tabel 2. Perbedaan intensitas pembungaan 5 provenan *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* yang terdapat di kebun benih semai Paliyan Gunungkidul

Sumber Variasi	Derajat Bebas	Jumlah Kuadrat	Rerata Kuadrat	F hitung	F tabel
Provenan	4	0.23	0.058	0.16	3.48 ^{ns}
Error	10	3.52	0.352		
Total	14	3.75			

provenan yang lain. Adanya perbedaan kemampuan berbunga suatu jenis dalam tempat tumbuh yang sama umumnya disebabkan oleh faktor genetik dari pohon induknya (Eldridge *et al.*, 1993; Friedel *et al.*, 1993) serta adanya kesamaan tempat tumbuh baik jenis tanah, maupun kondisi iklimnya dengan populasi alamnya. Dalam hal ini diduga kesamaan jenis tanah merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan berbunga pada provenan A dibandingkan dengan provenan yang lain. Hal tersebut disebabkan karena provenan A berasal dari habitat dengan jenis tanah dengan tekstur *clay loam clay* (Susanto, 2002) dan berwarna coklat kemerahan yang mempunyai kesamaan jenis tanah dengan kebun benih Paliyan yaitu *clay*. Sedangkan provenan B, D, E berasal dari habitat dengan jenis tanah yang *sandy clay loam* dan provenan C berasal dari habitat dengan jenis tanah dengan tekstur *clay loam* dengan warna tanah merah keabu-abuan.

B. Pengamatan tahap-tahap perkembangan organ generatif *M. cajuputi* subsp. *cajuputi*

Penelitian terhadap panjang waktu berlangsungnya masing-masing tahap perkembangan organ generatif dimulai sejak tahap inisiasi bunga, yaitu saat dimana tunas reproduktif untuk pertama kalinya tampak secara makroskopis sampai buah dan biji masak.

Dalam studi ini, pohon dari 5 provenan diamati dan dibandingkan panjang waktu berlangsungnya tahap perkembangan organ generatif antar provenan *M. cajuputi* subsp. *cajuputi*. Secara umum panjang waktu antara inisiasi bunga sampai dengan saat mekarnya bunga bervariasi karena dipengaruhi oleh pola pertumbuhan pohon dan kisaran iklim tempat tumbuh suatu jenis (Sedgley dan Griffin, 1989). Dengan demikian informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh perbedaan provenan terhadap waktu pembuahan dan pembungaan.

Tabel 3. Perbedaan panjang waktu berlangsungnya tahap perkembangan organ generatif 5 provenans *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* yang terdapat di kebun benih semai Paliyan Gunungkidul

Sumber Variasi	Derajat Bebas	Jumlah Kuadrat	Rerata Kuadrat	F hitung	F tabel
Provenan	4	3270.23	817.56	2.86	5.19 ^{ns}
Error	5	1430.67	286.13		
Total	9	4700.90			

Hasil analisis varian menunjukkan bahwa lamanya waktu perkembangan pembuahan dan pembungaan provenan-provenan *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* di kebun benih semai Paliyan tidak menunjukkan perbedaan nyata (lihat Tabel 3).

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa panjang waktu perkembangan organ-organ generatif *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* mempunyai kisaran waktu yang sama, yang dapat dijadikan

acuan pengamatan ataupun penelitian yang akan dilakukan tahun-tahun berikutnya. Informasi ini juga sangat bermanfaat dalam menentukan waktu yang tepat untuk melakukan kontrol polinasi ataupun pengamatan pembungaan lainnya, sehingga dapat menghemat biaya dan waktu pengecekan di lapangan.

Hasil pengamatan tahap-tahap perkembangan organ generatif dari provenan-provenan yang diteliti secara ringkas disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Rata-rata waktu perkembangan organ generatif pada 5 provenans *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* di kebun benih semai Paliyan Gunungkidul

Tahap perkembangan	Rata-rata $\pm$ standar deviasi	Satuan pengamatan	Waktu perkembangan
<i>I. Tahap inisiasi bunga</i>			
a. Terbentuk tunas reproduktif hingga terdiferensiasi membentuk tangkai dan tunas	26.7 ± 6.4	Hari	Februari
b. Pembengkakan tunas hingga mencapai maksimal	17.5 ± 3.9	Hari	Awal Maret
c. Tangkai perbungaan (<i>inflorescence</i>) mengalami perkembangan memanjang	11.6 ± 1.6	Hari	Akhir Maret
<i>II. Tahap perkembangan kuncup bunga menuju anthesis</i>			
d. Pelindung bunga (<i>bractea</i>) mulai mengering dan rontok	36.1 ± 10.9	Hari	April
e. Kuncup bunga (<i>buds</i>) mengalami perkembangan hingga maksimal	22.3 ± 3.9	Hari	Awal Mei
f. Mahkota bunga (<i>corolla</i>) dalam kuncup bunga mulai membuka (<i>anthesis</i>)	1.2 ± 0.4	Hari	Akhir Mei
g. Semua anthers dalam satu kuncup bunga membuka	189.9 ± 26.7	Menit	Juni
<i>III. Tahap penyerbukan dan pembuahan (fertilisation)</i>			
h. Bunga mengalami penyerbukan dan pembuahan	4.4 ± 1.9	Hari	Juni, Juli
i. Perubahan morfologis dari bunga menjadi buah	9.7 ± 2.3	Hari	Juli, Agustus
<i>IV. Tahap perkembangan buah menuju kemasakan</i>			
j. Buah mengalami perkembangan ditandai dengan pertambahan diameter dan perubahan warna dari hijau ke coklat gelap	26.9 ± 6.9	Hari	September
k. Buah tidak mengalami perubahan warna dan ukuran	14.6 ± 3.4	Hari	Oktober
l. Buah masak ditandai dengan pecahnya kulit buah (<i>carpel</i>) sehingga biji berhamburan	104.1 ± 11.4	Hari	November

Secara umum, tahap perkembangan organ generatif *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* di kebun benih semai Paliyan Gunungkidul terbagi dalam empat tahap yaitu: (1) tahap inisiasi bunga atau *pre-anthesis*, (2) tahap pembungaan atau *anthesis*, (3) tahap penyerbukan dan pembuahan atau fertilisasi dan (4) tahap perkembangan buah menuju kemasakan. Perubahan morfologi atau perubahan fisik organ generatif *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

1. Tahap inisiasi bunga

Tahap inisiasi bunga merupakan masa transisi perubahan organ vegetatif pada kuncup terminal atau aksial meristem menjadi organ reproduktif (Owens, 1991). Tahap inisiasi bunga ini terbagi dalam tiga fase seperti yang tertera dalam Tabel 2, dimana waktu pertumbuhan dari terbentuknya tunas reproduktif hingga *inflorescences* atau tangkai perbungaan mengalami perpanjangan dan dapat dilihat secara kasat mata adalah 56 hari. Pada tahap inisiasi bunga ini, kuncup bunga atau *buds* berbentuk bulir berwarna hijau akan tumbuh pada tangkai perbungaan. Kuncup-kuncup bunga itu akan tersusun spiral pada tangkai pembungaan. Pertumbuhan kuncup-kuncup bunga tersebut bersifat *acropetally* atau tumbuh dari bawah ke atas. Tiap kuncup bunga mempunyai pelindung bunga yang berwarna hijau.

2. Tahap perkembangan kuncup bunga menuju *anthesis*

Tahap perkembangan ini terbagi dalam 4 fase (lihat Tabel 2), dimana pada fase pertama, seiring dengan perkembangan kuncup bunga, pelindung bunga yang terletak di axil tiap kuncup bunga

akan mengering dan berubah warna menjadi coklat dan akhirnya rontok. Waktu rata-rata yang digunakan sampai rontoknya pelindung bunga adalah 37 hari.

Dalam perkembangan lebih lanjut, kuncup bunga akan membengkak sehingga terjadilah pertambahan ukuran diameter kuncup. Warna kuncup bunga juga akan berubah dari hijau ke putih kekuningan. Pembengkakan ini menunjukkan bahwa di dalam kuncup bunga sedang berlangsung proses pembentukan dan perkembangan ovarium serta alat reproduksi yaitu putik dan benang sari (Sedgley dan Griffin, 1989). Pembengkakan kuncup akan mencapai maksimum pada hari ke-115 (lihat Gambar 2). Kuncup bunga tersebut akan membuka (*anthesis*) dalam waktu kurang lebih 22-24 jam.

Pada tahap *anthesis* ini, mahkota bunga (*corolla*) akan membuka terlebih dahulu, setelah itu diikuti oleh keluarnya tangkai kepala sari (*filament*). Tangkai kepala sari tersebut akan keluar semua dan bunga menjadi sangat mekar kurang lebih satu hari setelah kelopak bunga membuka. Gambar 3 memperlihatkan kuncup bunga yang sudah mencapai kemekaran yang maksimal. Ketika dalam tahap pembukaan bunga, organ reproduksi betina atau kepala putik akan terlihat membengkok yang menandakan organ ini belum siap untuk diserbuki. Sedangkan organ reproduksi jantan yaitu serbuk sari (*pollen*) yang terdapat dalam kepala sari (*anther*) juga belum membuka atau pecah, sehingga dalam tahap ini organ reproduktif belum siap untuk proses penyerbukan. Bunga *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* adalah *bisexual*, artinya dalam satu bunga terdapat organ reproduktif jantan dan organ reproduktif betina.

Gambar 2. Kuncup-kuncup bunga (*buds*) *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* yang sudah mengalami pembengkakan maksimal pada hari ke-115 dan kuncup bunga siap untuk membuka (Foto oleh: Kartikawati 2004)

Gambar 3. Kuncup bunga *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* yang sudah mekar (tahap *anthesis*) (Foto oleh: Kartikawati 2004)

3. Tahap penyerbukan dan pembuahan

Dalam studi ini, tahap penyerbukan atau bertemunya benang sari (*pollen*) dengan kepala putik (*stigma*) *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* terjadi dua hari setelah *anthesis*, dimana *stigma* sudah menunjukkan reseptif dan *pollen* sudah terhambur atau keluar dari *anthers*.

Pada umumnya *pollen* *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* lebih dahulu mengalami kemasakan atau kesiapan dibandingkan dengan *stigma*. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kepala putik

mencapai masa reseptif dua hari setelah bunga mekar atau hari ketiga *anthesis*, sedangkan *anther* sudah mulai pecah pada hari pertama atau kedua *anthesis*. Pengamatan ini menunjukkan bahwa bunga *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* mempunyai sifat *protandrous dichogamy* atau tercapainya reseptif pada alat reproduksi jantan dan betina tidak dalam waktu yang bersamaan.

Secara mikroskopis reseptifnya kepala putik dapat diketahui dari melimpahnya sekresi ekstraseluler pada permukaan kepala putik (contoh Gambar 4A). Sekresi ekstraseluler ini adalah medium yang berfungsi untuk menangkap butiran tepung sari, serta merupakan penentu keberhasilan pembentukan buluh tepung sari yang akan membawa benang sari yang sudah berkecambah (*pollen grain*) menuju ke *ovary* (Sedgley dan Griffin, 1989).

Pada *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* masakannya kepala putik umumnya ditandai dengan ciri fisik tegaknya kepala putik, membesarnya diameter kepala putik, dan keluarnya cairan yang berwarna bening sehingga kepala putik terlihat kuning terang dan mengkilap.

Gambar 4. A. Scanning mikroskop elektron kepala putik *M. alternifolia* yang memperlihatkan sekresi ekstraseluler pada kepala putik B. Scanning mikroskop elektron *anther* *M. alternifolia* yang memperlihatkan pecahnya *anther* dan keluarnya *pollen* (Foto oleh: Baskorowati 2005)

Sedangkan kemasakan serbuk sari (*pollen*) ditandai dengan perubahan warna *anther* dari putih ke kuning terang atau kecoklatan yang diikuti dengan pecahnya *anthers* yang akan menghamburkan serbuk sari (contoh Gambar 4B).

Tipe kepala putik dan tahap perkembangan reseptifitas pada *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* adalah sama dengan tipe kepala putik jenis Myrtaceae pada umumnya. Menurut klasifikasi Heslop-Harrison dan Shivana (1977) kepala putik (*stigma*) umumnya mempunyai sifat basah atau mengeluarkan cairan kental yang menyertai kemasakan kepala putik. Pada Myrtaceae, bertambahnya panjang putik juga umum dijumpai sesudah *anthesis* dan bersamaan dengan waktu reseptifitasnya kepala putik (Sanzol dan Herrero, 2001). Hal ini juga dijumpai pada beberapa spesies seperti *M. alternifolia* (Baskorowati, 2008) dan *Eucalyptus regnans* (Griffin dan Hand, 1979). Moncur dan Boland (1989) menduga bahwa perpanjangan putik merupakan suatu mekanisme untuk memperlancar terjadinya *out-crossing* dengan menjauhkan *anther* dan kepala putik pada tahap perkembangan organ betina.

Tahap pembuahan atau fertilisasi ditandai dengan bertemunya *pollen grain* di dalam *ovule*. Dalam studi ini waktu kapan sebenarnya fertilisasi terjadi tidak diamati dikarenakan oleh keterbatasan waktu, sarana dan biaya. Meskipun demikian, informasi dari studi *pollen tube* menggunakan mikroskop *fluorescence* pada *M. alternifolia* menyebutkan bahwa fertilisasi akan terjadi pada hari keempat setelah penyerbukan (Baskorowati, 2008).

4. Tahap perkembangan buah menuju kemasakan

Bersamaan dengan proses pembuahan, bunga yang sudah mekar akan menggugurkan benang sari dan putiknya. Satu minggu setelah penyerbukan, benang sari dan putik pada umumnya sudah gugur, sehingga hanya struktur buah yang masih berwarna hijau saja yang masih melekat pada tangkai perbungaan (*inflorescence*). Pada hari kesepuluh sesudah pembuahan (atau kurang lebih 2 minggu dari waktu berbunga) struktur buah akan berubah warna menjadi hijau kemerahan. Pada tahap ini, struktur buah sudah terbentuk dengan lengkap; namun ukuran buah masih sama dengan ukuran kuncup bunga semula. Buah *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* berbentuk kapsul yang tersusun dari 3 carpel dan biji-biji terdapat didalam carpel. Buah baru akan mengalami pertambahan diameter 27 hari kemudian, ditandai dengan pembesaran embrio.

Setelah biji terbentuk dengan sempurna maka mulailah proses perkembangan biji menuju kemasakan. Perkembangan biji berpengaruh terhadap perkembangan kapsul yang melingkupinya dan karena itulah proses yang sedang terjadi dalam biji dapat terdeteksi dengan mengamati morfologi kapsul (Schmidt, 2000).

Kapsul *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* umumnya sudah masak pada hari ke-95 (atau 3 bulan setelah *anthers* dan putik gugur, yang ditandai dengan warna hitam kecoklatan). Menurut pengamatan di lapangan kapsul akan tetap tidak menghamburkan bijinya sampai 6 bulan setelah fertilisasi jika kapsul tersebut masih berada dalam tangkai pohon. Sebaliknya jika kapsul diunduh pada waktu 3 atau 4 bulan setelah

pembuahan, kapsul akan segera pecah dan menghamburkan biji-bijian. Gambar 5 menunjukkan kapsul *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* yang sudah siap dipetik.

Gambar 5. Kapsul-kapsul *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* yang sudah menunjukkan kemasakan dan siap untuk dipanen
(Foto oleh: Kartikawati 2004)

C. Pengamatan terhadap nilai keberhasilan reproduksi dan viabilitas biji *M. cajuputi* subsp. *cajuputi*

1. Nilai keberhasilan reproduksi

Nilai keberhasilan reproduksi (RS) penyerbukan alam provenan-provenan *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* menunjukkan rata-rata sebesar 3,6% yang memperlihatkan bahwa nilai RS ini

rendah menurut klasifikasi Owens *et al.*, 1992. Hasil nilai RS secara lengkap disajikan pada Tabel 5.

Nilai RS yang rendah pada umumnya menunjukkan kecenderungan suatu jenis untuk melakukan *outcrossing* (Owens *et al.*, 1992). Lebih lanjut disebutkan pula bahwa umumnya jenis-jenis pohon yang mempunyai kecenderungan *outcrossing* mempunyai nilai RS yang rendah yaitu dibawah 30%. Oleh karena itu jenis *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* yang mempunyai nilai RS 3,6% dapat dikategorikan jenis yang mekanisme penyerbukannya cenderung *outcrossing*. Hasil ini didukung oleh penelitian pada jenis *M. alternifolia* yang menunjukkan tingkat *outcrossing* yang sangat tinggi (Butcher *et al.*, 1992; Rosseto *et al.*, 1999). Tingginya tingkat *outcrossing* diduga suatu mekanisme seperti *self-incompatibility* atau seleksi menolak kawin kerabat beroperasi untuk melindungi dari terjadinya perkawinan antar kerabat (Butcher *et al.*, 1992; Beardsell *et al.*, 1993).

Tabel 5. Keberhasilan reproduksi penyerbukan alam 5 provenan *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* di kebun benih semai Paliyan, Gunungkidul

Provenan	Ulangan	Jumlah bunga teoritis	Jumlah bunga realistik	Jumlah biji viabel	Jumlah ovule	Reproduksi sukses
A	A1	53	9	16	140	1.94%
	A2	33	10	5	140	1.07%
	A3	27	15	22	140	8.80%
	A4	36	16	1	140	0.31%
	A5	37	5	6	140	0.60%
B	B1	33	13	23	140	6.40%
	B2	40	9	6	140	0.96%
	B3	30	3	1	140	0.07%
	B4	44	16	10	140	2.57%
C	C1	45	31	6	140	2.96%
D	D1	33	27	11	140	6.44%
E	E1	35	27	16	140	8.80%
	E2	42	9	39	140	5.85%

2. Viabilitas biji *M. cajuputi* subsp. *cajuputi*

Hasil perkecambahan biji-biji yang diamati sampai dengan hari kesepuluh menunjukkan adanya variasi dalam hal jumlah biji tiap kapsul pada masing-masing provenan. Variasi jumlah biji yang mampu berkecambah (*viable*) per kapsul pada *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* dapat dilihat pada Gambar 6. Dari Gambar 6 dapat diketahui bahwa biji yang berasal dari Provenan E (daerah barat Australia) mempunyai jumlah biji *viable* per kapsul yang paling banyak dibandingkan dengan provenan-provenan yang lain. Kemampuan biji untuk berkecambah pada umumnya dipengaruhi oleh kesehatan dari biji tersebut, yang pada umumnya diindikasikan dengan bentuk morfologis dari biji.

Pada tiap-tiap kapsul *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* terdiri dari campuran biji-biji sempurna dan "chaf" atau kotoran yang berasal dari *ovule* yang tidak terbuahi pada proses pembuahan. Pada biji-biji yang terbentuk dari proses pembuahan yang sempurna, biji pada umumnya berbentuk padat dan berwarna coklat kehitam-hitaman. Sedangkan biji yang tidak terbentuk sempurna atau gagal dalam proses pembuahan-

nya umumnya berbentuk agak kempes dan berwarna coklat muda.

Ketidakberhasilan proses pembuahan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: tidak tersedianya polen waktu terjadi pembuahan, tidak adanya agen atau polinator yang membantu proses pembuahan dan juga karena mekanisme *self-incompatibility*.

Pada penelitian ini, bervariasinya jumlah biji yang *viable* antar provenan diduga disebabkan karena jumlah pohon yang berbunga sangat sedikit. Sehingga pertukaran polen dari pohon yang satu dengan pohon yang lain sangat terbatas. Disamping itu, pohon-pohon yang berbunga antara satu dengan yang lain jaraknya berjauhan, sehingga mekanisme untuk memacu terjadinya *outcrossing* sangat rendah dan terhambat. Lebih lanjut, pohon-pohon dalam suatu tegakan jika hanya mempunyai jumlah bunga yang sedikit maka tidak akan menarik polinator sebagai agen penyerbukan untuk datang dan membantu penyerbukan. Tidak adanya waktu *blooming* pembungaan pada suatu tegakan akan sangat merugikan karena juga akan memicu terjadinya kawin antar kerabat.

Gambar 6. Rerata jumlah biji yang dapat berkecambah provenans-provenans *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* di kebun benih semai Paliyan. Tanda pagar menunjukkan nilai SEM (*standard error of means*)

IV. KESIMPULAN

1. Puncak perbungaan pohon-pohon *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* di kebun benih semai Paliyan Gunungkidul dijumpai pada bulan Maret, meskipun demikian periode perbungaan pada tegakan tersebut cukup lama yaitu bulan Februari sampai dengan Juni.
2. Perkembangan organ generatif pada *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* terjadi dalam panjang waktu yang sama antar provenan. Waktu yang diperlukan untuk proses perkembangan dari tahap inisiasi bunga hingga buah masak dan siap panen adalah 277 hari.
3. Nilai rata-rata keberhasilan reproduksi *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* 3,6%. Rata-rata jumlah biji tiap kapsul *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* bervariasi antara 6 sampai 32 biji perkapsul.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih disampaikan oleh penulis kepada tim peneliti dan teknisi *M. cajuputi* subsp. *cajuputi* yang telah bekerja keras membantu pelaksanaan kegiatan dan penelitian *M. cajuputi* subsp. *cajuputi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskorowati, L., 2008. Reproductive biology of *Melaleuca alternifolia* (Maiden & Betche) Cheel. PhD Thesis. The Fenner School Environment dan Society, Faculty of Science, The Australian National University, Canberra.
- Beardsell, D. V., O'Brien, S. P., Williams, E. G., Knox, R. B. and Calder, D. M., 1993. Reproductive Biology of Australian Myrtaceae. Australian Journal of Botany **41**: 511 - 526.
- Brophy, J. J. and Doran, J. C., 1996. Essential Oils of Tropical Asteromyrtus, Callistemon dan Melaleuca Species. ACIAR Monograph No. 40, Canberra, Australia.
- Butcher, P.A., Bell, J. C. and Moran, G. F., 1992. Patterns of Genetic Diversity dan Nature of The Breeding System in *Melaleuca alternifolia* (Myrtaceae). Australian Journal of Botany **40**: 365 - 375.
- Eldridge, K., Davidson, J., Harwood, C. and van Wyk, G. 1993. Eucalypt Domestication dan Breeding. Oxford University Press, Oxford.
- Friedel, M. H., Nelson, D. J., Sparrow, A. D., Kinloch, J. E. and Maconochie, J. R., 1993. What Induces Central Australian Arid Zone Trees and Shrubs to Flower and Fruit? Australian Journal of Botany **41**: 307 - 319.
- Gomez, K. A. and Gomez, A. A., 1995. Statistical Procedures for Agricultural Research.
- Griffin, A. R. and Hand, F. C., 1979. Post-anthesis Development of Flowers of *Eucalyptus regnans* F. Muell and The Timing of Artificial Pollination. Australian Forestry Research **9**: 9 - 15.
- Gunn, B., McDonald, M. and Lea, D., 1996. Seed and Leaf Collections of *Melaleuca cajuputi* Powell in Indonesia dan Northern Australia. Australian Tree Seed Centre. CSIRO Forest dan Forest Product, Canberra, ACT.
- Heslop-Harrison, Y. and Shivanna, K. R., 1977. The Receptive Surface Of The Angiosperms Stigma. Annals of Botany **41**: 1233 - 1258.

- House, S. M., 1997. Reproductive Biology of Eucalypts. In: Eucalypt Ecology, eds J. E. Williams dan J. C. Z. Woinarski. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 30-50.
- Leksono, B. 1996. Pola Sebaran Alami *Melaleuca cajuputi* Powell di Propinsi Maluku. Balai Penelitian dan Pengembangan Benih Tanaman Hutan. Yogyakarta. Indonesia.
- Moncur, M. W. and Boldan, D. J., 1989. Floral Morphology of *Eucalyptus melliodora* A. Cunn. ex Schau. and Comparisons With Other Eucalypt Species. Australian Journal of Botany **37**: 125 - 135.
- Owens, J. N., 1991. Flowering dan Seed Set. Department of Biology, University of Victoria, British Columbia, Canada.
- Owens, J. N., Sornsanthapornkul, P. and Tamingcharoen, S., 1992. Manual: Studying Flowering and Seed Ontogeny in Tropical Forest Trees. ASEAN-Canada Forest Tree Seed Centre Project. Thailand.
- Quinn, F. C. and Barlow, B. A., 1989. Contribution to a review of *Melaleuca* (Myrtaceae): X-Y. Unpublished report. Australian National Herbarium, Division of Plant Industry, CSIRO, Australia.
- Rimbawanto, A., 2000. Pemuliaan Tanaman Kayuputih (*Melaleuca cajuputi*) di Jawa. Duta Rimba 243/XXIV.
- Rosseto, M., Slade, R. W., Baverstock, P. R., Henry, R. J. and Slee, L. S., 1999. Microsatellite Variation Dan Assessment Of Genetik Structure in Tea Tree (*Melaleuca alternifolia* - Myrtaceae). Molecular Ecology **8**: 633 - 643.
- Sanzol, J. and Herrero, M., 2001. Review: The Effective Pollination Period In Fruit Trees. Scientia Horticulture **90**: 1 - 17.
- Schmidt, L. and Thuy, L. T. T., 2004. *Melaleuca cajuputi* Powel. Forest dan Lanscape, Denmark Seed Leaflet, 92.
- Schmidt, L., 2000. Guide to Handling of Tropical dan Subtropical Forest Seed. Danida Forest Seed Centre.
- Sedgley, M. and Griffin, A. R., 1989. Sexual Reproduction of Tree Crops. Academic Press, London.
- Smith-Ramirez, C. and Armesto, J. J., 1994. Flowering Dan Fruiting In The Temperate Rainforest Of Chiloé, Chile- Ecologies And Climatic Constraints. Journal of Ecology **82**: 353 - 365.
- Susanto, M., 2002. Evaluasi Uji Keturunan *Melaleuca cajuputi subsp. Cajuputi* Umur 23 Bulan di Paliyan, Gunungkidul dan Implikasinya pada Pemuliaannya di Masa Mendatang. Master Thesis. Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.