**VARIASI GENETIK BEBERAPA POPULASI MERBAU (*Intsia bijuga* O. Ktze)
BERDASARKAN PENANDA ISOENZIM**
*Genetic Variation of Some Merbau (*Intsia bijuga* O. Ktze) Populations Revealed
by Isoenzyme Markers*

Tri Pamungkas Yudohartono

Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta

Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 15, Purwobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta 55582;

Telp. (0274) 895954, 896080, Fax. (0274) 896080

ABSTRACT

The objectives of this study were to investigate the level of genetic variation and to describe its distribution within and among populations of merbau. Leaves of wildling were collected from four populations distributed in Papua and Moluccas islands. Genetic variation was detected by isoenzyme markers using four enzyme systems i.e. Peroxidase (POD), Esterase (EST), Diaphorase (DIA) and Glutamate Oxaloacetate Transaminase (GOT). The results showed that 17 alleles were identified and distributed on 6 polymorphic loci. The mean percentage of polymorphic loci was 95.8%. The average genetic diversity within population was 0.404 and the proportion of genetic variation among populations was 0.049. The UPGMA cluster analysis based on Nei's standard genetic distance reflected three main clusters, i.e. Halim and Waigo formed first cluster, Nabire formed second cluster, and Seram formed third cluster separated from two other clusters.

Key Words : *Intsia bijuga*, isoenzyme, genetic variation

ABSTRAK

Merbau (*Intsia bijuga*) merupakan salah satu jenis tanaman hutan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari tingkat variasi genetik dan mengetahui penyebaran variasi genetik dalam dan antar populasi-populasi merbau. Daun anakan merbau dikumpulkan dari empat populasi merbau yang tersebar di pulau Papua dan Kepulauan Maluku. Variasi genetik dideteksi dengan penanda isoenzim dengan menggunakan empat sistem enzim yaitu Peroxidase (POD), Esterase (EST), Diaphorase (DIA) dan Glutamate Oxaloacetate Transaminase (GOT). Hasil studi menunjukkan jumlah alel yang teridentifikasi sebanyak 17 alel yang tersebar pada 6 lokus polimorfik. Rata-rata persentase lokus polimorfik adalah 95,8 %. Rata-rata keragaman genetik dalam populasi sebesar 0,404 dan proporsi variasi genetik antar populasi sebesar 0,049. Analisis kluster UPGMA berdasarkan jarak genetik standar Nei menunjukkan terbentuknya 3 kluster utama yaitu populasi Halim dan Waigo membentuk kluster pertama, Nabire membentuk kluster kedua dan Seram membentuk kluster ketiga yang terpisah dari kedua kluster lainnya.

Kata Kunci : *Intsia bijuga*, isoenzim, variasi genetik

I. PENDAHULUAN

Merbau (*Intsia bijuga*) merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak dimanfaatkan dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi karena sudah sangat dikenal dalam perdagangan kayu di Indonesia maupun untuk keperluan ekspor. Wilayah penyebaran *Intsia bijuga* meliputi Samoa (Amerika), Australia, Burma, Kamboja, India, Indonesia, Madagaskar bagian barat (pada daerah rendah), Malaysia, Myanmar, Pulau-pulau Pasifik, Papua New Guinea, Philipina, Seychelles, Tanzania, Thailand dan Vietnam (*Tree Conservation Information Service*, 2007).

Pemenuhan kebutuhan kayu jenis tersebut masih dilakukan dari penebangan hutan alam sampai saat ini, sehingga populasinya semakin menurun. Berdasarkan data Dishut Propinsi Papua (2002) dalam Mahfudz (2004) eksploitasi merbau di Papua lebih dari 50% total produksinya. Apabila eksploitasi jenis ini terus dilakukan tanpa diimbangi dengan upaya penanaman yang memadai, maka ke depan dikhawatirkan populasi *Intsia bijuga* akan semakin menurun. Apalagi menurut hasil monitoring UNEP-WCMC status konservasi *Intsia bijuga* sudah termasuk kategori rawan (VU A1cd).

Salah satu permasalahan serius yang dihadapi dalam pengembangan strategi konservasi merbau yang tepat adalah kurang/belum tersedianya informasi genetik. Tidak ada satupun penanda genetik yang mempunyai kelebihan dalam semua aspek dibandingkan penanda-penanda genetik lainnya. Namun, biaya yang rendah dari isozim dengan kemudahan dalam penggunaan telah membuatnya menjadi penanda genetik yang sangat menarik dalam konservasi genetik. Karena itu, suatu strategi yang efisien

akan menggunakan isozim sebagai alat pertama untuk menjawab pertanyaan dan kemudian penanda DNA dapat digunakan untuk menambah/melengkapi informasi yang diperoleh dari isozim apabila jumlah lokus dan/atau derajat polimorfisme kurang memadai (Glaubitz dan Gavin, 2000).

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari tingkat variasi genetik dan mengetahui penyebaran variasi genetik dalam dan antar populasi-populasi merbau.

II. BAHAN DAN METODE

A. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah anakan merbau yang dikumpulkan dari 4 populasi yaitu Waigo, Nabire (Papua), Halmahera Timur (Maluku Utara) dan Seram (Maluku). Dari setiap populasi dipilih minimal 20 pohon induk yang berjarak minimal 100 meter dan setiap pohon induk diwakili oleh satu anakan alam/cabutan. Jumlah pohon induk yang dipilih secara acak dari keempat populasi sebanyak 89 pohon.

B. Metode

1. Ekstraksi daun dan prosedur isoenzim

Prosedur kerja di laboratorium untuk analisis isozim mengikuti pedoman yang disusun oleh Liengsiri, dkk. (1990). Daun muda dari setiap anakan diambil dan dihancurkan dengan mortar yang sudah didinginkan terlebih dahulu dan diberi larutan ekstraksi/*buffer* pengekstrak sebanyak 1 ml dan b-Mercaptoethanol sebanyak 0,07 ml. Sampel yang telah hancur selanjutnya dimasukkan ke dalam tabung *ependorf* dan

disentrifugasi pada kondisi 15.000 rpm dengan suhu 0°C selama kurang lebih 20 menit. Setelah disentrifugasi, ekstrak daun dalam tabung *epENDORF* akan terpisah menjadi dua bagian yaitu larutan bening pada bagian atas yang disebut *supernatant* dan endapan di bawahnya yang disebut *pellet*. Larutan *supernatant* akan digunakan dalam proses elektroforesis. Sedangkan *pellet* tidak digunakan. Sebelum proses elektroforesis dilaksanakan, masing-masing lubang diisi *supernatant* sebanyak 15-20 ml dengan menggunakan *stepper*. Sebelum dilakukan pemasangan plat kaca pada bak elektroforesis, dipastikan suhu sirkulator menunjukkan 4°C. Penutup bak elektroforesis dibuka dan diisi larutan *running buffer* setinggi 2 cm. Selanjutnya klip penjepit dan *silicon tube* dilepas dari plat kaca dan plat kaca dipasangkan secara berhadapan-hadapan dengan plat kaca bertakik berada di sebelah dalam. Pada waktu pemasangan tidak boleh ada gelembung udara diantara plat kaca. Selanjutnya palang penahan dikencangkan. Setelah itu larutan *running buffer* ditambahkan lagi ke dalam plat kaca yang sudah dipasang berhadapan tersebut sampai penuh dan tutup dipasang kembali. *Power supply* elektroforesis dihidupkan dan diatur supaya arusnya 100 mA (untuk 6 plat kaca). Proses elektroforesis dihentikan sampai tanda batas garis biru (*bromophenol blue*) mencapai tinggi 2 cm dari batas bawah plat kaca.

Pewarnaan dilakukan dengan meletakkan gel yang telah dikeluarkan dari bak elektroforesis ke dalam bak plastik berukuran 20 cm x 15 cm yang berisi larutan pewarna sesuai sistem enzim yang ditetapkan. Sistem enzim yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada hasil penelitian

sebelumnya (Halim, 2008) yang dilakukan pada tanaman merbau menggunakan 12 sistem enzim yaitu *Acid Phosphatase* (ACP), *Alcohol dehydrogenase* (ADH), *Glutamate dehydrogenase* (GDH), *Malate dehydrogenase* (MDH), *Glycerate dehydrogenase* (G2D), *Isocitrate dehydrogenase* (IDH), *Shikimate dehydrogenase* (SHD), *6-Phosphogluconate dehydrogenase* (6-PG), *Peroxidase* (POD), *Esterase* (EST), *Diaphorase* (DIA), dan *Glutamate oxaloacetate transaminase* (GOT). Berdasarkan studi pendahuluan 4 sistem enzim yang benar-benar bisa diamati karena menunjukkan pola berkas yang polimorfik dan konsisten yaitu GOT, EST, POD, dan DIA (Halim, 2008). Oleh karena itu sistem enzim inilah yang digunakan dalam penelitian ini. Pembuatan larutan pewarna dilakukan 15 - 20 menit sebelum proses elektroforesis selesai. Supaya dapat disimpan maka gel yang telah difiksasi dikeringkan terlebih dahulu dengan menggunakan kertas kaca. Gel yang telah kering siap diambil dan kertas kaca digunting sesuai dengan ukuran masing-masing gel. Informasi mengenai enzim yang digunakan, nomor individu dan tanggal dilaksanakan proses elektroforesis dicatat pada lembaran bawah gel di bawah indikator *bromophenol blue* dengan pena tahan air. Tahap terakhir adalah observasi gel. Observasi gel dilakukan dengan memberi kode alel untuk setiap lokus pada pita-pita atau *band* yang terdapat pada lembar gel. Posisi-posisi *band* ditentukan oleh masing-masing nilai R_f . Nilai R_f merupakan jarak rasio antara permukaan gel dengan posisi *band* dan posisi tanda garis biru.

2. Analisis data

Parameter keragaman genetik yang diukur meliputi rata-rata jumlah alel per lokus (Aa), jumlah efektif alel per lokus (Ae), persentase lokus polimorfik (PPL), heterozigositas teramati (Ho) dan heterozigositas harapan (He). Semua parameter dihitung dengan program komputer POPGENE 1.32 (Yeh, 2000). Jarak genetik dihitung berdasarkan jarak genetik standar Nei (Nei, 1972) dan koefisien diferensiasi genetik (G_{ST}) dihitung berdasarkan pengukuran Nei (Nei, 1987). Hubungan kekerabatan antar populasi digambarkan melalui dendrogram dari analisis kluster *Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean* (UPGMA) berdasarkan jarak genetik standar Nei.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Keragaman genetik

Dari keempat sistem enzim yang digunakan dalam penelitian ini yaitu POD, EST, GOT dan DIA teridentifikasi enam lokus yaitu *Pod-1*, *Pod-2*, *Got-1*, *Got-2*, *Est-1* dan *Dia-1*. Lokus *Pod-1* dan *Pod-2* bersifat polimorfik untuk semua populasi (Halmahera Timur/Haltim, Waigo, Nabire, Seram). Lokus *Got-2* monomorfik untuk populasi Waigo dan polimorfik untuk populasi Haltim, Nabire dan Seram. Lokus *Got-1*

polimorfik untuk semua populasi. Lokus *Est-1* dan *Dia-1* bersifat polimorfik untuk semua populasi. Jumlah alel yang teridentifikasi dari keempat populasi merbau adalah sebanyak 17 alel yang terdistribusi pada 6 lokus polimorfik. Frekuensi alel pada masing-masing lokus dari keempat populasi merbau bervariasi. Jumlah rata-rata alel per lokus berkisar dari 2,33 (Waigo dan Seram) hingga 2,67 (Haltim) dengan nilai rata-rata pada semua populasi 2,46. Jumlah efektif alel per lokus berkisar dari 1,82 (Waigo) hingga 1,87 (Nabire) dengan nilai rata-rata pada semua populasi 1,85. Rata-rata persentase lokus polimorfik semua populasi yang dievaluasi pada taraf kepercayaan 95% adalah 95,8%. Nilai heterozigositas yang diharapkan berkisar dari 0,391 (Waigo) hingga 0,413 (Haltim) dengan rata-rata 0,404. Nilai heterozigositas teramati berkisar dari 0,486 (Haltim) hingga 0,537 (Nabire) dengan rata-rata 0,515 (Tabel 1).

2. Diferensiasi dan hubungan kekerabatan antar populasi

Nilai koefisien diferensiasi populasi (G_{ST}) di antara keempat populasi berkisar dari 0,005 (*Pod-1*) hingga 0,090 (*Dia-1*). Rata-rata G_{ST} di antara keempat populasi merbau adalah 0,0486 (Tabel 2). Sebagian besar dari total keragaman genetik ($H_T = 0,425$) didistribusikan dalam populasi yaitu sebesar 0,404 atau 95,1% dan

Tabel 1. Ringkasan keragaman allozim dari 4 populasi merbau

Populasi	Aa	Ae	PPL	He	Ho
Haltim	2,62	1,84	100,0	0,413	0,486
Waigo	2,33	1,82	83,3	0,391	0,508
Nabire	2,50	1,87	100,0	0,407	0,537
Seram	2,33	1,85	100,0	0,406	0,528
Rata-rata	2,46	1,85	95,8	0,404	0,515

Tabel 2. Ringkasan nilai H_T , H_S , D_{ST} dan G_{ST} dari 4 populasi merbau pada setiap lokus

Lokus	H_T	H_S	D_{ST}	G_{ST}
<i>Pod-1</i>	0,590	0,580	0,010	0,017
<i>Pod-2</i>	0,483	0,481	0,002	0,005
<i>Got-1</i>	0,445	0,409	0,036	0,081
<i>Got-2</i>	0,094	0,090	0,004	0,042
<i>Dia-1</i>	0,599	0,545	0,054	0,090
<i>Est-1</i>	0,338	0,320	0,014	0,053
Rata-rata	0,425	0,404	0,021	0,049

sisanya didistribusikan antar populasi yakni sebesar 0,021 atau 4,9%.

Jarak genetik antar pasangan populasi (Tabel 3) berkisar dari 0,010 (Haltim-Waigo) hingga 0,099 (Haltim-Seram). Sedangkan identitas genetik antar pasangan populasi berkisar dari 0,906 (Haltim-Seram) hingga 0,990 (Haltim-Waigo).

Hubungan kekerabatan antar populasi digambarkan melalui dendrogram dari analisis kluster *Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean* (UPGMA) berdasarkan *Nei's standard genetic distance* (1972). Dari analisis kluster (Gambar 1) terbentuk tiga kluster utama. Populasi Haltim dan Waigo membentuk kluster pertama, populasi Nabire membentuk kluster kedua. Sedangkan populasi Seram membentuk kluster ketiga yang jauh terpisah dari kedua kluster lainnya.

Tabel 3. Jarak genetik (bawah diagonal) dan identitas genetik (atas diagonal) dari 4 populasi merbau berdasarkan *Nei's standard genetic distance* (1972)

Populasi	Haltim	Waigo	Nabire	Seram
Haltim	***	0,990	0,983	0,906
Waigo	0,010	***	0,984	0,917
Nabire	0,017	0,016	***	0,943
Seram	0,099	0,087	0,059	***

Gambar 1. Hubungan kekerabatan 4 populasi merbau berdasarkan *Nei's standard genetic distance* (1972)

B. Pembahasan

1. Keragaman genetik dan koefisien silang dalam

Rata-rata keragaman genetik *I. bijuga* dari keempat populasi merbau (H_S) adalah 0,404. Nilai ini lebih tinggi dari rata-rata keragaman genetik *I. bijuga* dari empat populasi (Manokwari, Nabire, Ternate/Haltim dan Carita) yang diteliti dengan penanda RAPD yaitu sebesar 0,296 (Rimbawanto dan Widyatmoko, 2006). Rata-rata keragaman genetik *I. bijuga* ini juga lebih tinggi dibandingkan keragaman genetik *I. palembanica* yakni sebesar 0,242 (Lee, dkk., 2002). Nilai keragaman genetik yang tinggi ini diduga disebabkan oleh sejarah hidup *I. bijuga* dan karakteristik-karakteristik ekologi, umur yang panjang, wilayah penyebaran yang luas dan sistem perkawinan silang. Koefisien silang dalam bernilai negatif untuk semua lokus dan semua populasi yang diamati. Nilai ini mengindikasikan

adanya kelebihan heterozigositas. Nilai negatif ini dapat disebabkan oleh preferensi perkawinan (*assortative mating*), dan seleksi (Yeh, 2000; Lowe, dkk., 2004). Nilai rerata perkawinan silang pada multi lokus (t_m) dan lokus tunggal (t_s) untuk populasi merbau dari Manokwari yang besar ($t_m = 1$ dan $t_s = 0,981$) menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya kawin silang luar pada populasi merbau dari Manokwari sangat besar (Ningsih, 2008). Mekanisme seleksi yang menyebabkan kelebihan heterozigositas terjadi dapat disebabkan oleh eksploitasi pada tegakan alam atau populasi merbau yang diamati. Perbedaan tingkat eksploitasi pada setiap populasi menyebabkan perbedaan besarnya nilai koefisien silang dalam di antara populasi merbau tersebut.

2. Diferensiasi dan kekerabatan antar populasi

Rata-rata G_{ST} dari keempat populasi *I. bijuga* sebesar 0,049 lebih tinggi bila dibandingkan rata-rata G_{ST} *I. palembanica* sebesar 0,040 (Lee, dkk., 2002). Nilai ini lebih rendah daripada rata-rata G_{ST} 4 populasi *I. bijuga* (Carita, Manokwari, Nabire dan Ternate/Haltim) yang diteliti dengan penanda RAPD yaitu sebesar 14,1% (Rimbawanto dan Widyatmoko, 2006).

Berdasarkan analisis kluster keempat populasi merbau terbagi ke dalam tiga kluster utama. Populasi Haltim dan Waigo membentuk satu kluster, populasi Nabire membentuk satu kluster, sedangkan populasi Seram membentuk satu kluster tersendiri. Pembentukan ketiga kluster utama tersebut diduga dipengaruhi oleh proses-proses geografi benua (*continental drift*). Audley-Charles (1978) dan Pigram dan Panggabean (1984) yang menyatakan bahwa pulau-pulau antara New Guinea dan Sulawesi

yang meliputi Buton, Banggai-Sula, Buru, Seram, Kai, Tanimbar sampai Timor dan Roti ternyata termasuk Australian Gondwanaland. Sedangkan Whitmore (1987) menyatakan bahwa posisi Maluku Utara (Pulau Halmahera, Obi dan Bacan) pada saat ini terhadap Sulawesi, New Guinea, dan Banda Arc menunjukkan bahwa pulau-pulau Maluku Utara ini merupakan bagian-bagian New Guinea yang terpisah secara tektonik. Pendapat ini didukung Pigram dan Panggabean (1984) yang menyebutkan bahwa Obi dan Bacan sebagai benua kecil (*micro-continent*) yang berasal dari New Guinea. Pulau Seram yang terlepas jauh terlebih dahulu dan dipisahkan oleh lautan mengalami isolasi reproduksi dan adaptasi lokal terhadap lingkungan setempat. Kondisi ini menyebabkan semakin meningkatnya diferensiasi genetik antar populasi merbau di Seram dan populasi-populasi merbau dari Halmahera dan Papua.

3. Implikasi dalam program konservasi genetik

Nilai keragaman genetik merbau yang tinggi mengindikasikan tegakan merbau pada sebaran alamnya masih dalam kondisi cukup baik walaupun terjadi tekanan terhadap populasinya. Jane *et al.* (1998) dalam Widyatmoko (2006) mengatakan bahwa tujuan utama dari mendokumentasi tingkat dan distribusi keragaman genetik suatu jenis adalah untuk mendesain strategi yang optimal untuk konservasi suatu jenis. Hasil penelitian berdasarkan analisis isozim menunjukkan bahwa sebagian besar dari total keragaman genetik merbau dipartisikan dalam populasi yaitu sebesar 0,404 atau 95,1% dan sisanya didistribusikan antar populasi yakni sebesar 0,021 atau 4,9%. Sedangkan berdasarkan penanda RAPD diketahui bahwa 86% keragaman genetik 4

populasi merbau berada di dalam populasi dan sisanya 14% berada di antara populasi. Widyatmoko, dkk. (2005) menyatakan bahwa Papua terbagi ke dalam 6 wilayah berdasarkan pertimbangan geogenetik. Dengan mempertimbangkan tingkat dan distribusi keragaman genetik merbau berdasarkan penanda isozim dan RAPD serta pembagian wilayah Papua berdasarkan pertimbangan geogenetik maka materi genetik merbau dari Papua yang digunakan untuk konservasi *ex situ* sebaiknya diambil dari 6 wilayah geogenetik. Setiap wilayah geogenetik cukup diwakili satu atau dua populasi. Sedangkan populasi Halmahera dan Seram dipertimbangkan sebagai populasi tersendiri. Hal ini disebabkan Halmahera dan Seram terpisah dari Papua oleh lautan yang dapat menyebabkan terjadinya isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi dan adaptasi lokal kedua populasi dapat menyebabkan semakin besarnya diferensiasi genetik antara populasi merbau dari Halmahera, Seram dan Papua. Karena populasi merbau dari Papua yang digunakan dalam penelitian ini belum mewakili keenam wilayah geogenetik Papua maka perlu dilakukan pengumpulan materi genetik dari populasi pada wilayah geogenetik Papua yang lain. Pengambilan populasi-populasi merbau lain dari sebaran alam di luar Papua, terutama populasi yang terpisah oleh lautan, juga perlu dipertimbangkan. Untuk jumlah individu per populasi, *Center for Plant Conservation* (1991) dalam Widyatmoko (2006) merekomendasikan bahwa jumlah 10-50 individu per populasi merupakan jumlah yang layak antara batas minimum dan pengambilan sampel yang terlalu banyak. Sedangkan Yonezawa (1985) dalam Widyatmoko (2006) menganjurkan bahwa 10 individu per populasi dapat memenuhi kriteria

baik dari segi cukup maupun efisiensi. Meskipun tidak ada ketentuan pasti mengenai jumlah individu per populasi, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sebaran dan jarak antar individu. Individu-individu yang akan dijadikan sumber pengumpulan materi genetik sebaiknya agak berjauhan supaya biji atau anakan yang dikumpulkan merupakan hasil perkawinan dari individu-individu yang tidak berkerabat. Penetapan areal untuk konservasi *in situ* sebaiknya mengikuti populasi-populasi yang digunakan sebagai sumber pengambilan materi genetik untuk kegiatan konservasi *ex situ*.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan studi variasi genetik empat populasi merbau menggunakan penanda isoenzim dapat disimpulkan :

1. Total keragaman genetik (H_T) dari keempat populasi merbau yang diamati sebesar 0,425.
2. Sebagian besar dari total keragaman genetik didistribusikan dalam populasi (H_S) yaitu sebesar 0,404 atau 95% dan sisanya 0,021 atau 4,9% didistribusikan antar populasi (D_{ST}).
3. Berdasarkan analisis kluster UPGMA populasi-populasi merbau terbagi kedalam tiga kluster utama. Populasi Halmahera dan Waigo membentuk kluster pertama; Populasi Nabire membentuk kluster kedua, sedangkan populasi Seram membentuk kluster ketiga yang terpisah dari dua kluster lainnya. Populasi-populasi dalam kluster yang sama mempunyai hubungan kekerabatan lebih dekat dibandingkan dengan populasi pada kluster yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Audley-Charles, M.G. 1978. Indonesian and Philippine Archipelagoes. In Moullade, M., and Nairn, A.E.M T (eds.), The Phanerozoic geology of the world II: The Mesozoic A, pp 165-207. Elsevier, Amsterdam.
- Glaubitz, J.C., and Gavin, F.M. 2000. Genetic Tools: the use of biochemical and molecular markers. In A. Young, D. Boshier and T. Boyle (eds), Forest conservation genetics, principle and practice. CABI Publishing.
- Halim, R.M.A. 2008. Variasi Genetik Dalam dan Antar Populasi Merbau (*Intsia bijuga* (Colebr) O. Kuntze) dengan Analisis Isozim. Skripsi Jurusan Budidaya Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Lee, S.L., Kevin, K.S., Leng-Guan Saw, Adnan Norwati, M.H. Siti Salwana, Chai-Ting Lee and Muhammad Norwati. 2002. Population Genetics of *Intsia palembanica* (Leguminosae) and Genetic Conservation of Virgin Jungle Reserve in Peninsular Malaysia. American Journal of Botany 89 (3): 447-459.
- Liengsiri, C., C. Piewluang, T. J. B. Boyle. 1990. Strach gel electrophoresis of tropical trees. A Manual. Asean-Canada Forest Tree Seed Centre. Muak Lek Saraburi & Petawana National Forestry Institute. Chalk River. Ontario Canada.
- Lowe, A., Stephen, H., and Paul A. 2004. Ecological genetics : design, analysis and application. Blackwell Publishing.
- Mahfudz. 2004. Proposal Penelitian Terpadu Penelitian dan Pengembangan Jenis Merbau . Puslitbang Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan, Yogyakarta.
- Nei, M. 1972. Genetic distance between populations. American Naturalist, 106, 283-92.
- Nei, M. 1987. Molecular evolutionary genetics. Columbia University Press, New York.
- Ningsih, A.N. 2008. Sistem Perkawinan pada Sebaran Alam Merbau (*Intsia bijuga* (Colebr) O. Kuntze) di Papua Berdasarkan Analisis Isozim. Skripsi Jurusan Budidaya Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Pigram, C.J., and Panggabean, H. 1984. Rifting of The Northern Margin of The Australian Continent And The Origin of Some Micro-Continents in Eastern Indonesia. Tectonophysics 107, 331-53
- Rimbawanto, A. dan A.Y.P.B.C, Widyatmoko. 2006. Keragaman Genetik Empat Populasi *Intsia bijuga* Berdasarkan Penanda RAPD Dan Implikasinya Bagi Program Konservasi Genetik. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman Vol. 3 No.3, Juni 2006. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Departemen Kehutanan.
- Tree Conservation Information Service. 2007. *Intsia bijuga*. http://www.unep-wcmc.org/trees/trade/int_bij.htm Diakses pada tanggal 04 Desember 2008.
- Whitmore, T.C (ed). 1987. Biogeographical Evolution of The Malay Archipelago. Oxford Forestry Institute, University of Oxford. Clarendon Press-Oxford.

- Widyatmoko, AYPBC. 2006. Strategi Konservasi Ulin Berdasarkan Informasi Keragaman Genetik. Prosiding Workshop Sehari-Peran Litbang Dalam Pelestarian Ulin, AYPBC. Widyatmoko dan M. Susanto (ed.). Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman dan Tropenbos International Indonesia. Samarinda. hal 141-148.
- Widyatmoko, A.Y.P.B.C, Rimbawanto, A dan Suharyanto. 2005. Keragaman Genetik *Araucaria cunninghamii* Menggunakan Penanda RAPD. Prosiding Seminar Nasional Peningkatan Produktivitas Hutan-Peran Konservasi Sumberdaya Genetik, Pemuliaan dan Silvikultur dalam Mendukung Rehabilitasi Hutan, E.B. Hardiyanto (ed.). Fakultas Kehutanan UGM dan ITTO. Yogyakarta.
- Yeh, F.C. 2000. Population Genetics. In A. Young, D. Boshier and T. Boyle (eds), Forest Conservation Genetics, Principle And Practice. CABI Publishing.