UJI PENGARUH MIKORIZA DAN CUKA KAYU TERHADAP PERTUMBUHAN LIMA PROVENAN SENGON DI PESEMAIAN

*Effect of Mycorrhizae and Wood Vinegar on the Seedling
Growth of Five Provenances of Paraserianthes falcataria*

Mohamad Siarudin dan Endah Suhaendah

Balai Penelitian Kehutanan Ciamis

ABSTRACT

The objective of the study was to increase the growth of 5 provenances albizia (Paraserianthes falcataria L. Nielsen) in the nursery. The experimental design was Split Plot Design, with 5 provenances of albizia as main plot and 3 treatments (wood vinegar application, mycorrhizae application and control) as sub plot. Each sub plot consisted of 45 seeds as sample. Growth parameter observed was delta height: that is difference between measurement at the early application (3 weeks age of seedling) and at the last measurement (10 weeks age of seedling). The data obtained then analyzed by using analysis of variance and continued with Duncan test. The result showed that mycorrhizae and wood vinegar application have significant effect on the growth of albizia seedling. The best performance was shown at wood vinegar application (height average 75,48 cm and height delta 66,62 cm), mycorrhizae application (height average 66,44 cm and height delta 59,22 cm) and control (height average 58,92 cm and height delta 52,48 cm) respectively. Provenance differences were also significant. The best performance were shown at provenance of Candirototo, Kediri, Ciamis, Wamena, and Subang. Height delta each provenance after 7 weeks application were 67,65 cm, 62,93 cm, 60,15 cm, 53,37 cm, dan 53,11 cm; while the totals height at 10 weeks age of seedling were 74,44 cm, 69,33 cm, 69,14 cm, 61,02 cm dan 60,80 cm respectively.

Key Words: *Mycorrhizae, nursery, provenance, wood vinegar*

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan 5 provenan sengon (*Paraserianthes falcataria* L. Nielsen) di pesemaian, telah dilaksanakan penelitian di Ciamis pada bulan Oktober sampai Desember 2006. Penelitian ini menggunakan Rancangan Petak Terbagi (*Split Plot Design*) dengan 5 provenan sengon sebagai petak utama dan perlakuan (aplikasi cuka kayu, mikoriza dan kontrol) sebagai anak petak. Setiap anak petak/perlakuan terdiri atas 45 bibit sebagai sampel. Parameter pertumbuhan yang diamati adalah riap tinggi, yaitu selisih tinggi pada awal perlakuan (umur semai 3 minggu) dan akhir pengamatan (umur semai 10 minggu).

Data dianalisis dengan analisis keragaman yang dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil menunjukkan bahwa aplikasi mikoriza dan cuka kayu berpengaruh sangat nyata pada peningkatan pertumbuhan tinggi tanaman sengon. Pertumbuhan tinggi semai sengon secara berurutan dari yang tertinggi didapat pada aplikasi cuka kayu (tinggi rata-rata 75,48 cm dan riap tinggi 66,62 cm), aplikasi mikoriza (tinggi rata-rata 66,44 cm dan riap tinggi 59,22 cm) dan kontrol (tinggi rata-rata 58,92 cm dan riap tinggi 52,48 cm). Pertumbuhan tinggi antar provenan berbeda sangat nyata dengan urutan dari yang tertinggi adalah semai sengon asal Candirot, Kediri, Ciamis, Wamena dan Subang, dengan riap tinggi setelah 7 bulan aplikasi masing-masing 67,65 cm, 62,93 cm, 60,15 cm, 53,37 cm dan 53,11 cm; dan tinggi total pada umur 10 minggu masing-masing 74,44 cm, 69,33 cm, 69,14 cm, 61,02 cm dan 60,80 cm.

Kata Kunci: Cuka kayu, mikoriza, pesemaian, provenan

I. PENDAHULUAN

Sengon (*Paraserianthes falcataria* L. Nielsen) merupakan jenis cepat tumbuh yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dalam pengembangan hutan tanaman. Jenis ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya riap pertumbuhan tinggi, persyaratan tumbuh mudah, pemanfaatannya beragam, dan jenis pengikat nitrogen (Budelman, 2005).

Pengembangan jenis sengon perlu didukung hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan produktivitasnya. Upaya peningkatan produktivitas sengon dapat dimulai dari penerapan teknologi tepat guna di pesemaian sehingga diperoleh bibit yang berkualitas. Diharapkan dengan penggunaan bibit yang berkualitas akan didapatkan pertumbuhan awal yang baik sehingga menghasilkan produktivitas hutan tanaman yang optimal. Hal ini perlu diperhatikan karena menurut Daniel *et al.* (1979), kondisi pertumbuhan awal tanaman akan menentukan perkembangan selanjutnya dari pohon tersebut.

Salah satu teknologi tepat guna yang dapat diterapkan di pesemaian adalah aplikasi mikoriza dan cuka kayu. Mikoriza merupakan suatu struktur yang terbentuk sebagai akibat kerjasama yang saling menguntungkan antara cendawan dan akar tumbuhan. Cendawan membantu akar menyerap unsur-unsur hara bagi tanaman, meningkatkan ketahanan terhadap hama penyakit dan kondisi kekeringan (Santoso dkk., 2003). Teknik inokulasi mikoriza merupakan salah satu teknik yang dapat meningkatkan kualitas bibit melalui peningkatan serapan unsur hara.

Cuka kayu merupakan cairan berwarna coklat pekat yang diperoleh dari proses destilasi asap dalam pembuatan arang kayu. Komponen utama yang terdapat dalam cuka kayu adalah asam asetat dan metanol. Zat ini pernah digunakan sebagai sumber komersial untuk asam asetat. Cuka kayu yang disimpan beberapa lama dan diencerkan dengan air, jika disiramkan ke daun atau sekitar akar tumbuhan bisa dimanfaatkan untuk membantu metabolisme tumbuhan dan mempercepat pertumbuhan

(Nurhayati, 2006; Anonimus, 2007). Meskipun demikian, cuka kayu tidak dapat dianggap sebagai pupuk dalam arti konvensional karena cuka kayu tidak mengandung unsur hara (Anonimus, 2007).

Penggunaan mikoriza dan cuka kayu pada tanaman sengon masih relatif kurang. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan 5 provenan sengon di pesemaian melalui penggunaan mikoriza dan cuka kayu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penerapan teknologi tepat guna di pesemaian dalam mendukung pengembangan hutan tanaman sengon.

II. BAHAN DAN METODE

A. Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember 2006 di lokasi pesemaian Balai Penelitian Kehutanan Ciamis. Lokasi penelitian secara administratif termasuk ke dalam wilayah pemerintahan Desa Pamalayan, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang terletak di antara 109°20' sampai 108°40' BT dan 7°40'20" LS dengan ketinggian tempat 110 m dpl.

B. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bibit sengon umur 3 bulan dari lima provenan (Ciamis, Candirot, Kediri, Subang dan Wamena), cendawan endomikoriza dengan jenis *Gigaspora* sp. yang merupakan isolat mikoriza dari tanaman sengon asal Kalimantan Tengah dengan bahan pembawa zeolit, dan larutan cuka kayu 2% yang berasal dari limbah

kayu mahoni (*Swietenia* sp.). Peralatan yang digunakan antara lain *hand sprayer*, meteran, alat tulis dan peralatan pendukung lainnya.

C. Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Petak Terbagi (*Split Plot Design*) dengan 5 provenan sengon sebagai petak utama dan perlakuan (aplikasi cuka kayu, mikoriza dan kontrol) sebagai anak petak. Setiap provenan terdiri atas 45 bibit yang diberi perlakuan cuka kayu, 45 bibit diberi cendawan mikoriza dan 45 bibit sebagai kontrol. Penularan mikoriza pada bibit sengon dilakukan secara vegetatif, yaitu diberikan pada media dalam polibag di sekitar perakaran bibit sengon yang berumur 3 minggu, sedangkan cuka kayu dengan dosis 2% diaplikasikan pada batang dan daun semai sengon serta media di polibag dengan menggunakan *hand sprayer*. Aplikasi cuka kayu dilakukan 3 kali dengan selang waktu 2 minggu, mulai pada umur semai sengon 3 minggu.

Parameter pertumbuhan tanaman yang diamati adalah tinggi semai sengon. Pengamatan dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu awal perlakuan (umur semai 3 minggu), umur semai 6 minggu dan umur semai 10 minggu. Pertumbuhan tinggi tanaman diukur dengan menentukan riap tinggi (cm), yaitu selisih tinggi pada pengukuran awal dengan tinggi pada akhir pengukuran terakhir.

D. Analisis Data

Data pertumbuhan bibit sengon yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis statistik dengan analisis keragaman (*Analysis of Varians*) yang dilanjutkan dengan uji nilai tengah Duncan pada taraf 1% dan 5%.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertumbuhan Sengon Antar Perlakuan

Hasil pengukuran tinggi semai tanaman sengon dengan aplikasi mikoriza dan cuka kayu disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tinggi semai sengon 5 provenan dengan aplikasi mikoriza dan cuka kayu

Perlakuan	Tinggi Rata-rata (cm)			ΔT (cm)
	T1	T2	T3	
Mikoriza	7,48	25,39	66,44	58,96
Cuka Kayu	8,83	32,03	75,48	66,65
Kontrol	6,46	23,68	58,92	52,46

Keterangan: T1 : tinggi semai pada saat aplikasi (3 minggu);
T2 : tinggi semai 6 minggu; T3: tinggi semai 10 minggu;
 ΔT : Riap tinggi (T3-T1)

Pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa rata-rata tinggi semai sengon pada usia 3 bulan terbaik pada aplikasi cuka kayu, kemudian lebih rendah pada aplikasi mikoriza dan terendah pada semai sengon tanpa perlakuan (kontrol). Pemberian cuka kayu dengan dosis 2% setiap dua minggu menghasilkan tinggi tanaman rata-rata 75,48 cm dan riap tinggi setelah 7 bulan aplikasi mencapai 66,65 cm, sedangkan perlakuan mikoriza menghasilkan rata-rata tinggi tanaman 66,44 cm dan riap tinggi setelah 7 bulan aplikasi 58,96 cm. Kedua perlakuan ini memberi pengaruh yang baik pada pertumbuhan tinggi semai sengon, terbukti pada tinggi semai tanpa perlakuan yang rendah, hanya 58,92 cm dan riap tinggi 52,46 cm.

Hasil analisis keragaman pengaruh aplikasi cuka kayu dan mikoriza pada pertumbuhan tinggi semai sengon 5 provenan disajikan pada Tabel 2.

Pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa perlakuan aplikasi cuka kayu dan mikoriza memberikan pengaruh sangat nyata (taraf kepercayaan 99%) terhadap pertumbuhan tinggi rata-rata semai sengon. Perbedaan sangat nyata juga terjadi pada pertumbuhan tinggi semai sengon antar provenan, dan interaksi antara perlakuan dan provenan relatif seragam. Hasil ini sejalan dengan laporan penelitian Suhardi *et al.* (2005) bahwa provenan dan perlakuan endomikoriza (*arbuscular mycorrhizal fungi*) berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan sengon umur 4 bulan. Hasil uji lanjut perbedaan tinggi semai sengon antar perlakuan disajikan pada Tabel 3.

Berdasarkan uji lanjut pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa perlakuan aplikasi cuka kayu, mikoriza dan kontrol berada pada subset yang berbeda atau ketiganya saling berbeda sangat nyata. Aplikasi cuka kayu menghasilkan riap tinggi yang tertinggi, dan berbeda nyata dengan perlakuan mikoriza maupun kontrol. Secara grafis pertumbuhan tinggi sengon dari beberapa kali pengukuran pada kedua perlakuan disajikan pada Gambar 1.

Tabel 2. Analisis keragaman pengaruh aplikasi cuka kayu dan mikoriza pada pertumbuhan tinggi semai sengon 5 provenan

Sumber Keragaman	Derajat Bebas	Jumlah Kuadrat	Kuadrat Tengah	F Hit	Sig.
Perlakuan	2	21387.538	10843.769	17.832	0.000**
Provenan	4	20341.371	5085.343	8.363	0.000**
Perlakuan x provenan	8	4458.460	557.307	0.916	0.502 ns
Galat percobaan	637	387357.583	608.097		

Keterangan: * = berbeda nyata (taraf kepercayaan 95%)
** = berbeda sangat nyata (taraf kepercayaan 99%)
ns = non significant (tidak berbeda nyata)

Tabel 3. Uji lanjut perbedaan riap tinggi semai sengon antar perlakuan

Perlakuan	Subset	Uji Duncan
Kontrol	52.3311	a
Mikoriza	59.1927	b
Cuka Kayu	66.7186	c

Keterangan: huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan

Gambar 1. Tinggi semai sengon dengan aplikasi mikoriza dan cuka kayu

Pada Gambar 1 menunjukkan pertumbuhan semai sengon pada 3 kali pengukuran cukup konsisten, yaitu tertinggi pada perlakuan cuka kayu, kemudian di bawahnya pada perlakuan mikoriza dan kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa cuka kayu lebih baik digunakan untuk

meningkatkan pertumbuhan sengon di pesemaian. Menurut Nurhayati (2006), campuran cuka kayu pada nutrisi tanaman dapat membuat pertumbuhan tanaman lebih baik. Mikoriza, walaupun menunjukkan pengaruh pada pertumbuhan tinggi sengon, tetapi masih lebih rendah dari pengaruh aplikasi cuka kayu. Hal ini diduga disebabkan karena pengaruh mikoriza bekerja secara biologis dan memerlukan proses relatif lebih lama dibanding cuka kayu yang berproses secara kimiawi terhadap sistem metabolisme tanaman sengon.

B. Pertumbuhan Sengon Antar Provenan

Perbandingan tinggi semai antar provenan secara grafis disajikan pada Gambar 2 yang menunjukkan bahwa rata-rata riap tinggi semai terbaik secara berurutan didapat pada provenan Candirotto (67,65 cm), Kediri (62,93 cm), Ciamis (60,15 cm), Wamena (53,37 cm) dan Subang (53,11 cm). Berdasarkan hasil analisis keragaman pada Tabel 2 diketahui bahwa tinggi semai antar provenan tersebut berpengaruh sangat nyata. Hasil uji lanjut sebagaimana disajikan pada Tabel 4, menunjukkan bahwa tinggi semai sengon asal Candirotto, Kediri dan

Gambar 2. Pertumbuhan tinggi semai 5 provenan sengon dengan aplikasi mikoriza dan cuka kayu

Ciamis relatif seragam, demikian juga sengon asal Subang, Wamena dan Ciamis. Perbedaan sangat nyata terjadi pada tinggi semai antara provenan Subang dan Wamena dengan provenan asal Kediri dan Candirototo.

Tabel 4. Uji lanjut perbedaan tinggi semai sengon antar perlakuan

Perlakuan	Subset	Uji Duncan
Subang	53.0682	a
Wamena	53.1846	a
Ciamis	60.0188	b
Kediri	62.9651	b
Candirototo	67.8516	b

Keterangan: huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan

Tampilan riap tinggi semai sengon antar provenan memiliki urutan yang sama dengan tinggi semai pada akhir pengukuran, yaitu berurutan dari yang tertinggi Candirototo, Kediri, Ciamis, Wamena dan Subang dengan tinggi rata-rata masing-masing 74,44 cm, 69,33 cm, 69,14 cm, 61,02 cm dan 60,80 cm. Hasil ini sebanding dengan penelitian Rachman dkk. (2005) yang melaporkan semai sengon asal Candirototo umur 3 bulan sebagai provenan tertinggi (rata-rata 71,5 cm) dibanding 6 provenan lainnya (Ciamis, Subang, Biak, Wamena, Wonogiri dan Kediri). Hasil yang konsisten ini menunjukkan bahwa perkembangan sengon antar letak geografis menghasilkan karakteristik pertumbuhan tanaman yang berbeda. Hal ini sesuai menurut Nikles (2005) bahwa penelitian gen-ekologis (genecological) pada beberapa jenis tumbuhan menunjukkan bahwa karakteristik populasi berkembang sebagai hasil dari seleksi alam dan fenomena lainnya.

IV. KESIMPULAN

1. Aplikasi mikoriza dan cuka kayu berpengaruh sangat nyata pada peningkatan pertumbuhan tinggi tanaman sengon. Pertumbuhan tinggi semai sengon secara berurutan dari yang tertinggi didapat pada aplikasi cuka kayu (tinggi rata-rata 75,48 cm dan riap tinggi 66,62 cm), aplikasi mikoriza (tinggi rata-rata 66,44 cm dan riap tinggi 59,22 cm) dan kontrol (tinggi rata-rata 58,92 cm dan riap tinggi 52,48 cm).
2. Pertumbuhan tinggi antar provenan berbeda sangat nyata dengan urutan dari yang tertinggi adalah semai sengon asal Candirototo, Kediri, Ciamis, Wamena dan Subang, dengan riap tinggi setelah 7 bulan aplikasi masing-masing 67,65 cm, 62,93 cm, 60,15 cm, 53,37 cm dan 53,11 cm; dan tinggi total pada umur 10 minggu masing-masing 74,44 cm, 69,33 cm, 69,14 cm, 61,02 cm dan 60,80 cm.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus, 2007. Cuka Kayu. Wikipedia Indonesia. www.id.wikipedia.org/wiki/Cuka_kayu. Diakses pada tanggal 21 Januari 2007.
- Budelman, Arnoud, 2005. *Paraserianthes falcataria* - Southeast Asia's Growth Champion. Winrock International. www.winrock.org/forestry/factnet.htm. Diakses pada tanggal 20 Februari 2005.
- Daniel, T.W., J.A. Helms and F. Baker, 1979. *Principles of Silviculture*. Mc Graw-Hill. New York.

- Nikles, D.G., 2005. Breeding for Growth and Yield. http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/a2173e/a2173e05.htm. Diakses pada tanggal 10 Desember 2005.
- Nurhayati, Tjutju, 2006. Dulu Arang, Sekarang Arang dan Cuka Kayu. Laporan Gelar Teknologi pada Pekan Hutan Rakyat Nasional I. Loka Litbang Hutan Monsoon. Ciamis.
- Rachman, E., E. Suhaendah, dan Rusdi, 2005. Pertumbuhan Tujuh Provenan Sengon (*Paraserianthes falcataria*) dan Identifikasi Hama dan Penyakit di Pesemaian.
- Santoso, E., Ragil S.B. Irianto, M. Turjaman, 2003. Teknologi Mikoriza. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Departemen Kehutanan.
- Suhardi, M. Na'iem, B. Radjagukguk, O. Karyanto, J. Widada, W.W. Wienarni, and T. Herawan, 2005. Interaction of Progenies/ Provenances of Sengon (*Paraserianthes falcataria*), arbuscular mycorrhizal fungi and rhizobial isolates grown on a ultisol. <http://mycorrhiza.ag.utk.edu.htm>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2005.