**PERKEMBANGAN MIKORIZA ARBUSKULA DAN PERTUMBUHAN BIBIT JATI
(TECTONA GRANDIS LINN. F.) YANG DIINOKULASI SPORA FUNGI MIKORIZA
ARBUSKULA ASAL TANAH HUTAN TANAMAN JATI**

*Development of Arbuscular Mycorrhizae and Growth of Teak (Tectona grandis Linn. F.)
Seedlings Inoculated With Spores of Arbuscular Mycorrhizal Fungi Originated
from Soil in Teak Forest*

Corryanti¹, Joedoro Soedarsono², Bostang Radjagukguk², Siti Muslimah Widyastuti³

¹Perum Perhutani

²Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta

³Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta

ABSTRACT

The objective of the study was to determine the effect of arbuscular mycorrhizal fungi collected from soil of teak plantation forest on the growth of teak seedlings related to mycorrhizal association development. The study utilized the complete randomized design with three levels of inoculant's factor, consisting of control (uninoculated), inoculation with Gigaspora spores and inoculation with Glomus spores inoculated, with ten replications. Spores isolated originated from soil of teak plantation forest in Tangen, Surakarta. The planting medium was a mixture of soil sand at 1:1 (v/v) sterilized prior to be used. NPK mixed fertilizer was applied at amount 0,0625 gr per seedling mixed into the planting medium. Measurements were conducted during a five month period. The data were analyzed using the Analysis of Variance method and differences among treatments analyzed using the Duncan's Multiple Range Test at the 5% level of significance. The results showed that inoculation with the arbuscular mycorrhizal fungi increased teak seedling growth, with Gigaspora sp inoculation giving the highest growth. The uptakes of N, P, K and Ca were increased by both Gigaspora sp and Glomus sp inoculations. The increased seedling growth, was accompanied by large increases in infection percentage as well as sporulation. The highest infection and sporulation were found with Gigaspora sp inoculation. These results showed that in the soil of teak plantation forest in Tangen of the grumusol type, relatively low NPK fertilization (0,0625 gr per seedling) and inoculation with spores of arbuscular mycorrhizal fungi improved teak seedling growth, increased nutrient uptake, as well as improved mycorrhizal association development in teak seedlings.

Key Words : Gigaspora sp, Glomus sp, mycorrhizal association, seedling growth, teak

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh inokulasi jamur mikoriza arbuskula asal tanah hutan tanaman jati terhadap pertumbuhan bibit jati dikaitkan dengan perkembangan mikoriza arbuskula. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap dengan faktor inokulan tiga taraf dan 10 ulangan, yaitu kontrol (tanpa inokulasi), diinokulasi dengan spora *Gigaspora* sp dan *Glomus* sp. Spora hasil isolasi berasal dari tanah hutan tanaman jati di Tangen, Surakarta. Medium pertanaman adalah campuran tanah asal lapangan dan pasir pada rasio 1:1 (v/v) yang disterilkan. Pemupukan dilakukan dengan menambahkan pupuk majemuk NPK sebanyak 0,0625 gr per bibit yang dicampurkan ke dalam medium. Pengamatan dilakukan selama lima bulan. Data dianalisis dengan metode Analisis Sidik Ragam dan selanjutnya dilakukan uji jarak berganda Duncan untuk menentukan besarnya perbedaan antar perlakuan pada taraf signifikan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inokulasi spora jamur mikoriza arbuskula meningkatkan pertumbuhan bibit jati, dengan inokulasi *Gigaspora* sp menghasilkan pertumbuhan tertinggi. Serapan N, P, K dan Ca meningkat dengan inokulasi spora jamur mikoriza arbuskula, baik *Gigaspora* sp maupun *Glomus* sp. Pertumbuhan bibit jati yang meningkat diikuti dengan peningkatan persentase infeksi dan sporulasi jamur mikoriza arbuskula yang besar, dan peningkatan tertinggi terjadi pada bibit yang diinokulasi *Gigaspora* sp. Hasil ini menunjukkan bahwa pada tanah hutan tanaman jati di Tangen bertipe grumusol, pemupukan NPK nisbi rendah (0,0625 gr NPK per bibit) dan inokulasi spora jamur mikoriza arbuskula memperbaiki pertumbuhan, meningkatkan serapan hara serta memperbaiki perkembangan asosiasi mikoriza pada bibit jati.

Kata Kunci : Asosiasi mikoriza, *Gigaspora* sp, *Glomus* sp, jati, pertumbuhan bibit

I. PENDAHULUAN

Mikoriza arbuskula merupakan suatu struktur asosiasi antara fungi akar dengan tanaman tingkat tinggi, yang terbentuk tidak kurang dari 90% tumbuhan berklorofil (Fitter dan Merryweather, 1992; Brundrett *et al.*, 1996; Thorn, 1997; Rajan *et al.*, 2000). Jati (*Tectona grandis* Linn. f.) merupakan satu di antara tanaman tingkat tinggi yang berasosiasi dengan fungi mikoriza arbuskula (FMA), baik di lapangan maupun di lingkungan persemaian (Hardjodarsono, 1977; Ali *et al.*, 1995; Corryanti *et al.*, 2001). Beberapa penelitian terdahulu

dilaporkan bahwa terbentuknya asosiasi mikoriza arbuskula pada jati berpengaruh meningkatkan pertumbuhan bibit dan serapan hara-hara makro seperti N dan P (Corryanti dan Rohayati, 1999; Irianto *et al.*, 2001; Suraya, 2002) serta hara-hara mikro seperti Cu dan Zn (Rajan *et al.*, 2000). Pengamatan tentang FMA asal tanah hutan tanaman jati dan pengaruh asosiasinya terhadap pertumbuhan jati belum banyak diamati secara mendalam. Asosiasi mikoriza yang terjadi secara alamiah berbeda antar satu ekosistem dengan ekosistem lainnya dan asosiasi akan efektif pada kondisi perakaran dan lingkungan yang paling

sesuai (Jeffries & Dodd, 1991; Bagyaraj, 1994; Moutoglis *et al.*, 1996). Oleh karena itu, efektivitas asosiasi mikoriza pada tanaman inang bervariasi antar spesies, varietas (Jeffries dan Dodd, 1991; Bagyaraj, 1994; Rajan *et al.*, 2000), bahkan antar ekosistem (Tommerup, 1994). Perbedaan ini terjadi karena dipengaruhi oleh interaksi antara tanaman inang, FMA dan sifat-sifat kimia serta fisika tanah sebagai lingkungan tumbuh (Moutoglis *et al.*, 1996; Rajan *et al.*, 2000; van der Heijden *et al.*, 2001).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh inokulasi spora FMA asal tanah hutan tanaman jati terhadap pertumbuhan bibit jati dikaitkan dengan perkembangan mikoriza arbuskula.

II. BAHAN DAN METODE

Penelitian dilaksanakan di lokasi pembibitan dan berlangsung selama tujuh bulan, yakni dari Nopember 2005 - Mei 2006. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap satu faktor. Faktor yang diuji terdiri dari tiga taraf, yakni tanpa inokulasi, diinokulasi spora *Gigaspora* sp dan diinokulasi spora *Glomus* sp yang masing-masing diulang sepuluh kali.

Tanah contoh diambil dari lapis olah di sekitar tanaman jati di hutan tanaman jati, BKPH Tangen, KPH Surakarta, Perum Perhutani. Tanah tersebut masuk ke dalam tipe tanah grumusol, dengan sifat kimia yaitu pH 7,6, kandungan karbon 1,8%, N total 0,2%, P tersedia 11,9 ppm, K tertukarkan 0,5 me/100 gr, Ca tertukarkan 6,9 me/100 gr, magnesium tertukarkan 0,9 me/100 gr, kapasitas pertukaran kation 30,8 me/100 gr,

kandungan bahan organik 3,2% dengan fisik tanah bertekstur lempung.

Medium pertanaman terdiri atas campuran tanah contoh dan pasir pada 1:1 (v/v), yang disterilisasi dengan menghembuskan fungisida berbahan aktif benomyl 50% dan diinkubasi selama seminggu sebelum digunakan.

Bibit jati berasal dari perkecambahan benih asal Kebun Benih Klon Jati, Padangan. Akar bibit jati yang siap disapih terlebih dahulu direndam dalam HClO_4 2% selama sepuluh detik, kemudian dibilas dengan akuades yang diulang tiga kali.

Pemberian pupuk dilakukan dengan menambahkan NPK (15:15:15) sebanyak 0,0625 gr per bibit (takaran pupuk berdasarkan hasil penelitian pendahuluan) dan diberikan selama dua kali selama masa percobaan, yaitu satu dan dua bulan setelah penyapihan.

Spora berasal dari hasil isolasi melalui kegiatan pemerangkapan spora (*trapping*) fungi mikoriza. Tipe FMA hasil isolasi yang digunakan adalah *Gigaspora* sp dan *Glomus* sp. Inokulasi dilakukan terhadap bibit jati, yaitu sebanyak 30 spora *Gigaspora* sp (Bierman dan Lindermann, 1983; Tawaraya *et al.*, 1998) atau 50 spora *Glomus* sp (Fakuara, 1988) untuk setiap bibit percobaan. Sebelum diinokulasikan, spora disterilisasi dengan HClO_4 0,2% selama sepuluh detik kemudian dibilas dengan akuades.

Pemeliharaan bibit meliputi penyiraman medium pertumbuhan sesuai kapasitas lapangan. Untuk menghindari evaporasi yang berlebihan dan berkembangnya organisme yang tidak dikehendaki, pot ditutupi dengan kertas aluminium (aluminium foil) yang diberi lubang

agar tetap terjaga aliran pertukaran udara. Pengacakan letak pot dalam rak percobaan dilakukan seminggu sekali. Pengendalian hama dilakukan dengan menyemprotkan fungisida bila diperlukan.

Pengukuran pertumbuhan bibit meliputi tinggi, diameter serta bobot kering bibit diukur secara periodik, yakni sekali dalam dua minggu selama masa percobaan lima bulan. Hara yang dianalisis dalam jaringan tanaman, yaitu N, P K dan Ca melalui proses destruksi basah dan selanjutnya kadar hara dianalisis berdasarkan metode *Kjeldhal* (1985 *cit.* Jones *et al.*, 1991) untuk N, analisis kolorimetrik dengan metode *vanado molybdate yellow* untuk P, dan *atomic absorption spektrofotometri* untuk penetapan K dan Ca (Jackson, 1967). Konsentrasi hara dinyatakan atas dasar bobot kering tanaman dan serapan hara adalah hasil perkalian bobot kering dengan konsentrasi hara (Tan, 1995). Perkembangan asosiasi mikoriza arbuskula meliputi persentase infeksi dalam akar bibit dan perkembangan spora. Pengukuran persentase infeksi akar mengikuti metode pewarnaan Kormanik dan McGraw (Brundrett *et al.* 1996). Akar-akar lateral seberat 2 gr berat segar dan sebanyak 3 ulangan dibersihkan dan direndam dalam larutan KOH 10% dan dibiarkan semalam. Selanjutnya akar dibilas beberapa kali dengan akuades hingga bersih dari larutan KOH, direndam dalam larutan HCl 2% selama 30 menit, lalu dilakukan kegiatan pewarnaan dengan menambahkan *tryphan blue* 0,05% dalam larutan asam laktogliserol secukupnya (1:1:1 masing-masing untuk asam laktat, gliserol dan air) hingga akar terendam. Sebelum akar diamati, dilakukan *destaining* dengan larutan gliserin 50%. Infeksi akar diamati dengan

bantuan kotak bergaris (*gridline intersect*) yang dilekatkan pada dasar cawan petri (Brundrett *et al.*, 1996). Persentase infeksi adalah jumlah akar yang terinfeksi yang dilihat dari banyaknya garis perpotongan pada penunjuk kotak bergaris dibandingkan dengan seluruh akar yang diamati. Pengamatan dilakukan setiap empat minggu. Perkembangan spora diukur pada setiap empat minggu dengan mengambil tanah contoh sebanyak 100 gr. Tanah contoh disaring melalui saringan bertingkat. Hasil saringan yang diamati adalah materi yang tertahan di saringan berukuran 200 dan 300 mesh. Jumlah spora dihitung dengan bantuan penghitung dan mikroskop monokuler (Tommerup, 1994).

Analisis statistik. Data percobaan dianalisis dengan Analisis Ragam dengan uji F terhadap peubah yang diamati. Jika terdapat pengaruh yang signifikan, maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan untuk mengetahui besarnya perbedaan rata-rata antar perlakuan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertumbuhan Bibit Jati

Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan bibit jati meningkat dengan inokulasi spora FMA *Gigaspora* sp dibandingkan kontrol, masing-masing untuk tinggi dan diameter mencapai 21,4% dan 12,0%. Pada bibit jati yang diinokulasi spora *Glomus* sp tidak terjadi peningkatan tinggi bibit, bahkan untuk pertumbuhan diameter inokulasi ini menunjukkan hasil yang lebih rendah dibandingkan kontrol seperti disajikan pada Gambar 1a dan 1b. Bobot kering bibit jati menunjukkan bahwa dengan inokulasi spora FMA terjadi peningkatan sebesar 4,2% - 39,2%

Gambar 1. Pertumbuhan tinggi (a) dan diameter (b) bibit jati selama lima bulan dan (c) bobot kering bibit saat panen lima bulan tanpa atau dengan inokulasi spora fungi mikoriza arbuskula asal tanah hutan tanaman jati

dan 30,4% - 48,7%, berturut-turut untuk bobot kering total dan bobot kering akar. Lebih lanjut, peningkatan bobot kering terbesar terjadi pada bibit jati yang diinokulasi dengan spora *Gigaspora* sp seperti disajikan pada Gambar 1c.

Perbedaan pertumbuhan bibit jati dengan inokulasi tipe FMA yang berbeda, dilaporkan juga oleh Rajan *et al.* (2000), yaitu dengan inokulasi beberapa isolat FMA. Perbedaan ini pada perkembangan lanjut akan memengaruhi efektivitas asosiasi mikoriza arbuskula pada tanaman inangnya (Setiadi, 1999; van der Heijden & Kuyper, 2001). Perbedaan yang signifikan antar perlakuan terjadi pada parameter tinggi bibit, yaitu atas inokulasi *Gigaspora* sp dibanding kontrol dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar perlakuan pada parameter diameter. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inokulasi spora FMA menghasilkan pertumbuhan bibit yang nisbi lebih tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan takaran pemupukan 0,0625 gr NPK per bibit yang diberikan ke dalam medium pertanaman tanah

grumusol asal Tangen disertai inokulasi FMA dapat meningkatkan pertumbuhan bibit. Inokulasi dengan *Gigaspora* sp yang menghasilkan respon yang lebih besar dibandingkan *Glomus* sp, diduga karena perbedaan fungsi dan mekanisme asosiasi fungi mikoriza dalam memengaruhi pertumbuhan inang (Harley, 1994). Hal ini diduga terjadi karena adanya interaksi di antara faktor-faktor yang menentukan, seperti karakteristik tanaman inang, sifat fisika dan kimia tanah dan karakteristik FMA itu sendiri (Tommerup, 1994). Pengamatan mekanisme asosiasi kedua tipe FMA ini pada tanaman inang belum banyak diketahui (O'Keeffe & Sylvia, 1991; Nagahashi *et al.*, 1994).

Sejalan dengan perubahan tinggi dan diameter, bobot kering tanaman meningkat paling besar pada bibit jati yang diinokulasi FMA *Gigaspora* sp. Sebaliknya, dengan inokulasi *Glomus* sp bobot kering bibit tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan peningkatan bobot kering panen sangat ditentukan oleh tingkat kesesuaian inokulan

dengan tanaman inang sehingga memengaruhi pertambahan bobot kering. Peningkatan yang signifikan dalam bobot kering total nisbi terhadap kontrol terjadi pada bibit jati yang diinokulasi *Gigaspora* sp, dan ini mengindikasikan bahwa inokulasi dengan tipe inokulan tersebut dapat meningkatkan bobot total bibit jati. Sebaliknya, pada bibit jati dengan bobot kering rendah, yaitu pada bibit yang diinokulasi *Glomus* sp, peningkatan yang signifikan hanya terjadi pada bobot kering akar. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa inokulasi dengan spora *Glomus* sp kurang memberikan peningkatan pertumbuhan bagian pucuk bibit jati, tetapi sebaliknya meningkatkan pertumbuhan bagian akar. Antar inokulan tipe FMA memiliki peran dan karakteristik yang spesifik terhadap asosiasi mikoriza yang terbentuk, hal ini tampak dari hasil bobot kering bibit lebih besar dibandingkan kontrol.

B. Serapan Hara Pada Bibit Jati

Pemberian inokulan spora FMA menghasilkan peningkatan serapan hara-hara makro dalam bibit jati. Dengan inokulasi spora *Gigaspora* sp, serapan hara N, P, K dan Ca meningkat berturut-turut sebesar 76,5%, 200%, 29,7% dan 125% dibandingkan kontrol, sedang inokulasi spora *Glomus* sp menghasilkan peningkatan berturut-turut sebesar 152,9%, 200%, 24,3% dan 59,1%. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap tipe inokulan menghasilkan respon yang berbeda dalam serapan hara makro pada bibit jati dan antar hara makro menunjukkan peningkatan yang bervariasi satu dengan lainnya. Peningkatan serapan hara N tertinggi terjadi dengan inokulasi spora *Glomus* sp; serapan hara P nisbi sama pada inokulasi kedua inokulan, sedangkan serapan K

dan Ca lebih tinggi pada inokulasi *Gigaspora* sp yang disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Serapan hara N, P, K dan Ca dalam jaringan bibit jati umur lima bulan

Perbedaan mekanisme fungsi asosiasi antar FMA di dalam tanaman inang (Tommerup, 1994) menghasilkan respon serapan hara pada tanaman inang yang berbeda. Peningkatan serapan hara utama dalam penelitian ini membuktikan bahwa dalam tingkat pemupukan NPK 0,0625 gr per bibit dengan pemberian inokulan akan meningkatkan serapan hara makro N, P, K dan Ca. Serapan hara P menunjukkan nilai yang paling rendah dibandingkan serapan hara lainnya, namun demikian peningkatannya paling besar di antara hara lainnya. Ini membuktikan keterlibatan FMA dalam menyerap hara P. Dalam penelitian yang sejalan dilaporkan, bahwa pada tanaman diinokulasi dengan spora *Gigaspora* sp yang diketahui jumlahnya dijumpai kandungan P, K, Mg dan Cu yang tinggi, tetapi rendah untuk kandungan Ca (Chan *et al.*, 1981). Inokulasi *Glomus* sp menunjukkan tanggapan serapan hara N lebih besar dibandingkan inokulasi *Gigaspora* sp. Serapan P, K dan Ca pada bibit jati meningkat sebanding antara yang diinokulasi *Gigaspora* sp

dengan yang diinokulasi *Glomus* sp. Perbedaan tipe inokulan yang berbeda memiliki fungsi dan reaksi yang berbeda dalam lingkungannya, termasuk saat FMA menginfeksi dan berasosiasi dengan akar tanaman (Mason *et al.*, 1992; Tommerup, 1994), dan mekanisme tentang penyerapan hara oleh masing-masing tipe FMA masih belum banyak diketahui (Hawkins *et al.*, 2000).

C. Persentase Infeksi Akar

Hasil pengamatan antar bibit jati yang diinokulasi *Gigaspora* sp dengan *Glomus* sp menunjukkan pola tanggapan infeksi akar yang berbeda. Pada usia bibit jati 1,5 bulan infeksi akar yang diinokulasi *Glomus* sp baru mencapai 10%, sementara belum terlihat pada bibit yang diinokulasi *Gigaspora* sp. Selanjutnya, pada bibit jati berusia 2,5 bulan respon infeksi kedua inokulan mulai terlihat responsivitasnya dan meningkat dengan bertambahnya umur bibit seperti yang disajikan pada Gambar 3a. Infeksi akar tertinggi terlihat pada bibit jati yang diinokulasi *Gigaspora* sp yang mencapai hingga 78,12% dan lebih tinggi dari yang diinokulasi dengan *Glomus* sp yang mencapai hingga 54,02%. Persentase infeksi inokulasi *Gigaspora* sp menunjukkan pergerakan meningkat dengan makin bertambah usia bibit jati, sebaliknya terjadi pergerakan infeksi akar yang nisbi lebih rendah yang diinokulasi *Glomus* sp. Pemupukan takaran yang nisbi rendah dalam penelitian ini dapat menggiatkan berkembangnya infeksi dalam perakaran bibit tanaman inang (Clark, 1997; Sylvia, 2005). Di samping itu, infeksi akar pada tanaman juga dipengaruhi langsung dan tidak langsung oleh faktor-faktor lingkungan yang selalu dinamis, sehingga memengaruhi

kecepatan infeksi (Moutoglis *et al.*, 1996; van der Heijden *et al.*, 2001). Ada tiga mekanisme yang menyebabkan terjadinya tanggapan perkembangan asosiasi mikoriza atas kondisi lingkungan yang memengaruhinya, yaitu: a) perubahan anatomi dan fisiologi yang terjadi di dalam akar sehingga menentukan perkembangan fungi; b) adanya perubahan kuantitatif dan kualitatif eksudat akar yang memengaruhi perkembangan miselium ekstra; c) aliran karbon dari inang ke fungi akan menentukan perkembangan miselium dan spora fungi (Nagahashi *et al.*, 1996).

Pengamatan sporulasi dalam zona rizosfer bibit jati mulai terlihat setelah bibit berumur 1,5 bulan. Sporulasi dalam 100 gr tanah menunjukkan inokulasi *Gigaspora* sp menghasilkan spora dalam kisaran 47 - 159 spora dalam 100 gr tanah, sedang inokulasi *Glomus* sp dalam kisaran 47 - 53 spora dalam 100 gr tanah. Perkembangan sporulasi inokulasi *Glomus* sp menunjukkan pola perkembangan yang nisbi mendatar (stagnasi) dibandingkan inokulasi *Gigaspora* sp yang cenderung meningkat seperti disajikan pada Gambar 3b. Dengan pola yang berbeda ini menunjukkan respon sporulasi antar tipe FMA memiliki ciri masing-masing.

Abbot *et al.* (1992) dan Brundrett *et al.* (1999) mengungkapkan spora *Glomus* sp, dalam berbagai situasi lingkungan sering tidak berkembang dengan baik dibanding komponen-komponen siklus hidup fungi lainnya, seperti hifa dan propagul lainnya, sementara *Scutellospora* sp, *Gigaspora* sp, atau *Acaulospora* sp, spora-sporanya banyak dijumpai pada berbagai tipe tanah. Untuk itu tanah hutan tanaman jati di Tangen perolehan spora *Glomus* sp dalam tanah tampak jauh lebih sedikit dibandingkan per-

Gambar 3. Persentase infeksi akar (a) dan sporulasi (b) dengan atau tanpa inokulasi spora fungi mikoriza arbuskula pada bibit jati selama lima bulan

olehan spora *Gigaspora* sp. Pemberian pupuk NPK dengan takaran 0,0625 gr per bibit menghasilkan sporulasi yang meningkat tajam, yaitu mencapai 47 spora dalam 100 gr tanah pada usia bibit mencapai 1,5 bulan. Perkembangan lebih lanjut sporulasi pada takaran ini menunjukkan *Gigaspora* sp menghasilkan sporulasi yang tinggi dan pada akhir pengamatan mencapai 159 spora per 100 gr tanah, sementara *Glomus* sp mencapai 53 spora per 100 gr tanah. Dalam Mason *et al.* (1992) dan Clark (1997) disebutkan spora fungi mikoriza akan meningkat laju pertumbuhannya pada takaran pemupukan yang menggiatkan terbentuknya spora. Penelitian ini menunjukkan takaran pemupukan yang rendah mencukupi kebutuhan hara pertumbuhan bibit jati, sementara perkembangan FMA merespon positif dilihat dari sporulasi dan infeksi akar. Hasil ini membuktikan setiap tipe FMA akan menanggapi lingkungan dengan perbedaan kuantitas sporulasi. Diduga sifat-sifat kimia fisika tanah medium dan praktik pengelolaan tanah memengaruhi

kelangsungan berkembangnya spora *Glomus* sp yang nisbi terhambat.

IV. KESIMPULAN

1. Inokulasi spora FMA di tanah grumusol asal hutan tanaman jati Tangen meningkatkan pertumbuhan bibit jati. Inokulasi dengan spora *Gigaspora* sp menghasilkan pertumbuhan tertinggi, berturut-turut pertumbuhan tinggi, diameter dan bobot kering yaitu 21,4%, 12% dan 39,2% dibandingkan kontrol.
2. Serapan hara makro N, P, K dan Ca meningkat dengan inokulasi spora FMA, *Gigaspora* sp dan *Glomus* sp, berturut-turut meningkat sebesar 76,47% - 152,94%, 200%, 24,32% - 29,73% dan 59,09% - 125% dibandingkan kontrol.
3. Pertumbuhan yang meningkat diikuti dengan meningkatnya persentase infeksi dan sporulasi FMA yang lebih besar, dan peningkatan terbesar terjadi pada bibit jati yang diinokulasi *Gigaspora* sp, mencapai 78,12%.

4. Tanah hutan tanaman jati di Tangen bertipe grumusol dengan pemupukan NPK 0,0625 gr per bibit dengan inokulasi spora FMA dapat memperbaiki pertumbuhan, serapan hara makro serta memperbaiki perkembangan asosiasi mikoriza bibit jati dibandingkan tanpa diberi inokulan spora FMA.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbot, L.K., Robson, A.D., Jasper, D.A., Gaze, C., 1992. *What is the role of VA-mycorrhizal hyphae in soil?* In.: Read, D.J., Lewis, D.H., Fitter, A.H., Alexander, I.J. (Eds) *Mycorrhizas in ecosystem*. International University Press, Cambridge. CAB. p.:26-36.
- Ali, S.S., Gupta, N. dan Rahangdale, R., 1995. *Ecology of vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi in tropical forest of central India*. In. *Biology and biotechnology of mycorrhizae*. Biotrop special publication No. 56, SEAMEO BIOTROP, Bogor. p. 49-53.
- Bagyaraj, 1994. *Handbook of applied mycology: Ecology of VAM*. Marcel Decker, Inc New York. p. 1-34.
- Brundrett M., Bougher N., Dell B, Grove T. dan Malajczuk N., 1996. *Working with mycorrhizas in forestry and agriculture*. ACIAR Monograph 32, Canberra, Australia.
- Brundrett M.C., Abbot L.K. dan Jasper D.A., 1999. *Glomalean mycorrhizal fungi from tropical Australia*. *Mycorrhiza* 9:305-314.
- Chan, SK, Thai, L.H., and Abas, A.G., 1981. *Study of cassava response to phosphorus with and without mycorrhizal inoculation*. Malaysian society of soil science. P: 383-393.
- Clark, R.B., 1997. *Arbuscular mycorrhizal adaptation, spore germination, root colonization, and host plant growth and mineral acquisition at low pH*. *Plant and Soil* 192: 15-22.
- Corryanti dan Rohayati, 1999. *Studi efektivitas jenis endomikoriza pada pembibitan jati*. Prosiding Seminar Nasional Mikoriza I, Bogor p. 154-161.
- Corryanti, Maryadi F. dan Irmawati, 2001. *Arbuscular mycorrhizas fungi under teak Seed Orchard*. Poster presented on the Third International Conference on Mycorrhizas: Diversity and integration in Mycorrhizas 8-13 July, Adelaide, South Australia.
- Fitter, A. H. dan Merry-Weather J. W., 1992. *Why are some plants more mycorrhizal than others? An ecological enquiry*. In. D J Read, D H Lewis, A H Fitter, I J Alexander (eds) *Mycorrhizas in Ecosystems*. CAB International, pp: 26-36.
- Hardjodarsono, 1977. *Jati*. Edisi kedua. Bagian Penerbit Yayasan Pembina Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Harley, J.L., 1994. *The state of the art*. In *Techniques for Mycorrhizal Research* (Eds. Noris J.R., Read, D.J., Varma, A.K.) . Academic Press London. 1-24.
- Hawkins, H., Johansen, A., George, E., 2000. *Uptake and transport of organic and inorganic nitrogen by arbuscular mycorrhizal fungi*. *Plant and Soil* 226: 275-285.

- Irianto, R.S.B., Santoso, E., Corryanti, R. Prematuri, M. Turjaman, E. Widyati, I.R. Sitepu, S. Santoso, 2001. *Pengaruh penggunaan cendawan mikoriza arbuskula, pupuk dan media tumbuh terhadap pertumbuhan bibit jati (Tectona grandis L. F.)*. Kerjasama penelitian Pusbang SDH Perum Perhutani-Puslitbanghut dan KA. Bogor. (publikasi terbatas)
- Jackson, M. L., 1967. *Soil chemical analysis*. Prentice-Hall of India Private Limited. New Delhi.
- Jeffries, P. dan Dodd, J.C., 1991. *The use of mycorrhizal inoculants in forestry and agriculture*. In. Arora, D.K., Rai, B., Mukerji, K.G., Knudsen, G.R. (Eds), *Handbook of applied mycology*. Soil and Plants Volume 1. p.155-185.
- Jones, Jr. J. Benton, Benyamin, W, Mills, H.A., 1991. *Plant analysis handbook*. Micro-macro Publishing, Inc.
- Mason, B.A., Musoko, M.O., Last, F.T., 1992. *Short-term changes in Vesicular-Arbuscular Mycorrhizal Spore Populations in Terminalia Plantations in Cameroon*. In: Read, D.J., Lewis, D.H., Fitter, A.H., Alexander, I.J., *Mycorrhizas in ecosystems*. C.A.B. International. University Press, Cambridge. P.:261-267.
- Moutoglis, P, and Widden, P., 1996. *Vesicular-arbuscular mycorrhizal spore populations in sugar maple (Acer saccharum marsh. L) forest*. Mycorrhiza 6: 91-97.
- Nagahashi, G., Douds Jr, D.D., Abney, G.D., 1996. *Phosphorus amendment inhibits hyphal branching of the VAM fungus Gigaspora margarita directly and indirectly through its effect on root exudation*. Mycorrhiza 6: 403-408.
- O'Keefe, D.M. dan Sylvia, D.M., 1991. *Mechanisms of the vesicular-arbuscular mycorrhizal plant-growth response*. In. Arora, D.K., Rai, B., Mukerji, K.G., Knudsen, G.R. (Eds), *Handbook of applied mycology*. Soil and Plants Volume 1. p.35-54.
- Rajan, S.K., Reddy B.J.D, Bagyaraj, D.J., 2000. *Screening of arbuscular mycorrhizal fungi for their symbiotic efficiency with Tectona grandis*. Forest ecology and management 126 (2000) 91-95.
- Setiadi, Y., 1999. *Status penelitian pemanfaatan cendawan mikoriza arbuskula untuk rehabilitasi lahan terdegradasi*. Dalam. Prosiding Seminar Nasional Mikoriza I. Bogor 15-16 Nopember 1999.
- Suraya, 2002. *Uji kompatibilitas Cendawan mikoriza arbuskula pada beberapa klon jati kultur jaringan*. Bulletin Pusbanghut (Juni 03): 11. (publikasi untuk kalangan terbatas)
- Sylvia, D.M., 2005. *Mycorrhizal symbioses*. In. Sylvia, D.M., Fuhrmann, J.J, Hartel, P.G., Zuberer, D.A. (Eds). *Principles and applications of soil microbiology*. Upper Saddle River, New Jersey. p. 263-282.
- Tan, K. H., 1995. *Soil sampling, preparation, and analysis*. Marcel Dekker, Inc. New York.
- Thorn, G., 1997. *The fungi in soil*. In. Modern Soil Mycorobiology, Elsas et al (eds). Marcel Dekker, New York - Basel. pp: 63-127.

- Timothy, C., Paulitz and Linderman, R.G., 1991.
Mycorrhizal interactions with soil organisms. In Handbook of applied Mycology Vol. 1: Soil and Plants. Arora D. K., Rai, B, Mukerji, K.G., Knudsen, G.R. (Eds). Marcel Dekker, Inc. New York-Basel. P: 77-130.
- Tommerup I. C., 1994. *Methods for the study of the population biology of vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi*. In. Techniques for mycorrhizal research. J.R. Norris, D.J. Read, A.K. Varma (eds). Academic Press. London.
- Van der Heijden, E.W., Kuyper, T.W., 2001.
Does origin of mycorrhizal fungus or mycorrhizal plant influence effectiveness of the mycorrhizal symbiosis? Plant and Soil 230: 161-174.