PENGEMBANGAN PENANDA MIKROSATELIT PADA *Pinus merkusii*
MENGUNAKAN METODE *DUAL SUPPRESSION* DAN *SCREENING* PENANDA
Development of microsatellite markers for Pinus merkusii using a dual suppression
and primer screening methods

I.L.G. Nurtjahjningsih

Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 15, Purwobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta 55582
Telp. (0274) 895954, 896080, Fax. (0274) 896080

ABSTRACT

Aims of this study were to develop and characterize microsatellite markers for Pinus merkusii. Twelve markers have been developed by dual suppression method and 12 markers from three species of Pinus i.e. P. densiflora, P. pinaster and P. taeda were screened to amplify microsatellite in P. merkusii. The results showed that 5 out of the 12 developed microsatellite markers by dual suppression amplified at a single polymorphic locus; otherwise there was no polymorphic locus of the 12 screened microsatellite markers. However, it is difficult to compare the efficiency of these two methods because of the limited number of the screened primers used in this study.

Key Words : *Pinus merkusii, microsatellite, dual suppression, primer screening*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan mengkarakterisasi penanda mikrosatelit pada *P. merkusii*. Duabelas penanda mikrosatelit dikembangkan menggunakan metode dual suppression dan 12 penanda dari 3 jenis Pinus yang lain, yaitu *P. densiflora*, *P. pinaster* dan *P. taeda* diamplifikasikan pada *P. merkusii* melalui metode *screening* penanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 5 dari 12 penanda mikrosatelit yang dikembangkan melalui metode *dual suppression* merupakan penanda yang polimorfik; sebaliknya tidak ada penanda yang polimorfik dari 12 penanda yang dikembangkan menggunakan metode *screening* penanda. Walaupun demikian, masih sulit untuk membandingkan metode yang lebih efisien karena jumlah primer yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas.

Kata Kunci : *Pinus merkusii, mikrosatelit, dual suppression, screening penanda*

I. PENDAHULUAN

Mikrosatelit atau *Simple Sequence Repeat* (SSR) merupakan susunan ulangan 1-6 basa nukleotida. Amplifikasi mikrosatelit relatif stabil dan mempunyai tingkat polimorfisme yang tinggi sehingga memberikan hasil yang akurat untuk menduga keragaman genetik di dalam maupun antar populasi (Tsuda dan Ide, 2005). Mikrosatelit bersifat kodominan dan diwariskan dari tetua kepada keturunannya, sehingga penanda ini sangat sesuai untuk analisis tetua (Chaix dkk., 2003). Karena mempunyai kestabilan dan sifat pembeda yang tinggi, mikrosatelit dapat diaplikasikan untuk menyusun peta genetik (Moriguchi dkk., 2003).

Dengan pertimbangan efisiensi biaya dan waktu, penanda mikrosatelit dikembangkan dengan beberapa metode di antaranya *dual suppression* (Lian dkk., 2000) dan *screening* penanda (Echt dkk., 1999; Soranzo dkk., 1998). *Dual suppression* adalah metode untuk mengisolasi mikrosatelit target spesies tanpa pengkayaan sekuen basa pada saat penyusunan pustaka DNA. Sehingga diharapkan amplifikasi primer yang diperoleh dengan metode ini akan memberikan hasil yang lebih baik. Walaupun *dual suppression* dikembangkan untuk *P. densiflora* (Lian dkk., 2000), namun metode ini telah banyak diterapkan untuk pengembangan penanda mikrosatelit jenis konifer lainnya seperti *Abies firma* (Saito dkk., 2005), tanaman mangrove (Islam dkk., 2004) maupun jenis alga (Nagai dkk., 2004). Metode ini terdiri dari tiga langkah penting, pertama adalah amplifikasi inter mikrosatelit menggunakan sekuen primer mikrosatelit untuk memproduksi *flanked fragment microsatellite*. Kedua, setelah kloning dan

mensekuen fragmen DNA, kemudian merancang sebuah primer menggunakan area antara dua sekuen mikrosatelit. Langkah terakhir adalah merancang sisi lain dari sekuen mikrosatelit (Lian dkk., 2000). Namun demikian, pengembangan penanda mikrosatelit dengan penyusunan pustaka DNA ini memerlukan biaya tinggi dan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, pengembangannya sering ditempuh melalui *screening* terhadap penanda mikrosatelit dari jenis-jenis lain yang sudah ada (Echt dkk., 1999). Aplikasi *screening* penanda mikrosatelit *P. strobus* dan *P. radiata* telah berhasil dilakukan terhadap 10 jenis konifer lainnya (Echt dkk., 1999). Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan *screening* akan semakin tinggi apabila diamplifikasikan pada jenis yang secara taksonomi mempunyai hubungan kekerabatan (Echt dkk., 1996).

Pinus merkusii merupakan satu-satunya genus *Pinus* yang tersebar secara alami di Asia Tenggara. Di Indonesia, *P. merkusii* ditemukan secara alami di Aceh, Tapanuli dan Gunung Kerinci (Cooling, 1968). Studi keragaman genetik pada populasi *P. merkusii* telah dilakukan berdasarkan analisis isozim (Changtragoon dan Finkeldey, 1995; Siregar dan Hattermer, 2004). Untuk meningkatkan efisiensi manajemen kebun benih dalam rangka menghasilkan benih unggul, sistem perkawinan dan aliran gen di dalam kebun benih *P. merkusii* harus bisa dipastikan. Penanda mikrosatelit sering diaplikasikan untuk menduga sistem perkawinan dan aliran gen dengan akurasi yang tinggi. Namun penanda mikrosatelit pada *P. merkusii* belum pernah dikembangkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan mengkarakterisasi penanda mikro-

satelit pada *P. merkusii* dengan dua pendekatan, yaitu *dual suppression* dan *screening* penanda.

II. BAHAN DAN METODE

Dua metode yang digunakan untuk mengembangkan penanda mikrosatelit pada *P. merkusii* yaitu (1) metode *dual suppression* dan (2) metode *screening* penanda.

1. Metode *dual suppression*

Metode ini dilakukan berdasarkan prosedur yang telah dikembangkan oleh Lian dkk. (2000). Bahan tanaman yang digunakan untuk template DNA adalah 100 mg sampel daun dari satu kecambah *P. merkusii* umur dua minggu. Kecambah tersebut diperoleh dengan cara mengecambahkan biji dari satu pohon plus yang dipilih acak di kebun benih di Jember, Jawa Timur.

DNA diekstraksi menggunakan metode modifikasi CTAB (Zhou dkk., 1999). Pustaka DNA disusun dengan cara memotong genom DNA menggunakan enzim restriksi yaitu *AfaI*, *AluI*, *EcoRV*, *HaeIII*, *HincII* dan *SspI*. Kemudian potongan DNA ini diikat dengan adaptor primer AP₁ yaitu sekuen 48-mer (5'-GTAATAC GACTCACTATAGGGCACGCGTGGTTCGAC GGCCCGGGCTGT-3') dan 8-mer yang ditangkap oleh residu amino 5'-ACCAGCCC-NH₂-3' menggunakan *DNA Ligation Kit* (Takara Shuzo Co.), di sisi lain DNA, disisipi penanda mikrosatelit (AC₁₀) dan diikat dengan adaptor primer AP₂ yaitu 5'-CTATAGGGCACGCG TGGT-3'.

Subkloning hasil pustaka DNA dilakukan menggunakan *pT7 Blue Vector Kit* (Novagen, WI). Hasil pustaka DNA disisipkan dalam

bakteri *Escherichia coli*, kemudian ditumbuhkan pada medium agar selama 16 jam. Keberhasilan proses ligasi plasmid DNA ini ditandai dengan titik-titik yang berwarna putih pada medium agar. Hasil koloni PCR dielektroforesis menggunakan gel. Pita-pita yang berukuran 350-500 bp dipilih dan disekuen menggunakan *Sequencer DNA-SQ 5500* (Hitachi Co. Tokyo).

Sekuen primer dirancang pada dua sisi area mikrosatelit. Sekuen primer pada satu sisi area mikrosatelit terdiri dari inisiasi primer 1 (IP₁) dan IP₂. IP₁ merupakan sekuen basa dengan panjang 27 bp, sedangkan IP₂ berukuran 21 bp. Suhu *annealing* masing-masing primer ditetapkan berdasarkan persentase jumlah oligo GC. Untuk merancang sekuen primer pada sisi lain area mikrosatelit (IP₃), dilakukan *nested PCR*, yaitu PCR yang dilakukan dengan 2 tahap: PCR primer dan sekunder. PCR primer adalah memasangkan antara IP₁ dengan AP₁, dan PCR sekunder adalah menggabungkan hasil PCR primer, IP₂ dan AP₂. Untuk memperoleh sekuen IP₃ dilakukan PCR terhadap hasil PCR sekunder dengan ditambah oligo A, C, T, G. Sekuen basa IP₃ terdiri dari 21 bp.

Pengujian pasangan primer dilakukan dengan cara memasangkan IP₁ dengan IP₃ atau IP₂ dengan IP₃. Amplifikasi pasangan primer dicek melalui elektroforesis menggunakan 1,5% agarose.

2. Metode *screening* penanda

Metode *screening* dilakukan terhadap 5 penanda mikrosatelit *P. densiflora*, 3 penanda untuk *P. pinaster* dan 4 penanda untuk *P. taeda* (Tabel 1), kemudian diamplifikasikan pada *P. merkusii*.

Tabel 1. Pasangan-pasangan primer mikrosatelit dari beberapa genus *Pinus* yang diamplifikasikan pada *Pinus merkusii*

Lokus	Kisaran ukuran allele (bp)	Jumlah allele	Motif ulangan basa	Pasangan primer (5'→3')
Pasangan primer mikrosatelit <i>Pinus densiflora</i> (Lian dkk. 2000)				
pde3	175-258	13	(AC) ₁₂ AAA(AC) ₁₅ AAAA(CG) ₃ (AC) ₆ AAA(AC) ₁₂ AAA (AC) ₁₀	F: GTTGATACAATCATTTGTTGTAACAC R: CAAATATTTATATTCCCTACGTG
pde5	116-235	18	(CA) ₅ C(CA) ₅₁	F: AAGCACCTTTCTCAATGCAC R: ATAAAGAGGCTACATGGTCCC
pde6	139-143	3	(CA) ₈	F: AATGTAATCCCTTAGCACCTT R: TTCTTTGTGCATTGAGAAGG
pde13	183-211	8	(CA) ₃₀	F: AATATTCCTAACGACCCCTATCTGT R: TCTATATGCATGTATGATC
pde14	182-236	16	(TC) ₁₈ (AC) ₁₄	F: TCATAGGTACAAAGTCATTACACC R: CTTCCTCCACTTGACTTGAAAGT
Pasangan primer mikrosatelit <i>Pinus pinaster</i> (Mariette dkk. 2001)				
FRPP91	168	25	(CT) ₂₀	F: GTACTCCACACATAAAATGAGACTT R: CCGAAATACATTGCAGGTTA
FRPP94	162	17	(CT) ₂₂	F: GGCAAAACCTCTTTTAGAGTGC R: TTGTGCGATTTTCTTGAAATCTAA
ITPH4516	159	20	(CT) ₂₇	F: TGATGCAAAACAAGTTCCATG R: AGCACTCGCTAAACTATGAAAGG
Pasangan primer mikrosatelit <i>Pinus taeda</i> (Elsik dkk. 2000)				
PtTX2037	197-261	15	(GTGA) ₈ (GT) ₁₄	F: GCCTTTAGATGAATGAACCCA R: TAAAGGGGATATATATAGAGTTT
PtTX3030	295-368	17	(TA) ₅ ...(GGT) ₁₀	F: AATGAAAAGGCAAGTGTG R: GAGATGCAAGATAAAGGAAGTT
PtTX3032	277-365	26	(GAT) ₃₅ (GAC) ₃ (GAT)(GAC) ₈ ...(GAT) ₆	F: CTGCCACACTACCAACC R: AACATTAAGATCTCATTCAA
PtTX3037	101-179	28	(GA) ₉ ...(CAA) ₁₅	F: CGTTTGGAGCACTACTT R: AAGTCACCTTAATGCAATATGTA

Karakterisasi penanda mikrosatelit

Untuk menguji kestabilan karakteristik penanda mikrosatelit yang telah dikembangkan, *template* DNA diisolasi dari 64 sampel daun

pohon plus yang dipilih secara acak di kebun benih *P. merkusii* yang terletak di Jember, Jawa Timur. Beberapa penelitian melaporkan bahwa 17-18 sampel daun individu yang dipilih secara

acak di arboretum (Lian dkk., 2000) atau 28 pohon plus yang dipilih secara acak di populasi alam (Moriguchi dkk., 2003) cukup representatif untuk menguji kestabilan karakteristik penanda mikrosatelit. Sampel dikeringkan menggunakan silika gel dan disimpan pada suhu ruang sampai dilakukan ekstraksi. Ekstraksi dilakukan menggunakan *DNeasy Plant Mini Kit* (Qiagen). Untuk mencirikan amplifikasi penanda tersebut, primer-primer harus dibuat dalam bentuk *flourescent*. Reaksi PCR menggunakan *PCR Thermal Cycler* (Takara) dan *Gene Amp PCR system 9700* (Applied Biosystems). Reaksi PCR terdiri dari 10 μ L campuran 5 ng *template* DNA, 10 x buffer, 2,5 mM $MgCl_2$, 0,2 mM dNTP, 0,5 μ M masing-masing pasangan primer, dan *AmpliTaq Gold Polymerase* (Applied Biosystems). Kondisi PCR terdiri dari 1 siklus $95^\circ C$ 10 menit, 30 siklus terdiri dari *denaturation* $94^\circ C$ 30 detik, *annealing* (Ta, lihat Tabel 2 dan Tabel 3) 30 detik, dan *extension* $72^\circ C$ 30 detik, serta 1 siklus $72^\circ C$ 12 menit. Analisis fragment DNA menggunakan *Gene Analyzer ABI 3100* (Applied Biosystems).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Amplifikasi penanda mikrosatelit pada *Pinus merkusii*

Keberhasilan amplifikasi pasangan primer mikrosatelit baik yang dikembangkan dengan metode *dual suppression* maupun *screening* penanda dikategorikan dalam allele yang polimorfik, multi allele dan allele yang sulit dibaca (Gambar 1.). Allele yang polimorfik merupakan allele tunggal yang mudah dibaca dan ukuran allele (dalam bp) per lokus yang bervariasi baik allele yang homozigot maupun heterozigot. Allele yang dikategorikan sebagai multi allele adalah penampakan beberapa allele dalam satu lokus. Allele ini tidak dapat dianalisis mengingat suatu sampel maksimum hanya memiliki satu allele (jaringan haploid) atau dua allele (jaringan diploid). Sedangkan allele yang sulit dibaca adalah apabila pasangan primer dicobakan pada sampel progeni (*offspring*) menghasilkan penampakan tinggi allele dalam *Gene Analyzer* yang hampir tidak terlihat (Gambar 1 paling kanan: allele dengan ukuran 115 bp), namun apabila dicobakan pada sampel pohon induknya, allele tersebut terlihat dengan jelas. Dalam hal ini,

Gambar 1. Amplifikasi penanda mikrosatelit pada *Pinus merkusii*

hanya allele polimorfik yang bisa digunakan untuk analisis genetik.

Metode *dual suppression*

Dari 12 pasang primer yang diperoleh menggunakan metode *dual suppression*, 11 pasang

teramplifikasi dan 1 pasang tidak teramplifikasi. Dari 11 pasang yang teramplifikasi, 5 primer menunjukkan allele polimorfik, 4 primer menghasilkan multi allele, dan 2 primer menghasilkan allele monomorfik (Tabel 2).

Tabel 2. Penanda mikrosatelit *Pinus merkusii* dikembangkan menggunakan metode *dual suppression*

Lokus	Ukuran allele (bp)	Ta (°C)	Motif ulangan basa	Pasangan primer (5'→3')	Amplifikasi
pm01	109	56	(AC) ₁₂	F:TCCCACTAATCACTTTGAAAG R:AGAGAAGGCACGATTTTGTC	Polimorfik
pm02	166	56	(GT) ₈ (GGT) ₂	F:GGTTTTAATTGGCCATTGG R:GCCAAACGAATTTTGAATGG	Tidak teramplifikasi
pm03	229	56	(ACA) ₂ (CA) ₄ GA(CA) ₂ GA(CA) ₂ (TA) ₂ TTT(CCTT) ₃	F:GAAACTCTTCATGCGGCTCG R:CTTATCAACTTGCATCACCC	Multi allele
pm03a	95	56	(ACA) ₂ (CA) ₄ GA(CA) ₂ GA(CA) ₂ (TA) ₂ TTT(CCTT) ₃	F:ATTGGAAAGATGTGCAGGCA R:TAATCATGAGGTACTAGGTC	Multi allele
pm04	92	56	(AC) ₁₀	F:CATAATCCAAGGAGTCAAGG R:CTCTAAGTAGGACAAGGCCT	Monomorfik
pm05	105	52	(GC) ₉	F:TGGAGATCTACCACTTTTTC R:GAGTCTAATTGCAAACCCCA	Polimorfik
pm06	116	52	(CA) ₄ (AG) ₂ (AT) ₄ (GT) ₇	F:CCTTTAGGTATCATGAAGTC R:ATCTGGCATAAAGAGCATTG	Multi allele
pm07	203	52	(AC) ₈ (AT) ₄	F:GAATCTAAGCATATGAAATGAG R:CTTGTTAATGCTACTAGTTATG	Polimorfik
pm08	132	59	(AT) ₂ (GT) ₁₀	F:TAAAGGGGCAGCTGCTACAACC AATGG R:GCTTCAATCTATTGACCCCAT	Monomorfik
pm09	155	56	(GT) ₁₇ (AT) ₂	F:CGGCATTGCTAAAGGGAGAAA TGCAA R:CACATGGCCAATTTCTTTATGC	Multi allele
pm09a	81	52	(GT) ₁₇ (AT) ₂	F:CCTTCTCATTTTCGATATGCAC R:ATTAAAGGTTATATGGGGC	Polimorfik
pm12	188	59	(GT) ₁₁ (AT) ₅	F:TATGCTGCGTTTATATGTATAA GTGTC R:GAACAATCATTGCGGGTCCCG	Polimorfik

Kestabilan pasangan primer yang menghasilkan allele polimorfik dan monomorfik yang dihasilkan dengan metode *dual suppression* ditampilkan pada Tabel 3 dan telah dideskripsikan oleh Nurtjahjaningsih dkk. (2005).

Metode screening penanda

Pasangan primer mikrosatelit dari *P. densiflora*, *P. pinaster* dan *P. taeda* yang dicobakan pada *P. merkusii* menunjukkan beberapa karakter

amplifikasi allele (Tabel 4). Dari 5 pasang primer *P. densiflora*, 2 primer tidak teramplifikasi, dan 3 primer teramplifikasi dengan menunjukkan 1 primer menghasilkan multi allele dan 2 primer menghasilkan allele monomorfik. Sedangkan semua primer *P. pinaster* teramplifikasi pada *P. merkusii*, namun allele yang teramplifikasi tidak stabil dan sulit dibaca. Demikian pula pasangan primer *P. taeda*, 2 primer tidak teramplifikasi dan

Tabel 3. Karakterisasi tujuh penanda mikrosatelit pada *Pinus merkusii* menggunakan metode *dual suppression*

Lokus	Kisaran ukuran allele (bp)	N_A	H_O	H_E	F_{IS}
pm01	111-117	3	0,328	0,389	0,157*
pm04	92	1	0,000	0,000	-
pm05	112-118	4	0,453	0,484	0,065
pm07	284-309	5	0,578	0,598	0,033
pm08	132	1	0,000	0,000	-
pm09a	81 – 99	6	0,609	0,728	0,163*
pm12	181 – 193	3	0,375	0,493	0,239*

Keterangan:

N_A : jumlah allele yang terdeteksi, H_O : Heterozigositas observasi, H_E : Heterozigositas harapan
 F_{IS} : koefisien *inbreeding*.

* menunjukkan penyimpangan dari Hukum Keseimbangan Hardy-Weinberg ($P < 0,05$)

Tabel 4. Amplifikasi 12 penanda mikrosatelit dari 3 *Pinus* pada *P. merkusii*

Spesies	Lokus	Amplifikasi
<i>Pinus densiflora</i>	pde3	Tidak teramplifikasi
	pde5	Multi allele
	pde6	Tidak teramplifikasi
	pde13	Monomorfik
	pde14	Monomorfik
<i>Pinus pinaster</i>	FRPP91	Tidak stabil
	FRPP94	Sulit dibaca
	ITPH4516	Sulit dibaca
<i>Pinus taeda</i>	PtTX2037	Tidak teramplifikasi
	PtTX3030	Tidak stabil
	PtTX3032	Sulit dibaca
	PtTX3037	Tidak teramplifikasi

2 primer yang teramplifikasi terdiri dari primer yang tidak stabil dan sulit dibaca.

B. Pembahasan

Banyaknya primer yang mengamplifikasikan multi allele (Tabel 2 dan Tabel 4) menunjukkan bahwa multi allele merupakan salah satu permasalahan dalam mengembangkan penanda mikrosatelit jenis konifer. Banyak penelitian melaporkan bahwa besarnya ukuran genom dan sifatnya yang kompleks diduga menyebabkan tingginya ulangan genom pada jenis konifer (Kinlaw dan Neale, 1997; Mariette dkk., 2001). Sebaliknya, allele monomorfik diduga diperoleh karena tidak adanya pengayaan basa nukleotida dari metode yang digunakan (Fisher dkk., 1998). Allele monomorfik pun bisa diperoleh karena motif ulangan mikrosatelit yang didominasi oleh ulangan dua basa nukleotida (Elsik dkk., 2000). Untuk keperluan analisis genetik, semakin banyak jumlah primer polimorfik yang digunakan akan semakin representatif dan memberikan hasil yang lebih akurat. Namun karena keterbatasan waktu dan biaya, target jumlah tersebut terkadang tidak tercapai, sehingga dalam penelitian hanya digunakan jumlah primer yang terbatas, misalnya analisis genetik populasi *P. pinaster* yang hanya menggunakan 3 pasang primer polimorfik dengan keragaman allele berkisar antara 17-25 allele per lokus (Mariette dkk., 2001).

Metode *dual suppression* dikembangkan untuk menghindari amplifikasi primer multi allele terutama pada jenis konifer (Lian dkk., 2000). Metode ini diharapkan memberikan amplifikasi yang lebih baik, khususnya untuk jenis konifer, karena tidak menggunakan metode

pengayaan basa nukleotida pada saat menyusun pustaka DNA. Namun demikian, tanpa pengayaan basa nukleotid diduga dapat menyebabkan rendahnya tingkat polimorfisme, bahkan banyak menghasilkan allele yang monomorfik (Fisher dkk., 1998). Jumlah allele per lokus penanda mikrosatelit *P. densiflora* yang dikembangkan dengan metode *dual suppression* berkisar antara 3-18. Jumlah ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah allele pada *P. taeda* (15-28 allele/lokus) yang dikembangkan dengan metode pengayaan basa nukleotida (Tabel 1). Namun keberhasilan metode ini dipandang cukup baik karena tingkat keberhasilan memperoleh primer polimorfik cukup tinggi (rata-rata hampir 50%) dari beberapa jenis yang dikembangkan. Jumlah pasangan primer yang dirancang dengan metode *dual suppression* ini disarankan sebanyak minimal 10 pasangan primer, mengingat efisiensi biaya (Lian, komunikasi pribadi). Tujuh dari 16 pasangan primer yang dirancang pada *P. densiflora* menunjukkan allele polimorfik (Watanabe dkk., 2006). Bahkan 6 primer polimorfik dari 8 primer yang dirancang pada *Abies firma* bisa diamplifikasikan pada jenis *Abies* yang lain seperti *A. sachalinensis*, *A. mariesii*, dan *A. veitchii* (Saito dkk., 2005).

Seperti disebutkan dimuka bahwa tingginya keberhasilan metode *screening* tergantung pada kedekatan taksonomi. *Pinus* yang dicobakan dalam penelitian ini termasuk dalam Sub Genus *Pinus* (Price, 1989). Bahkan, *P. merkusii*, *P. densiflora* dan *P. pinaster* termasuk dalam Section dan Sub Section yang sama yaitu masing-masing Section *Pinea* dan Sub Section *Pinaster* Loudon, sedangkan *P. taeda* berbeda Section (*Trifoliis*) maupun Sub Section (*Australes*

Loudon). Banyak penelitian melaporkan bahwa metode *screening* ditempuh untuk lebih menghemat waktu dan biaya dibandingkan melalui metode penyusunan pustaka DNA (Echt dkk., 1999). Dari metode ini diharapkan apabila motif mikrosatelit yang dikembangkan berasosiasi dengan banyak fragmen DNA dalam satu genom, maka pasangan primer tersebut pun bisa diamplifikasikan pada kisaran jenis yang luas (Echt dkk., 1999).

Pasangan primer yang digunakan dalam metode *screening* harus dalam jumlah yang cukup banyak. Hal ini untuk membuktikan representasi primer yang akan digunakan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan misalnya: 20 pasangan primer dari pustaka genom dicobakan pada *P. contorta* (Hicks dkk., 1998); 27 pasangan primer *P. strobus* dan *P. radiata* dicobakan pada 10 jenis *Pinus* yang lain (Echt dkk., 1999); 76 pasangan primer jenis *Pinus* lain dicobakan pada *P. pinaster* (Marriete dkk., 2001).

Tingkat keberhasilan metode *screening* berbeda-beda pada setiap jenis. Keberhasilan metode *screening* mencapai hampir 90% dari pasangan primer *P. strobus* yang diamplifikasikan pada *P. lambertiana* (Echt dkk., 1999). Walaupun demikian, penelitian pada jenis lain menyebutkan bahwa keberhasilan metode *screening* hanya 20-30% pasangan primer *P. strobus* diamplifikasikan pada *P. brutia* dan *P. halepensis* (Echt dkk., 1999). Bahkan pada *P. pinaster*, keberhasilan *screening* penanda jenis *Pinus* lain hanya 4% (Mariette dkk., 2001). Hal ini diduga karena setiap spesies mempunyai susunan basa nukleotida yang unik dan spesifik sehingga amplifikasi primer yang dicobakan seringkali tidak stabil (Kinlaw dan Neale, 1997;

Mariette dkk., 2001). Pada penelitian ini, hasil menunjukkan bahwa 12 primer dari jenis *Pinus* lain yang dicobakan pada *P. merkusii* masih belum berhasil memperoleh lokus tunggal yang polimorfik meskipun jenis *Pinus* tersebut berkerabat secara taksonomi. Hal ini disebabkan karena jumlah primer yang digunakan terbatas.

IV. KESIMPULAN

Lima dari 12 penanda mikrosatelit yang dikembangkan dengan metode *dual suppression* bersifat polimorfik. Sebaliknya dari 12 penanda jenis *Pinus* yang lain yang dicobakan pada *P. merkusii* belum menghasilkan penanda yang polimorfik. Dari dua metode ini masih belum bisa disimpulkan metode mana yang lebih efisien karena pasangan primer yang digunakan pada metode *screening* jumlahnya masih terbatas. Namun setidaknya lima penanda mikrosatelit yang telah dikembangkan dengan metode *dual suppression* terbukti polimorfik, sehingga selanjutnya dapat diterapkan untuk analisis genetik pada *P. Merkusii*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Fakultas Kehutanan UGM dan Perum Perhutani yang telah memberikan izin untuk pengambilan sampel dari kebun benih semai *P. merkusii* di Jember, Jawa Timur. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Prof. Yuji Ide dari Departemen Studi Ekosistem Universitas Tokyo atas saran dan dukungan selama penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Dr. Chunlan Lian dari Pusat Studi Lingkungan Alam di Asia,

Universitas Tokyo atas bimbingannya selama pengembangan penanda mikrosatelit *P. merkusii*.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaix, G., Gerber, S., Razafimaharo, V. and Vigner, P. 2003. Gene flow estimation with microsatellites in a Malagasy seed orchard of *Eucalyptus grandis*. *Theoretical and Applied Genetics* **107**: 705-712
- Changtragoon, S. and Finkeldey, R. 1995. Pattern of genetic variation and characterization of the mating system of *Pinus merkusii* in Thailand. *Forest Genetics*, **2**(2), 87-97.
- Cooling, E.N. 1968. *Fast growing timber tree of the lowland tropics*. No.4.CFI. *Pinus merkusii* Commonwealth Forestry Institute. Department of Forestry, University of Oxford. 169p.
- Echt, C.S., Vendramin, G.G., Nelson, C.D., Marquardt, P. 1999. Microsatellite DNA as shared genetic markres among conifer species. *Can. J. For. Res.* **29**: 365-371
- Elsik, C.G. , Minihan, V.T., Hall S.E., Scarpa, A.M. and Williams, C.G. 2000. Low-copy microsatellite markers for *Pinus taeda* L. *Genome* **43**: 550-555
- Fisher, P.J., Richardson, T.E. and Gardner, R.C. 1998. Characteristics of single and multi-copy microsatellites from *Pinus radiata*. *Theor. Appl. Genet.* **96**: 969-979.
- Hicks, M., Adams, D., O'Keefe, S., Macdonald, E., Hodgetts, R. 1998. The development of RAPD and microsatellite markers in lodge-pole pine (*Pinus contorta* var. *latifolia*). *Genome* **41**: 797-805
- Islam, M.S., Lian, C., Kameyama, N., Wus, B. and Hogetsu, T. 2004. Development of microsatellite markers in *Rhizophora stylosa* using a dual-suppression-polymerase chain reaction technique. *Molecular Ecology Notes* **4**: 110-112
- Kinlaw, Claire S. and Neale, David B. 1997. Complex gene families in pine genomes. *Trends in plant science perspectives* **2** (9): 356-359
- Lian, C., Miwa, M. and Hogetsu, T. 2000. Isolation and characterization of microsatellite loci from the Japanese red pine, *Pinus densiflora*. *Molecular Ecology Primer Notes* **9**: 1171-1193
- Mariette, S., Chagne, D., Decroocq, S., Vendramin, G.G., Lalanne, C., Madur, D. and Plomion, C. 2001. Microsatellite markers for *Pinus pinaster* Ait. *Ann. For. Sci.* **58**: 203-206.
- Moriguchi, Y., Iwata, H., Ujino-Ihara, T., Yoshimura, K., Taira, H. and Tsumura, Y. 2003. Development and characterization of microsatellite markers for *Cryptomeria japonica* D.Don. *Theor. Appl. Genet.* **106**: 751-758.
- Nagai, S., Lian, C., Hamaguchi, M., Matsuyama, Y., Itakura, S. and Hogetsu, T. 2004. Development of microsatellite markers in the toxic dinoflagellate *Alexandrium tamarense* (Dinophyceae). *Molecular Ecology Notes* **4**: 83-85.
- Nurtjahjaningsih, I.L.G., Saito, Y., Lian, C.L., Tsuda, Y., Ide, Y. 2005. Development and characteristics of microsatellite markers in

Pinus merkusii. *Molecular Ecology Notes* **5**: 552-553.

Price, R.A. 1989. The genera of Pinaceae in the southeastern United States. *J. Arnold Arbor* **70**: 247-305

Saito, Y., Lian, L., Hogetsu, T., Ide, Y. 2005. Development and characterization of microsatellite markrs in *Abies firma* and interspecific amplification in other *Japanese Abies* species. *Molecular Ecology Primer Notes* **5**: 234-235

Siregar, I.Z. and Hattermer, H.H. 2004. Patterns of genetic structure and variation of Merkus pine (*Pinus merkusii*) in Indonesia. *Journal of Tropical Forest Science* **16 (2)**: 160-172.

Soranzo, N., Provan, J. and Powell, W. 1998. Characterization of microsatellites loci in *Pinus sylvestris* L. *Molecular Ecology Primer Notes* **7**: 1247-1263.

Tsuda, Y and Ide, Y. 2005. Wide-range analysis of genetic structure of *Betula maximo-wicziana*, a long-lived pioneer tree species and noble hardwood in the cool temperate zone of Japan. *Molecular Ecology* **14**: 3929-3941

Watanabe, A., Iwaizumi, M.G., Ubukata, M, Kondo, T., Lian, C., Hogetsu, T. 2006. Isolation of microsatellite markers from *Pinus densiflora* Sieb.et Zucc. using a dual PCR technique. *Molecular Ecology Notes* **6**: 80-82

Zhou Z., Miwa M., Hogetsu T (1999) Analysis of genetic structure of *Suillus grevillei* population in a *Larix kaempferi* stand by polymorphism of inter-simple sequence repeat (ISSR). *New Phytologist* **144**: 55-63.